





Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30500527>

55350

LAURENTII HEISTERI
C O M P E N D I U M
M E D I C I N Æ
P R A C T I C Æ,
Cui præmissa est
D E
M E D I C I N Æ M E C H A N I C Æ
P R Æ S T A N T I A
D I S S E R T A T I O.



V E N E T I I S

A P U D S I M O N E M O C C H I,

Superiorum permissu, ac privilegio.

M D C C L I X.

Ad. Luigi Langguth



DISSERTATIO

DE

MEDICINÆ MECHANICÆ

PRÆSTANTIA.

I.



Edicinam varia habuisse fata , variasque pro vario tempore passam esse mutationes , atque ob varias esse mutationes , atque ob varias eam excolentium opiniones & ingenium in diversas abiisse sententias ac sectas , illis satis notum esse existimo , qui vel leviter in histo-

Medicina varias habuit sectas .

ria medica versati sunt . Prima enim secta fuit *empirica* , quæ *sola experientia nitebatur* , quam vero HIPPOCRATES adjecta ratione fecit *rationalem* sive *dogmaticam* ; hanc , Julii Cæsaris tempore , auctore THEMISONE secuta est *Methodica* , quam vero seculo secundo post Christum natum rursus evertere studuit GALENUS , quo auctore secta *Galenica* orta est . Seculo decimo sexto PARACELSUS condidit *chemicam* ; decimo septimo orta est *Cartesiana* , *Sylviana* sive *Tackemiana* , *Eclectica* , ac denique *Mechanica* (sub qua tamen & *Hippocraticam* sive *Rationalem* intelligo) atque *Stahlianam* . Quoniam vero nomina priorum sectarum sere abolita sunt , atque hodie in Europa , quam maxime vero in Germania nostra , omnes , præter *Mechanicam* & *Stahlianam* quasi desierunt , atque hæc duæ potissimum a Medicis nostris nunc excoluntur , atque hoc meum Compendium practicum secundum Mechanicorum principia conscriptum est , placet hic præfationis loco *Medicinæ mechanicæ præ Stahlianæ præstantiam* hac in dissertatione ostendere ; ut sic quid forte commodi ex hoc libello in facienda Medicina lectores & præsertim *Medicinæ practicæ* tirones capere queant , perspicere possint .

Quid
Mecha-
nicum.

2. Medicina vero mechanica ea mihi dicitur, quæ Medicus ex fabrica corporis humani, utpote quæ tota Mechanica est, per anatomen accurate cognita & actione reciproca partium solidarum in fluida, & fluidarum in solida, observationibus atque experimentis physicis, mechanicis ac chemicis, secundum leges mechanicas ratiocinatur & agit. Nam corpus humanum machinam esse artificiosissimam, ex quamplurimis machinulis minoribus compositam, tam anatome docet, quam a Cel. BOERHAVIO in Instit. Medic. aliisque quamplurimis scriptoribus Medicis Mechanicis & nominatim, Borello, Bellino, Stenone, Lovvero, Pitcarnio, Frid. Hoffmanno, Bergero, Guilielmino, Lancisio, Keilio, Meadio, Michelotto, Mazino, Schreiberio, &c. evictum est, qui excusso jugo auctoritatis, nihil pro certo aut vero admittunt, quisquis etiam illud dixerit, nisi quod sensibus, vel certis observationibus atque experimentis probatum esse cognoscunt, atque ex fabrica corporis per certa ratiocinia, tam in statu ejus sano quam ægroto, deduci potest.

Quid
secta
Stabli-
ana.

3. Sed circa finem superioris seculi in nova, quæ in Saxonia tunc condebatur, Halensi Academia, juxta modo laudatum Frid. HOFFMANNUM, mechanicis principiis addictum, cathedram Medicam exornavit Georg. Ernest. STAHLIUS, vir quoque acutissimus & laboriosissimus, & cui ars Medica revera multum debet; cui vero neque mechanica principia, neque alia tunc in Medicina usitata arridebant, sed novas easque sequentes, quantum ego saltem ex scriptis ejus assecularumque ipsius cognoscere potui, ab anima potissimum petitas, sibi formavit hypotheses, quibus ipse & asseculæ ejus & theoriam & therapiam medicam superstruxerunt.

Quæ
princi-
pia sibi
forma-
verit.

4. Nimirum ad animam, ut dixi, quam naturam esse se volunt, sive ad naturam, quam animam hominis esse contendunt atque pro synonymis habent, in Medicina tam addiscenda quam facienda, quam maxime esse respiciendum; animam enim rationalem esse dicunt, quæ fœtus corpus in utero matris fabricaret; animam deinde eandem esse, quæ in corpore formato & nato ad omnes ejus actiones attenderet, curamque semper, ut hoc corpus tamquam habitaculum suum, sartum tectumque conservet,
gere-

gereret, actionesque omnes corporis animales, vitales & naturales regeret, atque etiam eum in finem, si aliquod vitium in corpore adesse cognosceret, quod corpori noxam inferre posset, ipsam omnes nervos intendere, ut noxium hoc vel corrigeret, vel e corpore expelleret: atque hanc ob causam animam matura hanc ob rem deliberatione facta, in quibusdam excitare vomitum, in aliis fluxum ventris, in aliis sudorem aut urinam copiosorem movere; rursus in aliis fluxus sanguinis, vel per nares, vel per pulmones, vel per ventriculum, renes, vesicam, vel intestinum rectum, quem fluxum hæmorrhoides vulgo appellant, concitare, atque sic supervacaneum vel noxium e corpore pro eo sano præstando eliminare. In aliis per spasmos sive contractiones partium & dolores animam noxium ex certis partibus, vel ad alium locum, eumque minus noxium compellere; illudque vel in pus convertere, sicut in inflammationibus & abscessibus fieri solet, vel hærentes humores spissiores ex parte læsa his spasmis & doloribus propellere, aut per sanguineas excretiones, hæmorrhoidum præsertim, sicut in morbis hypochondriacis, spleneticis, hepaticis, melancholicis, arthriticis & podagricis fieret, aut etiam per serosas, ut in coryxa, tussi & asthma humido, expellere.

5. Ubi simul monendum, Stahlianos pro multorum morborum fecunda matre non tam pravas sanguinis qualitates, acidum nempe aut alcali chemicorum, sed potius abundantiam sanguinis, quam plethoram vulgo Medici appellant, haud inepte habere; adeoque dicunt, animam quamplurimis in morbis studere, immo quam diligentissime laborare, ut corpus suum per excitatas sanguinis profusiones spontaneas a nimia sanguinis copia, a qua quamplurimæ noxæ ipsi imminerent, liberet, atque ubi hunc scopum obtinere sponte non posset, medicum vel per idonea ad hanc rem remedia, vel per artificiales sanguinis detractiones nature succurrere debere. Immo si anima scopum suum in excretionibus ejusmodi obtinere non possit, ipsam haud raro extrema quæque tentare, & non solum vehementissimos dolores, ac speciatim arthriticos, rheumaticos, podagricos vel hypochondriacos, atque convulsiones, sed ipsam quoque

Quænam alia adhuc obtineat placita.

epilepsiam haud raro inducere, ea intentione, ut corpus ab imminente gravi noxa liberet. Speciatim vero *multos morbos capitis*, ut cephalalgiam, ophthalmiam, otalgiam, odontalgiam, tonsillarum & faucium inflammationes sæpe oriri, *quando anima abundantem sanguinem per nares expellere studeret*; spirandi vero difficultatem, *pleuritidem & peripneumoniam*, si per pulmones, & dolores hypochondriorum, colicos, cardialgiam, lumborum, intestini recti & hæmorrhoidalium venarum dolorem, quando vel per ventriculum, renès, aut intestinum rectum se a nimia copia sanguinis liberare tentaret. Verbo: omnes actiones in corpore contingentes, tam animales, quam naturales & vitales, in statu secundum & præter naturam ab anima dependere volunt, animamque sic actionum omnium auctorem esse statuunt; ita, ut quoties dolores, inflammationes, convulsiones, profusiones sanguinis, febres, epilepsiæ, paralyfes alii-que morbi in corpore humano oriantur, hos omnes a sapienti, ut loqui amant, *naturæ instituto*, cum deliberatione prudenti, in utilitatem corporis fieri contendunt. Atque ad has actiones perficiendas ipsam potissimum motu cordis & arteriarum aucto, motuque tonico fibrarum membranarumque uti, quibus omnia ea, quæ modo diximus, efficeret, corpusque suum a morbis vel præsentibus liberare studeret. Medicum igitur in singulis morbis attendere debere volunt cum HIPPOCRATE, quo natura sive anima vergat, ejusque ductum sequi præcipiunt; naturam enim optimam esse morborum medicatricem, & Medicum tantum ejus ministrum: quique hos motus rite observaret, atque naturam in sua intentione optime sequeretur aut juvaret, illum optimum esse Medicum. Atque hæ præcipuæ, ni fallor, sunt hypotheses STAHLII ejusque asseclarum, quos propterea vulgo *Stahlianos* hodie appellant, quibus & theoria & curandi ratio ipsorum innititur. Ubi tamen nec hoc prætermittere possum, quod multi eorum, quemadmodum de mechanicis demonstrationibus mechanicisque partium corporis humani actionibus considerandis, ita etiam de anatome sive vera structura corporis nostri, & præsertim ea, quæ subtiliores partes & functiones corporis exponit, forte ob tedium laboris, quas hæ duæ Me-

Anato-
men con-
tinent.

dici-

dicinæ partes, solidissima genuinæ Medicinæ & Chirurgiæ fulcra, requirunt, parum sint solliciti, atque eas *vel inutiles* in Medicina *curiositates* appellarunt, vel sicut nonnulli, quos hic nominare nolo, tam perfrictæ fuerunt frontis, ut *anatomem Medico prorsus inutilem & supervacaneam* proclamaverint, immo nonnisi *pompam theatralem* vocaverint, existimantes, *se sola observatione intentionum animæ* bonos Medicos esse posse.

6. Itaque Medicinæ Mechanicæ præstantiam præ Stabliana, cum in speculatione sive theoria, quam vocant, *dissertationis* tum in praxi, sive medendi ratione hic demonstrare sive evincere conabor. *indica-*

7. Quod igitur ad theoriam attinet, dissertationis limites non permittunt, ut ad omnes & singulas ejus partes me extendam, sed sufficiat mihi *primaria quædam ejus capita* tantum excutere; & quidem primo, dum perhibent, *animam omnium actionum naturalium & p. n. in corpore humano esse auctorem*, hoc revera probare hætenus nondum potuere: adeoque in veteres labyrinthos & occultas qualitates, quos CARTESIUS & Mechanici tam diligenter e Medicina hucusque expurgare studuerunt ac commendarunt, rursus incidunt, juvenesque Medicos inducunt. Sed antequam hic ulterius pergam, moneo, *hanc dissertationem revera non altercandi causa conscriptam esse*; sed ut in veritatem, sine præjudicatis opinionibus, rebus in utramque partem probe perpensis, serio inquiram, lectoribusque a præjudiciis liberis postea *dijudicandum relinquam*, an non Medicina mechanicis principiis utens præstet Stabliana.

8. Quando igitur unusquisque animo a præjudiciis libero, animam suam explorat, atque *ex ea quærit*, an corpus suum struxerit? anima solertissimis etiam hanc ob rem institutis meditationibus, *hujus actionis nulla ratione recordari*, adeoque etiam profecto ab ea hoc factum demonstrari non potest. Nam quia anima est substantia cogitans, scire deberet, quid fecerit, & adhuc faciat. Sed *obicere possunt*, hominem, quando eum ad statum sive ætatem pervenit, quo anima ad judicandum rite idonea est, viginti & plures forte annos præterisse, animamque tam longa annorum serie earum

Scopus
disserta-
tionis
indica-

tur.
An ani-
ma om-
nium a-
ctionum
auctor.

An cor-
pus suū
struxerit
negatur.

rerum oblitam esse, quas in prima generatione corporis sui peregerit; interea tamen verum esse, quod anima corpus suum construxerit, quia hoc aliter concipi non posset. *Verum respondeo*, dum anima harum actionum, quæ ad corpus humanum ex tot minoribus partibus, machinis & visceribus constans, exstruendum requiruntur; sibi non amplius conscia est, omnes prudentes etiam incertos manere, an hæc sententia & primum Stahlianæ doctrinæ postulatum verum sit. Prudens vero Medicus & Philosophus nihil in rebus naturalibus pro vero aut certo assumere debet, ut jam dictum est, nisi quod vel experimentis vel sensibus verum ac certum esse, sicuti apud mechanicos usitatum est, cognoverit; alias enim incertis fundamentis semper fluctuat, atque incerta ratiocinia, & conclusiones superstruit; quæ, cum fundamenta adhuc dubia aut falsa sunt, & non nisi hypotheses, etiam vera esse vix possunt (a); adeoque, quicquid postea ex hoc fundamento ratiocinantur, non nisi incertum & dubium manet, quod animo veri cupido, qui clare, distincte & certe res scire amat atque satagit, nulla ratione satisfacit; alios autem, qui de vero non sunt adeo solliciti, aut ad verum indagandum inepti, quemadmodum quamplurimos esse homines ingeniosissimus CARTESIUS quam verissime jam docuit, (b) incertos relinquit, qui dicta STAHLII ejusque asseclarum de animæ potentia in corpore suo formanda, aliaque similia arripiunt; dum ea tamquam vera assumunt, licet veritatem eorum demonstrare nequeant, adeoque & ipsi de veritate earum convicti non sint, eaque ut articulos fidei credunt; id quod autem cordato ac prudenti Medico atque Philosopho indignum esse, & præstantiores Medici & Philosophi a tempore CARTESII uno quasi ore confessi sunt & adhuc confitentur. *Cof. scripta acutissimi Philosophi WOLFII, aliorumque præstantissimorum recentiorum & Philosophorum & Medicorum.*

9. Sed

(a) Vid. Oratio mea de *Hypothesium medicarum fallacia ac pernicie*. Altorfii A. 1710. jam a me evulgata.

(b) In Præfat. ad *Meditat. de prima Philosophia*.

9. Sed fingamus, licet non concedamus, animam *Stahliz*
tanti negotii actionem oblitam esse, tamen ex multis a- *hypo-*
 liis actionibus, quæ quotidie adhuc in corpore nostro *theses*
 contingunt, quam manifestissime demonstrari potest, eas *uberius*
 ab anima non perfici, immo ne quidem dirigi, dum ea- *perpen-*
 rum nullo modo sibi conscia est. Actiones, quæ in *duntur.*
 corpore humano contingunt, ab antiquis jam in ani-
 males, naturales, ac vitales distributæ sunt, atque ani-
 males dictæ sunt eæ, quæ secundum animæ volunta-
 tem in corpore nostro fiunt; quales sunt motus volun-
 tarii, quum plerasque corporis nostri partes pro lubi-
 tu & ad nutum animæ movere possimus: ex quibus
 manifeste apparet, animam hos motus perficere, dirige-
 re, eosque ad voluntatem hujus inchoari, continuari,
 augeri, accelerari, retardari, aut etiam omnino rur-
 sus fisti posse. Altera pars actionum animalium corpo-
 ris humani sunt sensus nostri: quos etiam ab anima
 nostra dirigi tam clarum, certum atque perspicuum
 est, ut actum agerem, si hoc uberius hic probarem,
 præsertim, cum vix aliquis hac de re vel umquam
 dubitavit, adeoque Mechanici cum Stahlianis egregie
 hic conveniunt, iisque concedunt, actiones, animales
 dictas, ab anima perfici & dirigi; licet qua ratione
 anima in corpus, & corpus rursus in animam agat,
 definiri certe hætenus a nemine potuerit.

10. De actionibus vero vitalibus & naturalibus alia
 res est. Dicuntur autem actiones vitales & naturales *Quas a-*
 nostri corporis eæ, quæ ad vitam & naturam, h. e. *ctiones*
fabricam corporis nostri conservandam inserviunt: ut anima
 exempli gratia actio cordis & inde pendens circuitus *non per-*
 sanguinis per vasa corporis, digestio sive concoctio ali- *ficiat.*
 mentorum in ventriculo & intestinis, nutritio, vegeta-
 tio, secretiones omnium liquorum in corpore nostro, ut
 urinæ, salivæ, bilis, genituræ aliorumque, quos bre-
 vitatis studio hic prætermitto. Hæ actiones a Medi-
 cis antiquis haud sine ratione, & ni fallor, propterea
 ab animalibus distinctæ sunt, quia probe perspexe-
 runt, probari non posse, eas ab anima provenire aut
 dirigi, sed sponte, anima de iis ne quidem cogitan-
 te, fieri. Verum, hoc non obstante, Stahliani tamen
 contendunt, eas etiam ab anima & oriri, immo &
 sum-

summa cum prudentia dirigi. Sed si hoc ita probare debent, sicut sapientes id hodie desiderant, nimirum ut certe demonstretur, non possunt, vel saltem hucusque non potuerunt. Nam si quilibet prudens cum anima sua serium ac severum init consilium, an has actiones, *vitales* scilicet & *naturales*, perficiat ac dirigat, profecto *earum neque conscia est neque reminisci potest*, se eas *umquam perfecisse*; licet hæ actiones in corpore nostro continuo fiant; adeoque an eas perficiat ac dirigat, necessario etiam scire deberet: sed ne sapientissimi hætenus homines hoc cognoscere potuerunt. At *contrarium potius patet ex eo, quod anima per voluntatem suam actionem cordis, ventriculi, hepatis, renum aliarumque actionum naturalium ne quidem vel minimum, vel per momentum accelerare aut retardare possit*; verum omnes has partes actiones suas, *ut automata*, nimirum horologium quoddam, mola, vel aliæ machinæ artificiales perficiunt, quæ per solam hominis cuiusdam voluntatem absque adhibita vi externa actiones suas non mutant, neque accelerant, neque retardant; *sed prout fabrica sive mechanica constructio eorum motus regulari modo perficit & dirigit, continuo agunt*, donec ab alia causa aut vi id impediatur. Ergo hæ actiones, quia ab animæ voluntate mutari non possunt, *ab anima quoque non dependent*, adeoque ab ea etiam nec fiunt, nec diriguntur.

Stahlia- II. Dum autem Stahlia- volunt & docent, has a-
ni qua- ctiones ab anima institui ac dirigi, illud vero proba-
lites re non possunt, & anima ipsa hoc cognoscere nequit,
occultas quamvis summo studio in id inquirat, quid aliud hoc
indu- est, *quam animæ qualitates occultas*, præstantioribus
cunt. Philosophis adeo exosas, & *præjudicatas opiniones* ple-
no agmine in Medicinam rursus inducere, atque discen-
tibus sine sufficienti ratione credendas obtrudere? Sed
de his hodie quam maxime valet, quod CICERO
quondam de opinionibus præjudicatis dixit: (a) *Tan-*
tum opinio præjudicata poterat, ut etiam sine ratione

va-

(a) Lib: de Nat. Deor. I. Cap. V.

valeat. Nam multi, quia tam sæpe a Doctoribus suis audiverunt vel adhuc audiunt, *animam actiones omnes corporis perficere*, hoc tandem credunt, eoque ipso in præjudicium de veritate hujus rei incidunt; quamvis hoc numquam sufficientibus rationibus probatum sit: sine quibus tamen nihil in rebus naturalibus & medicis vel credendum, vel admittendum.

12. Contra *Mechanici Medici*, nihil pro certo aut vero assumunt, nisi quod sensibus vel experimentis certis, aut ejusmodi ratiociniis ac demonstrationibus, quæ certo convincunt, adeoque demonstrationum vim obtinent, probatum est. Assumunt autem omnia ex omnibus disciplinis & sectis, quæ vera esse demonstrata sunt; assumunt, quod *fabrica corporis humani*, tamquam machina artificiosissima hydraulica, sive automatum ex solidis & fluidis, quemadmodum anatomæ docet, mirabiliter a Deo constructa sit.

13. Nam *solida*, aut *vasa humores coercentia sunt*, aut *instrumenta sive organa* aut *machinæ certa ratione constructa*, in certum finem sive usum sic facta, figurata & connexa, sicut divus ille Medicus Mechanicus BOERHAVIUS quam rectissime scripsit, (a) ut ex singulari hac fabrica, qua quælibet pars instructa est, determinati motus & actiones, sicut in aliis machinis exerceri queant, si causa movens accedit. Deprehenduntur enim in nostro corpore, pergunt, fulcimenta, columnæ, trabes, propugnacula, tegumenta, hypomochlia, cunei, vectes, trochleæ determinantes, funes, prela, folles, cribra, filtra, canales, alvei, receptacula; quibus vero a BOERHAVIO indicatis machinis nostri corporis merito adhuc addi possunt siphones, antliæ, valvulæ, forcipes, forfices, mola, pistilla, mortaria, infundibula, tympana, camerae obscuræ, machinæ acusticæ, similesque res aliæ, quas omnes legibus mechanicis agere atque nonnisi per eas rationali modo explicari posse & ratio docet, atque a modo laudato BOERHAVIO, aliisque supra §. 2. laudatis auctoribus, itemque a celeberrimo Philosopho

VVOLF-

VVOLFFIO (*a*) & SCHREIBERO (*b*) rerum physicarum & mathematicarum expertissimis , fatis demonstratum esse existimo .

Quomodo fluida. 14. *Fluidæ* vero partes intra solidas in corpore humano continentur , atque in iis , quamdiu vivimus , jugi modo a corde & arteriis moventur , in motu hoc per vasa & canales determinantur , varie miscentur , separantur , mutantur , vasa cum nexis instrumentis movent , horum parietes atterunt , mutant , restituant , fiuntque hæ actiones juxta leges hydrostaticas , hydraulicas & mechanicas , ideoque & juxta has , si quid certi de iis scire volumus , ultimo exponi debent : ita tamen , ut accuratissima simul ratio habeatur naturæ uniuscujusque humoris , specialis & actionis ejus , prout per omne genus experimentorum (physicorum præsertim & chemicorum) innotescere potest , sicut quam rectissime præstantissimus docuit BOERHAVIUS . (*c*)

Quid Mechanici spectant in Physiologia præstiterint. 15. Ut vero ad specialiora quædam nunc transeamus , quæ mechanici Medici in Physiologia sive usu partium explicando præstiterunt præ Stahlianis , consideremus , quæso , paucis quam docte STENO de fabrica & actione musculorum egerit , (*d*) quam mirifice Joh. Alphonf. BORELLUS motus musculorum negotium ; tam in homine , quam animalibus , secundum mechanicas leges exposuerit , (*e*) & quos mechanicos usus & actiones ossibus & ligamentis eorum hac in re tribuerit , quæ sane a rerum peritis sine stupore atque admiratione legi vix possunt , præsertim cum Dei sapientiam summam in corporis nostri constructione , ad motus & actiones multivarios , in usus corporis nostri quamplurimos , quam commodissime , quam constantissime & optime præstandos , quam evidentissime demonstrent ; quæ profecto a Stahlianis tam solide

(*a*) Lib. de usu partium corporis humani & animalium , aliisque in locis . (*b*) In elementis Medicinæ physico-mathematicis . (*c*) In Institut. Medic. §. 41. & deinde passim in aliis locis . (*d*) In specim. myologiæ , itemque in libro de musculis & glandulis . (*e*) Libro doctissimo de motu animalium .

lidae nusquam exposita deprehendimus. Quam eleganter STENO, MALPIGHIIUS, BELLINUS, KEILIIUS, HARTSOEKERUS, MICHELOTTUS *secretionis negotium* exposuerunt. Quam pulchrè LOVVERUS & BORELLUS *actionem cordis* ex mirabili sua musculosa fabrica explicarunt. Quis enim mirabilis circuitus sanguinis rationes rite comprehendet, nisi qui *ex admiranda structura cordis*, arteriarum distributione & elastica fabrica, venarum situ sive cursu earumque valvulis, pulmonum & thoracis vera constitutione, (a) & ex mathematicis hydrostaticas & hydraulicas leges perceperit? Cor enim est musculus cavus, ejusque fibræ musculosæ magno artificio ita sunt contortæ, ut *preli vel siphonis in modum sanguinem* magno impetu in arterias expellant (b). Arteriae autem sunt canales conici, robusti & elastici, quæ ob hanc suam fabricam sanguinem, e corde susceptum, ex ampliori per angustiores semper & tandem angustissimum diametrum, reciproca cum corde actione in omnes partes, & tandem in venas propellant, quæ quoque canales membranacei & conici sunt, sed inversi, ita ut sanguis in iis ex angustissimo diametro semper in ampliorem influat; adeoque ille sanguis, qui primas & maximas earum angustias superavit, postea in amplioribus viis vix hæere queat. Atque hunc motum in venis, præsertim brachiorum atque infra cor positis promovent multæ in eis conspicuæ *valvulae semilunares*, membranaceæ, a FABRICIO AB AQUAPENDENTE primum & elegantissime delineatæ: quæ mirabili mechanica ratione impediunt, ne sanguis in partibus infra cor, ac præsertim pedibus & brachiis pendentibus relabatur; sed dum a corde per sanguinem arteriosum semper urgetur, faciliori ratione ascendat. Præterea *per arteriarum*

(a) Hæc omnia ex anatome cognita hic desideramus, quia nimis prolixum foret, ea hic describere. (b) Sicut eleganter hoc demonstravit LOVVERUS Lib. de Corde, BORELLUS Part. II. de motu animal. Cap. V. propos. 50. & seq. BELLINUS de motu cordis, LANCISIUS de corde, aliique.

rum & venarum ordinatam distributionem per corpus fit, ut sanguis e corde projectus, non temere hinc inde, sed per determinatas vias, ad determinata loca & partes, sursum & deorsum feratur. Quidnam autem est, quod cordis actionem in circumpellendo sanguine per arterias & venas elegantius illustrat ac docet, quam siphon & prelum, machine vulgarissime, quando liquores per canales propellunt? Quid respirationis modum planius exponit, quam follis? qui dilatatione laterum suorum aerem per tubum suum recipit, constrictione vero eorum aerem per eundem rursus expellit, sicut quam ingeniosissime id exposuerunt BORELLUS, MAYOVIUS, BERGERUS, BOERHAVIUS, HAMBERGERUS, alique: nam in corpore habemus organa maxime mirabilia, diaphragma præsertim aliosque musculos quamplurimos, respirationi dicatos, (a) per quæ thorax, dum costæ ab ipsis eleuantur, diaphragma vero descendit, dilatatur in inspiratione, sed in expiratione, dum diaphragma ascendit, costæ autem descendunt, constringitur: ut sic per tubum pulmonis, arteriam asperam intelligo, aer pulmonem, ut in follem, ingredi, & ex eo rursus egredi possit.

Hoc uberiorius exponitur.

16. Quis visus, quis auditus rationes mirabiles exponere potest, nisi qui ex anatome harum partium mechanicam fabricam, ex optica vero, catoptrica, dioptrica & acustica, artibus matheseos in arte salutari utilissimis, camera obscura & tubis acusticis radiorum visibilium & sonorum naturam, refractionesque & reflectiones eorum probe didicerit? *An non glandulæ & viscera nostra, ubi secretiones certorum humorum, & quidem modo tenuiorum modo crassiorum fiunt, vera cribra & filtra pharmaceutica, per quæ tenuiora a crassioribus separantur, repræsentant? Valvulæ cordis & triangulares & semilunares regressum sanguinis per eam viam, per quam venit, tam mirabili mechanica ratione impediunt, ut in machinis humanis tam apte hoc vix umquam factum sit. An non in ventriculo, vesti-*

(a) Qui videri possunt in compend. meo anatom. §. 330. aliisque in recentioribus scriptis anatomicis.

vesica urinæ collectioni destinata, vesicula fellis, vesiculis seminalibus, & similibus vera habemus receptacula, in quibus varii liquores, ob certas causas aut ad certos usus, per certum tempus, quasi in receptaculis hydraulicis, asservantur. Quam eleganter dentes nostri in ore, & præsertim anteriores, cuneos, quam egregie maxillæ forcipem, aut etiam certo modo forcipem, qua cibos discerpimus aut discindimus, repræsentent, atque revera etiam constituent, olim in dissertatione de masticatione (a) demonstravi. Immo eandem maxillæ cum dentibus certa ratione mortarium cum pistillo, sed sic exhibent, ut superior maxilla constituat corpus resistens sive mortarium, inferior autem pistillum, quo cibi in ore, quasi in mortario, continentur ac comminuuntur; immo & eorum similitudinem cum mola Antiquissimi una cum Scriptura sacram cognoverunt (b): unde etiam posteriores dentes iam dudum molares, anteriores vero ab usu incidendi ad modum forcipis, incisores dicti sunt. Denique in faucibus, speciatim in œsophagho & capite ejus pharynge dicto, aptissimum conspiciamus infundibulum, per quod deglutienda, præsertimque potio, quasi per infundibulum in dolium vel lagenam aliudve receptaculum, quod ventriculus hic est, demittitur. Tandem s, fauces & præsertim larynx cum pulmonibus nobis organum musicum pneumaticum, cui simile in artificialibus non existit, constituunt, sicut varii, qui de voce & loquela scripserunt, egregie demonstrarunt. (c) Quæ omnia sane, nisi me omnia fallunt, mechanismum & actiones mechanicas in corpore humano, adque & præstantiam Mechanicorum in physiologia Stahlianis, abunde demonstrant.

17. Sed obijciunt Stahlia, hæc omnia tamen moveri & agi ab anima, atque sine concursu vel directione animæ non fieri, quemadmodum in mortuis post excessum animæ omnes prædictæ actiones cessarent.

In actionibus animalibus,

(a) Quæ Altorfii 1711. prodiit in 4. (b) Vid. Ecclesiast. c. 12. v. 3. (c) Vid. DODART. in act. Acad. Reg. Paris. An. 1700. VVEDEL. & SCHELLHAMMER diss. de voce, AMMAN. de loquela.

Mechanici
sum
Stahlianis
conveniunt.

rent. Sed respondeo, distinguendo primum probe inter actiones animales, vitales & naturales. In actionibus animalibus, sive iis, quæ ab animæ voluntate dependent, Mechanicos (saltem plerosque) ut jam dictum est, cum Stahlianis amice conspirare, opinor, atque ratione causæ efficientis cum ipsis prorsus consentire, quod scilicet ab anima dirigantur, eaque auctor earum atque director sit: quia hoc sensibus obvium atque manifestum est. Sed quando causam instrumentalem, ut vocant, consideramus, nullus profecto actionum animalium, motuum scilicet voluntariorum, organorumque sensuum idoneam explicationem adhuc dedit, aut dare forte unquam poterit, nisi eorum instrumenta, ut organa mechanica considerabit, & earum actiones secundum has leges explicabit: adeoque quoties Stahliani recte de actionibus animalibus sive voluntariis differere volunt, mechanicam partium structuram & agendi rationem vel inviti in auxilium vocare coguntur.

In naturalibus vero dissentiant.

18. Verum ut in his est concordia, sic e contrario in actionibus vitalibus & naturalibus explicandis tanto major inter ipsos est dissensus: dum Stahliani has quoque ab anima produci, dependere & dirigi statuunt, ut supra jam §. 4. & seq. dictum est; Mechanici vero hoc cum antiquis prorsus negent; quia anima de excitatione aut directione harum actionum, sicut §. 7. & seq. ostendimus, nihil scit, nihil cognoscit, nihilque in iis mutare, hoc est, eas neque accelerare neque retardare sua voluntate ulla ratione & ne per momentum quidem temporis potest.

Quid Mechanici de his sentiunt.

19. Qua ratione igitur Mechanici hasce actiones fieri existimant, dum animæ nullas partes hic dare volunt, dicam. Evicimus non solum jam supra, & anatome, opinor, omnes attentos & a præjudicatis opinionibus liberos facile convincet, corpus nostrum esse artificiosissimam machinam hydraulicam, ex diversis machinis minoribus, vasis, canalibus, & ductibus, certos liquores vehentibus, ita conflatum, ut solida fluida, fluida vero solida reciproca actione moveant ac propellant, & ut una semper pars per communicationem & nexum cum altera, ope vasorum præsertim & nervorum,

alterius actioni succurrat, atque sæpe plures ad unam actionem perficiendam, instar automati, horologii vel molæ concurrant. *Demonstrat hoc*, (ut exemplo uno alterove rem illustrem & extra justæ dubitationis aleam ponam) *concoctionis ciborum negotium*: quod non solus ventriculus, ut haud pauci imperiti existimant, perficit; sed ad illud conficiendum primo manducatio in ore facta, deinde omnes *glandulæ salivam secernentes*, juxta os, in ore, in faucibus & œsophago consistæ concurrunt, ac præterea *intestina*, præsertim tenuia, *glandula pancreas* dicta, hepar & lien, suum quoque Symbolum conferunt, quemadmodum hoc a Physiologicis recentioribus unanimi consensu probatum est, neque forte vel ab ullo prudentiorum *Stahlianorum* negatur. Ita *bilis præparationem* non solum hepar præstat, sed lien, intestina, mesenterium, omentum, aliæque partes in unam hanc actionem amice conspiciunt: id quod etiam vix ab ullo prudenti hodie in dubium vocatur, atque a BOERHAVIO in Institut. Med. eleganter demonstratum est.

20. Sic ad cordis actionem, quæ primaria est vitæ nostræ, *cerebri*, sive rectius *cerebelli concursus* sive adjuvamentum & quidem per nervos, qui a cerebello ad cor excurrunt, requiritur; quia his resectis vel ligatis in animali vivo cordis motus atque inde pendens vita desinit, quod quamplurimi etiam probarunt, inter quos unicum rursus BOERHAVIUM nunc tantum nominare volo. (a) Ad cerebelli autem actionem præstandam requiritur communicatio cordis cum cerebello per arterias, per quas ad cerebrum & cerebellum sanguis tenuissimus per leges mechanicas devehitur, sine quo actio cerebelli nulla est, & animalis vita quoque perit. Probant hoc vulnera, per quæ sanguis ita profunditur, ut ad cerebrum nullus amplius pervenire queat. Quemadmodum vero ab influxu sanguinis ex corde in cerebrum sublato actio cerebri & cerebelli tollitur; ita ex influxu alicujus liquidi subtilissimi ex cerebello per nervos ad cor impedito aut sublato, quod vulgo *liquidum nerveum* sive *spiritus* appellamus, tol-

Quo-
modo
cordis
actio
peraga-
tur.

B

li-

(a) Vide ejus Institut. Med. §. 401.

litur motus cordis, atque inde mox subsequitur mors. Quamdiu autem hoc commercium inter cor & cerebrum saluum factumque conservatur, tamdiu observamus actionem quoque cordis & cerebelli perdurare; quæ partes, ut causæ sociæ, reciproce se invicem juvant, se invicem conservant, & sic automatum præcipuum nostri corporis, quod sine animæ directione movetur, & artificiosissimum, PERPETUUM MOBILE, ut vulgo dicunt, quale vel præstantissimi adhuc Mechanici perficere nondum potuerunt, constituunt, in quo cor per sanguinem ad cerebellum propulsum actionem hujus, secretionem scilicet liquidi illius subtilissimi præstat; cerebellum, contra, per nervos hoc liquidum continuo rursus ad cor demittit, ejusque ope motum cordis singulo ejus pulsu instaurat, & quamdiu animal vivit, conservat, atque sic hoc perpetuum mobile, quod stupenda prorsus ratione per centum sæpe annos, sine ulla interruptione, constanter noctes diesque movetur, centies fere millies singulo die pulsatur, atque sic vitam hominis reliquasque omnes actiones in corpore conservat; (a) ad quos motus nullum principium immateriale sive anima requiritur; sed hi motus ob solas corporeas atque mechanicas illas rationes fieri possunt. Ut vero hoc aliquo simili illustretur, placet producere molæ exemplum, in qua videmus rotam maximam, quæ ab aquæ motu aut lapsu movetur, reliquas rotas interiores & minores, una cum ingentibus lapidibus molaribus movere, subjectumque frumentum comminuere, idque tamdiu fieri, quamdiu molæ machina est integra & affluxus aquæ moventis non deficit. Quemadmodum vero illas rotas & lapides ab affluente aqua moveri videmus, sine animæ alicujus directione; ita & quamdiu ille affluxus spirituum sive liquidi cerebelli in cor non desinit, tamquam in machinam, quæ apta est ab hoc liqui-

(a) Hoc non modo in comp. anatom. §. 261. ubi de motu cordis egi, sed & postea uberius WACHTERUS in diss. de vera perpetui mobilis in homine vivo idea, sub præsidio Fr. HOFFMANNI, Halæ 1731. edita, exposuit.

quido moveri (quia via huic liquori per ligaturam præclusa mox desinit moveri) atque machina corporis integra est, motus ille cordis conservari & quam diutissime, ut dictum, instar perpetui mobilis continuari sæpe solet.

21. Sic eadem ratione rem se habere Mechanici statuunt in aliis visceribus, quorum actiones per se fiunt, atque animæ voluntati non sunt subiectæ; verum quæ inscia & non advertente anima, & ubi anima nihil mutare, actionesque accelerare, neque retardare potest, contingunt, adeoque automaticæ sunt: quales, ut supra jam diximus, sunt viscerum concoctioni ciborum famulantium, glandularum aliarumque partium, ubi secretiones variorum in corpore humorum perficiuntur actiones: ut hepatis, renum, testiculorum, ventriculi, mammarum, &c. ex quibus exempli loco unicam modo partem ob prolixitatem nimiam hic vitandam, paulo intimius considerabimus, & quidem nominatim ventriculum, concoctionis organum primarium.

22. Hujus actionem, concoctionem scilicet ciborum, animam pro lubitu neque accelerare neque retardare posse, sicut de corde diximus, experientia loquitur; inter ea tamen ventriculus sanus intra certas horas certam alimentorum assumptorum copiam concoquit, digerit, & in fluidum, quod chylum vocant, resolvit, eadem fere ratione, ut mola intra certum temporis spatium, certam frumenti copiam conterit & in farinam resolvit. Nullus adeo demens est, qui credat animam esse, quæ actiones molæ bene fabricatæ & semel in motu constitutæ, dirigat, quia tam ordinate hic omnia procedunt, sicut in horologio; sed potius vel rustici agnoscunt, hæc omnia, quæ mola perficit, ob mechanicam fabricam, quam habet, ita fieri. Quapropter etiam opus non est, ut in corpore humano, quod machina est longe excellentior, quam mola aut horologium, aliter de ejusmodi actionibus spontaneis sive automaticis, quales digestio & secretiones sunt, sentiamus & iudicemus. Nam ventriculus ob fabricam & figuram, quam habet, aptum receptaculum præbet alimentis assumptis, eisque, quantum satis est, retinendis; humores dissolvendi potentia præditi ex ore, œsophago &

Quo-
modo
aliæ
actio-
nes na-
tura-
les.

Specia-
tim ra-
tione
vegeta-
tionis.

ipsa ventriculi substantia continuo in cavum ejus *in-
fluunt*, aut potius sub tenuissimi vaporis specie, dum
copiosissimis vasis sanguiferis & nervis instructus est,
per quæ ope pulsus cordis & arteriarum propelluntur;
exhalant, ut sic tanto melius ac facilius in subtilissi-
ma interstitia assumptorum sese insinuare, atque sic
ipforum resolutionem efficere possint. *Aer*, qui in fo-
raminulis assumptorum hærebat, dum deglutiebantur,
jam a calore ventriculi & vicinorum *viam suam ela-
sticam innatam exercet*, atque alimenta, liquore calide
in ventriculo semper fota ac macerata, sensim mollio-
ra fiunt, atque ab aere in foraminulis eorum conten-
to, tanto facilius jam dissolvuntur. Quando denique
ad hæc omnia adhuc accedit alterna ipsius *per tunicam
suam musculosam vegeta constrictio* & relaxatio atque
sic perpetua conquassatio, ut & *motus ac pressio par-
tium vicinarum*, diaphragmatis præsertim ac musculo-
rum abdominis, utpote a quibus, maxime quando ho-
mo in exercitationibus corporis versatur, concutitur;
digestionem, sive resolutionem ciborum, cum primis
antea in ore bene manducatorum, solis his recensitis
physicis ac mechanicis causis perfici posse, *immo etiam
revera fieri*, non est, quod dubitemus, & quidem *sine
ullo animæ concursu*; dum omnia, quæ hic fiunt, ex
causis, ut dictum est, mere physicis & mechanicis,
sicut in mola aut horologio bene constructo, fieri pos-
sunt, atque revera etiam fiunt. Quam enim ob causam
anima hic concurrere debeat, tanquam res quasi
supervacanea, non perspicio. E contrario *Dei sapien-
tia in fabrica corporis nostri tam magna & mirabilis est*,
ut teste GALENO, (a) aliisque prudentioribus, *ni-
hil ad finem destinatum obtinendum in eo vel deficiat
vel abundet*.

23. Quemadmodum vero Mechanismi veritatem in
præcedentibus demonstravimus, ita etiam haud diffi-
le hoc esset de organis & partibus reliquis, *ubi secre-
tiones, vegetatio, nutritio, aliæve actiones naturales, a-
nimæ imperio haud subjectæ*, in corpore humano con-
tingunt, quoque demonstrare; verum quia nimis lon-
gus

(a) Libr. de usu partium & Wolffius de finibus rerum.

gus fieri cogerer, lectorem ad BELLINI scripta, itemque ad BOERHAVII vel HOFFMANNI Physiologiam, KEILII libellum de secretionibus animalibus, MICHELOTTUM de *separatione fluidorum in corpore animali*, aliosque supra laudatos Auctores ablegamus, ubi hæc res ex mechanicis fundamentis satis mihi evicta esse videtur, ita ut Medicinæ Mechanicæ, præ Stahlianis in Physiologia nondum probatis principiis, præstantia satis cognosci queat.

24. Unicum solum ratione *nutritionis & vegetatio-* nis hic adhuc addam phænomenon, quod Stahlianæ doctrinæ quam maxime est contrarium: nimirum, quod si nutritio & vegetatio corporis esset in animæ potestate, atque plerorumque *hominum animæ corpus suum magnum, venustum ac robustum desiderent*, sequeretur plerorumque corpora etiam magna, venusta ac robusta esse; verum quantopere etiam anima fere uniuscujusque hominis hoc desideret, tamen plerique ad illam magnitudinem & formam, quam anima ipsorum maximo desiderio vult, desiderat, exoptat, non perveniunt; sed plerique minores, minus obesi & venusti manent. Immo e contrario in quibusdam regionibus multi exoptant, ut minores manerent, quam sunt, verum, anima etiam reluctante, majorem proceritatem quam desiderant, acquirunt; unde patet, omnia hæc fieri contra animæ voluntatem & non secundum eam, adeoque & vegetatio & nutritio ab animæ directione nullo pacto procedunt.

Specia-
tim ra-
tione
vegeta-
tionis.

25. Denique sententia Stahlianæ, quod vegetatio, nutritio & incrementum corporis ab animæ directione & voluntate proveniant, ipsi sacrae Scripturæ, quod nullus, quantum novi, adhuc notavit, aperte est contraria. Stahliani enim dicunt, animam struere corpus, animamque vegetationem & nutritionem ejus perficere; Christus vero ait, (a) *neminem stature suæ cubitum addere posse*. Ergo dum hoc ultimum quam verissimum esse novimus, non solum, quia os veritatis hoc dixit, verum etiam, quia id experientia omnes indicunt, sequitur, Stahlianam sententiam tanto ma-

Stahlii
senten-
tia S. S.
contra-
ria.

(a) Vid. Evangel. VI. 27.

gis hic falsam esse, quia & sacrae Scripturae & experientiae quotidianae contrariatur.

Quomodo in
respiratione.

26. In respiratione autem, quae actio est *partim animalis, partim naturalis*, res paulo aliter sese habet; hæc enim animæ voluntate dirigi, accelerari nempe ac retardari potest; attamen sponte quoque, ut *automatum, nocte dieque viget*, quando dormimus & anima de ea nequidem cogitat. Hoc vero inde fieri plures, & speciatim BOERHAVIUS (a) egregie demonstrant; quia scilicet *organa respirationis nervos*, adeoque & *spiritus accipiunt partim a cerebro, partim a cerebello*, atque si hi tantum agunt, sponte æqualis respiratio contingit; sin vero illi, scilicet a cerebro prodeuntes, qui animæ famulantur, respiratio etiam voluntaria est, & pro animæ voluntate, in magnos usus corporis nostri, atque in multis actionibus voluntariis, exercitationibus corporis, nisibus magnis, ponderibus gravioribus elevandis, modo accelerari, modo augeri, sive profundior ac fortior fieri potest.

Liquidum
nervum
dari
probat
ur contra
Stahlianos.

27. Unam adhuc haud levis momenti controversiam, quæ inter Stahlianos & Mechanicos intercedit, prætermittere hic non possum, antequam ulterius pergam, quæ est, quod *Stabliani cava nervorum adeoque & subtilissimum illud liquidum nerveum sive spiritus*, ut plerique illud cum veteribus appellare malunt, HIPPOCRATI *partes impetum facientes* dicti, quod in iis movetur, atque ita & omnes actiones, usus & effectus, quos Medici alii a longo tempore *cerebro, nervis & spiritibus* adscripserunt, negent, eosque omnes usus & effectus, forte ut quam brevissime se semper in difficultatum multarum resolutione expedire queant, animæ adscribant. *Mechanici vero Medici & cava nervorum & liquidum nerveum sive spiritus* admittunt, eosque simul usus & actiones, quos veteres ipsis adscripserunt, quoque tribuunt, atque ab horum legitimo e cerebro & medulla, quæ in spina est, per fibras minimas in partes influxu, *sensum, motum, nutritionem & actiones* harum deducunt. Atque ut brevitas causa alias demonstrationes jam taceam, quæ
a BOE-

(a) In Instit. Med. Cap. de Respiratione.

a BOERHAVIO (a), Burgravio (b), & me (c), magna satis copia prolata sunt, vel unicam tantum nunc commemorabo, quam Stahliaſi evertere hæte- nus non potuerunt, nimirum quod nervo *ligato*, *sen- ſus*, *motus* & *nutritio partis tollantur*, quæ eo non *li- gato in corpore ſano vigeant*. Stahliaſi ſenſum & mo- tum, qui manifeſte per nervos perficiuntur, non ſpiri- tum per hos influxui, ſed certæ cuidam *vellicationi*, *tenſioni* aut *vibrationi nervorum adſcribere volunt*, quam anima in actionibus illis efficeret. Sed præter- quam quod hanc tenſionem ſive vibrationem nullo mo- do probaverint, neque ſenſibus percipi queat, non vi- deo, quomodo filum, quo nervus aliquis *ligatus* aut *conſtrictus eſt*, tenſionem, vibrationem, tractionem, aut quæcumque alia ratione hanc animæ actionem ap- pellare velint, impedire poſſit. Contra ſi cum Mecha- nicis ac veteribus Medicis ſtatuitur, actiones nervo- rum prædictas fieri per influxum liquidī alicujus ſubti- liſſimi ſummeque mobilis, *clarum erit*, quare actiones & effectus, qui antea a tranſitu ejus fiebant, *nunc iis ligatis, impediuntur aut priuſus tollantur*.

28. Nec obſtat, quod regerant, hoc liquidum ſub- tilifſimum nerveum & cava in fibris nerveis conſpici non poſſe; cum ſciamus & quam manifeſtiſſimum ſit; ſuccum valde craſſum in vegetabilibus per fibras eorum, quæ revera ſubtilia vaſcula ſunt, & ſpeciatiim per pe- dunculos, verbi cauſſa ceraſorum, prunorum ſimilium- que fructuum, tranſire, indeque fructus, carnem ſatis craſſam non ſolum, verum *ipſius nuclei duri ſubſtan- tiam*, longe adhuc craſſiorem, tranſiſſe; cum tamen in fibris ſive vaſculis horum pedunculorum nulla cava æque ac in nervis appareant. Ex effectibus vero, ſi- cut aliis multis in rebus, per certiſſima ratiocinia de rei veritate dictis in fructibus & nervis æque certe perſuaderi & convinci poſſumus, ac per manifeſtiſ- ſimas demonſtrationes geometricas alias fieri ſolet; dum

Obje-
ctio
quod
videri
non
poſſint,
dilu-
tur.

(a) In Inſtitut. Medic. §. 274. & ſeqq. (b) De exiſtent. ſpirituum. (c) In compend. meo anatomico §. 301. quæ ab iis, qui eas adhuc ignorant aut non legerunt, legi ac probe perpendi merentur.

alia argumenta & observationes fortissimarum demonstrationum vim obtinent, iique *profecto nimis crasse de spiritibus seu liquido cerebri & nervorum* atque cavis horum judicant, qui illud tam crassum, hæc vero tam ampla esse putant, ut oculis conspici queant aut debeant; dum cava vasorum non solum pedunculorum dictorum fibris, verum & in multis rebus aliis, ac præsertim etiam *in insectis perexiguis, maxime pedibus ipsorum conspiciere non possumus*; ubi tamen ex effectibus & actionibus eorum, vegetatione scilicet, nutritione aliisque phænomenis vascula & cava in his existentia, quæ liquidum vehunt, revera adesse, quam certissime persuademur.

Alia 29. Unicam vero adhuc superesse video objectionem, *objectio de pri- de primo in corpore humano motore*. Nam dicunt, *mo mo- quamvis etiam partium, quæ functionibus naturalibus vente.* famulantur, fabrica, organa & aptitudo ad motum certasque perficiendi actiones adsint, tamen quis est, qui motum cordis auspicatur, adeoque *quisnam est primus ejus motor?* Partes corporeas ad motus inchoandos ineptas esse dicunt, adeoque *neccessario ab anima eos inchoari*, atque deinde etiam, quamdiu vivimus, continuari. Verum respondemus, hoc nullo modo verum esse, quod *corporeæ sive materiales partes, mechanica structura præditæ*, per se & sine anima rationali ad motum ineptæ sint, nam hoc *refellunt quam manifestissime automata, ut horologia, veru, automatum, aliaque*, quæ vel elateris vel ponderis ope motum inchoant & continuant; *hoc refellunt etiam molæ*, quæ vel *ab aqua vel vento moventur*, sine anima rationali, aut alia qualicumque.

Quoniam vero *fœtus rudimenta, ut in seminibus plantarum*, faba, verbi gratia, phaseolo, piso, &c. ita & in ovo muliebri, dum DEUS & natura magnam *inter plantarum & animalium generationem*, ut recentiores Botanici demonstrarunt, (a) analogiam servat, e-

xi-

(a) Vid. CAMERARIUS de sexu plantarum, VAILLANTIUS de florum structura, van ROYEN de

xistunt, dum ovulum muliebre in concubitu a semine virili fœcundatur, staminibus sive rudimentis ejus hoc ipso motus & vita a parente impertitur; id quod ovuli post coitum intumescencia & incrementum demonstrant; huncque motum postea hac ratione per vim elasticam illorum rudimentorum, quæ fibræ sunt, dum quælibet fibra, quodlibet vasculum corporis animalis vi elastica a Deo præditum est; quam paucis ab imprægnatione diebus *punctum, saliens dictum*, in ovo incubato ostendit, (a) ceteraque fabricam mechanicam jam ante imprægnationem præsentem, licet adhuc subtilissimam, sicut *forte in minimo*, quod existit, *infecto*, continuat, sensim, quando partes robustiores fiunt, auget, atque tandiu ob easdem causas continuat, quamdiu animal vivit & sanum est, sicut id supra §. 20. jam prolixius exposuimus, ita ut ex his satis patere existimem, præsertim, quia hæc res eodem modo in brutis animantibus, ut in homine contingit, nullam animam rationalem ad actiones naturales & vitales vel auspicias vel continuandas & perficiendas necessario requiri; sed ex solis causis mechanicis fieri posse, atque etiam revera fieri; præsertim, cum de anima hoc nullo modo, ut sæpius jam diximus, probatum sit.

30. Sed tempus nunc est, ut ad Pathologiam me conferam, atque etiam præstantiam Medicinæ Mechanicæ præ Stahlia & in hac evincamus. Quoniam autem in Physiologia præter opinionem paulo jam prolixior fui, brevior in Pathologia esse studebo; id quod tanto melius fieri poterit, quia multæ veritates Pathologiæ jam ex præmissis facile demonstrari possunt. Ut exempli causa, quando Stahlia volunt & statuunt, animam humanam rationalem causam esse tam actionum in statu naturali, quam in statu p. n. & speciatim febrium, inflammationum, dolorum, spasmodorum, sanguinis profusionum spontanearum, distensionum nervorum sive convulsionum, relaxationum nervorum, epileptiarum, & si qui

de amoribus & connubiis plantarum, itemque LINNÆUS in script. suis botanicis.

(a) Vid. MALPIGHIIUS de ovo incubato, BAYLII Institut. physicæ aliique.

qui sunt alii, hosque morbos non esse nisi molimina sive conatus, ut vocant, naturæ salutare, quibus noxium e corpore expellere studeret.

An mor-
bi sint
molimi-
na na-
ture.

31. Verum admodum lubrico & infirmo stare fulcro hanc sententiam, ex eo rursus facile patere arbitramur, quod anima non solum harum actionum, quod scilicet eas excitet, sibi haud sit conscia; sed e contrario, si in ejus potestate hæ res præter naturam essent positæ, eas potius impediret, aut alia saltem eaque longe securiori & blandiori ratione noxium e corpore, quam molestis illis dolorificis, & sæpe horrendis, ut in epilepsia, ac periculosis actionibus expelleret. Immo si anima rationalis, quam ad avertenda omnis generis vitia & interitum corporis semper intentam esse fingunt Stahliani, intelligeret aut cognoscere posset mala imminentia, causas eorum maturius & mox in principio, dum malum adhuc parvum est, per consueta corporis excernicula eliminaret, antequam, ut Poeta canit, *per longas invaluere moras*.

Verum si animam nostram interrogamus, quando male valeamus, an ipsa ejusmodi mala morbi que presentis causas cognoverit, præviderit, atque vel febrem, vel inflammationem, vel dolores, vel hæmophthysin aut epilepsiam, vel alium ejusmodi morbum produxerit, illa hoc negabit; & numquam in mentem hoc sibi incidisse affirmabit; immo se causam vel auctorem esse horum malorum & tumultuum, qui jam nos tam misere affligunt, Stahlianis in faciem negabit, atque injuria ea ipsi, quæ non fecerit, tribui constanter asseverabit.

Et profecto anima rationalis, quæ ens cogitans haud prorsus inepte a CARTESIO appellatur, quia natura ejus non melius, quam per cogitationes nobis innotescit, eamque a corpore hac ratione distinguit, conscire profecto deberet, quid agat, aut quod nuperrime egerit, quemadmodum & aliarum rerum, quas perficimus aut nuperrime adhuc perfecimus, præsertim si ad eas serio attendimus, conscii sumus. Verum quantopere etiam mente ad res has reflectamus, tamen numquam ex ea intelligere possumus, quod hæc faciat, multominus, quod id certo demonstrari queat: adeoque fundamentum mor-
borum

borum ac medicinæ practicæ nimis infirmum & incertum præbet, & injuriam ipsi inferunt; dum injuste animæ innocenti tribuunt facta mala, quæ numquam perpetravit, aut perficere voluit, & de quibus antea numquam cogitavit.

32. E contrario sunt quamplurima, quæ hanc *Stab-* *Stablia-*
lianorum sententiam labeſcunt, aut potius prorsus ever- *norum*
tunt: quorum ſpeciminis loco nonnulla nunc tantum, *ſenten-*
ob nimiam prolixitatem evitandam, ex quamplurimis *tia de*
hic proferam, quæ jam olim aliquando Medicis ita ſen- *cauſſa*
tientibus oppoſui. (a) Nimirum primo cauſſam ſputi hæmo-
cruenti, quod hæmoptyſin vulgo vocant, *Stabliani non* *ptyſis.*
morbo aut vitio culpando, ſed prudenti animæ conſilio ſi-
ve decreto adſcribunt, ut corpus hac ratione ab abun-
dante & noxio ſanguine liberet: igitur animam aperire
vel diſrumpere vaſa pulmonum, atque ſupervacaneum
ſanguinem in ſalutem ſui corporis expellere perhibent,
ut poſtea reliquus in vaſis ſanguiferis & ceteris viſce-
ribus commodè pro corporis ſanitate ac vita conſervan-
dis circumagi atque officia ſua præſtare poſſit, hacque
etiam prorsus ratione de aliis quoque profuſionibus ſangu-
inis judicare & ſentire ſolent.

33. Verum hæc morbi hujus sæpe periculosissimi ætiologia Medicis Mechanicis minime satisfacit, adeoque nec pro vera ab iis assumi potest. Nam primo *anima rationalis* profecto non rationalis aut prudens, sed *irrationalis & stultissima* esset dicenda, si in homine, præsertim sapiente (dum sagacissima ingenia sæpe hoc morbo afficiuntur) ad sanguinem abundantem expellendum, *vasa pulmonis, visceris adeo nobilis, & ad vitam & sanitatem adeo necessarii*, tanto cum vitæ periculo perrumperet; quia inde non raro tanta sequitur sanguinis profusio, ut quandoque una cum sanguine ipsa anima effundatur; aut ob difficilem disruptorum vasorum visceris hujus, perpetuo in motu constituti, glutinationem, *ulcus sæpissime pulmonis sive phthisis & mors ipsa* subsequuntur. E contrario si anima deliberato consilio, ut Stahliani dicunt, & pro arbitrio san-

*Refu-
tatur.*

(a) In dissert. de morbis adolescentum & juvenum Hippocratis, jam Ann. 1722. 4. Helmstadii edita.

guinem abundantem in corporis sui salutem & conservationem expellere posset, *locum, unde nullum, vel saltem non adeo magnum detrimentum esset metuendum, nares scilicet vel anum, pro hac excretionem eligeret, verum hoc hic non fit, sed per pulmones, relutante etiam anima, expellitur.*

Porro si anima ejusmodi hominis, qui hæmoptysi graviori laborat, aut aliquando laboravit, quæritur, an hanc laticis vitalis incongruam evacuationem effecerit? *ejus facti non modo sibi non est conscia, verum potius contrarium affirmat, omnibusque viribus sanguinis e pulmonibus profusionem periculosam inhibere ac impedire studet.* Itaque secundum Stahlianos anima hujusmodi ægri vult & efficit hanc sanguinis rejectionem; sed si animam sive ægrum ipsum examinamus, an hoc verum sit, *anima hujus hominis hoc negat & eam potius cohibere magnopere adlaborat.* Quomodo itaque anima, *in una eademque re, velle & etiam simul anxie nolle, & duo manifeste contraria simul & desiderare & facere possit, cum sana ratione & prudenti ratiocinio nulla ratione convenire mihi videtur;* sed potius a Philosophis omnibusque prudentioribus pro re contradictoria, immo prorsus absurda habetur, quæ in una eademque rationali animali anima simul subsistere haud possit. Immo ausim asseverare, *numquam rationalem aliquam animam de excitanda suo corpori hæmoptysi vel solum serio cogitasse, saltem numquam ejusmodi vidi.* Quamplurimi contra sunt & fuerunt prudentissimi homines atque inter hos etiam Medici egregie docti, qui non modo omni animi contentione, *sed etiam remediis quibuscumque præstantissimis sanguinis hanc profusionem e pectore prohibere sibi studuerunt;* (quia animæ ipsorum eam valde noxiam & quam sæpissime funestam esse probe cognoverunt;) *verum animæ hæc frustra omnibus suis conatibus & actionibus nihil hac in re efficere potuerunt;* sanguis enim e pulmonibus, quicquid etiam egerint, prorumpere non cessavit, atque tandem propterea e vita quam maxime inviti decedere coacti sunt.

Quæ
nam

34. Unde satis patere existimo, animam rationalem non esse causam periculosissimi hujus mali, eique hanc actionem

nem jure nulla ratione tribui posse, sicut Stahliani in *causæ*
 jure faciunt: dum anima egri longe aliud, immo pro *a me-*
sus contrarium vult & agere conatur; sed aliunde caus- *chanicis*
 fas hujus mali esse repetendas. Videamus igitur nunc, *hujus*
 an Mechanici magis certas ac perspicuas, magisque ra- *mali in-*
 tionales *hujus morbi causas reddere valeant*; cum Stah- *dicentur.*
 liani non nisi causas a ratione & experientia prorsus
 alienas hic exhibuerint. Scire igitur juvabit, ex pru-
 denti ordinatione divina, ob sufficientem rationem in
 juvenibus, quibus hic morbus frequentissimus jam ab
 HIPPOCRATIS tempore observatus est, (a) ut plu-
 rimum plus sanguinis confici, quam pro eorum nutritione
 & conservatione requiritur, ut nimirum materia pro eo-
 rum uberiori incremento, sine qua alias eorum corpo-
 ra ad debitam perfectionem pervenire non possent, præ-
 sto sit. Quando vero corpus tandem non amplius ex-
 panditur, cibi tamen & potus desiderium in eis, sicut
 plerumque fieri solet, bene viget, immo *hæc ætas in-*
gluviei & voracitati plerumque indulget, hinc a ventri-
 culo & intestinis vegetis ac valentibus *plus chyli*, at-
 que a ceteris visceribus bonis ac robustis *plus sanguinis*
conficitur, quam ad conservationem eorum requiritur;
 adeoque copiosior hic chylus & sanguis vasa sanguifera
 & viscera ac speciatim pulmones, plus justo replet ac
 distendit, quem statum corporis *plethoram* vulgo appel-
 lant, id quod ratio & experientia docent, atque Stah-
 liani ipsi concedunt. Vasa etiam ac viscera moli san-
 guinis aliquamdiu & sæpe multum cedunt, antequam
 vasis ruptura aut morbus aliquis inde producat. Sed
 quemadmodum canales, per quos aquæ ducuntur, vel
 oræ rivulorum aut fluviorum, vel aggères etiam circa
 littus oceani, vel a copia aquarum nimia, vel ab im-
 petu earum, *iis præsertim in locis, ubi debiliores sunt*,
 adeoque vi aquarum minus resistunt, perrumpuntur,
 vel foramina quædam canalium minora valde dilatan-
 tur ac prorsus *diffinguntur*, ut tandem modo minor,
 modo major aquæ moles ex terminis suis erumpat. Ita
nimia sanguinis moles cor, pulmones & arterias vehe-
mentius distendens, eas ad fortio rem renixum & constri-
ctio-

(a) Vid. ejus Aphor. 29. Sect. III.

tionem excitat, aut vehementior ejus a quacumque causa agitatio, qualis esse potest, exercitatio sive *motus voluntarius fortior*, vini potus largior, salia acria aut bilis acrior in sanguine, vasa, quibus coercetur, *in locis debilioribus aut minus renitentibus saepe disrumpit*, aut foraminula eorum insensilia, quæ poros vulgo vocant, ita diducit, ut nunc minori, nunc majori copia prorumpat. Quod si in *pulmonibus contingat*, oritur hinc ille morbus, de quo hætenus egimus, nimirum *hæmotypsis*; sin alio in loco, alia hæmorrhagiæ species: id quod pro partium corporis diversa innata aut aliunde acquisita debilitate, *fortuitum plane esse* & non a naturæ Stahlianæ directione, multis rationibus vel observationibus persuademur.

Stahlia- 35. Nullo enim modo Stahlianis credere hic possu-
ni ube- mus, *evacuationem hanc sanguinis per pulmones prudenti*
rius hæc ac deliberato animæ consilio fieri; verum si sanguis ibi
ob rem prorumpit, hoc vel casu mere fortuito, *ob pulmones in*
confu- hoc reliquis partibus *debiliores* accidere, vel externis
tantur. causis eam adscribendam esse censemus. Ut enim *ca-*
nales hydraulici, per quos aquæ ducuntur, & *aggeres*
fluviorum vel oceani modo in hoc, modo in alio loco,
non certo consilio, sed fortuito, ubi vel natura debiliores
sunt, vel ibi, quo impetus aquarum maxime vergit. &
ubi accolæ hoc sæpius quam minime expectant; ita etiam
in corpore humano, ubi partes aut vasa debiliora, ut
jam dictum est, sanguinem copia & impetu vel & a-
crimonia forte simul urgentem transmittunt. Unde fit,
ut *in multis per narium vasa erumpat*; in aliis per *pul-*
mones, tamquam viscus in juventute valde adhuc tene-
rum ac spongiosum; in aliis per ventriculum, intesti-
num rectum, vel per urinae vias, aliave loca profiliat,
prout homo forte hanc vel illam præ aliis partem habet
debiliorem. Nam verissima esse deprehenditur illa CEL-
SI observatio, (ad quam Stahliani non satis atten-
dunt.) magni in Medicina usus, quando scribit: (a) *Neminem facile esse, qui non habeat partem aliquam im-*
becillem; adeoque etiam frequentissime observatur, in
eis, qui sputo cruento sunt obnoxii, pulmones vel na-
tura,

(a) Lib. I. de Medicina. Cap. 3.

tura, vel ob causſam quandam violentam eſſe debiles, atque ut plurimum ſimul ſanguinis abundantiam, ac motum ejus fortiorem, id quod ex florido faciei colore, quem plerumque hi homines, antequam nimis debiles ſunt, præ ſe ferunt, dignoſci ſolet, hic peccare. Ut de cauſſis externis, quæ hæmoptyſin producere ſolent, contuſionibus ſcilicet, lapſibus, ſaltationibus, vehementioribus aliis motibus quibuſque, vociferationibus vehementioribus, vulneribus pulmonis, &c. quæ cauſſæ omnes mechanica ratione agunt, brevitatis cauſſa nihil dicam, utpote, quæ non tantum ſputum cruentum profluere ſæpe ſolent; verum etiam pulmonibus inde ſemel debilitatis, efficiunt, ut, curata etiam ſemel hæmoptyſi, ex levi cauſſa, ob partem jam debilem, alio tempore facile redeat: eaque proſecto non ob animæ in hoc negotio prudentem aut ſalutarem actionem, ſed ob rationes mechanicas indicatas, pulmones ſcilicet debilitatos, ſanguiniſque copiam aut impetum ſuſtinere non valentes; unde facile denuo rumpuntur, & malum priſtinum redit. Igitur cum cauſſæ hic adſint adeo manifeſtæ, phyſicæ & mechanicæ, hujus morbi, quid opus eſt ad incertas, numquam probatas, immo & ſane rationi manifeſte adverſantes actiones animæ confugere, eaſque tamquam veras eruditis ac diſcentibus obtrudere velle? Nam revera illa anima, quæ hæmoptyſin induceret, dum loco ſecuriore ſanguinem expellere poſſet, merito pro ſublimiſſima eſſet habenda; quia hoc ipſo non ſanitatem, ſed plerumque interitum corpori procurat. Atque hoc modo quoque de aliis ſanguinis profluviis periculofis, ut vomitu & mictu cruento, ſentiendum eſſe judicamus; quæ potius prudentiori modo avertere deberet, ſi ipſa juſmodi vim in corpus, qualem Stahliani, ipſi reluſtanti & neganti, obtrudere volunt, haberet.

36. Progrediamur nunc ad febrium quoque cauſſam ex Febrium mente Stahlianorum examinandam. Hanc quoque nihil cauſſa aliud eſſe perhibent, quam conatum animæ, prudenti Stahliani conſilio noxium, quod ipſa in corpore cognoſceret, in na imjus utilitatem ejiciendi. Verum febrem inde quam pugnamine deduci poſſe hinc judicant Mechanici, quia tur. anima ægri, febrī quadam laborantis, neque ante accedum febris aliquid adeo noxii in corpore ſuo cognoſcit, dum

dum quamplurimos ægros inopinato invadit, neque ut plurimum in ipsa febris, quid noxii in corpore sit, aut ubi hæreat, quod eliminandum est, novit. Provocamus ad testimonium, fidem & experientiam omnium eorum, qui vel semel vel sæpius febris quadam laborarunt, an anima ipsorum tale quid cognoverit? omnes enim, quos hanc ob rem examinavi, hoc negarunt, animæque ipsorum talis cognitionis aut scientiæ haud erunt consciæ. Mirandum esset, si anima noxas tales in corpore suo cognosceret, quare non in principio & citius, quam caussa peccans in talem copiam, vel in tam malum, ut sæpe fit, morem increskeret, qualis præsertim in febribus malignis observatur, ubi multi fere moriuntur, antequam se ægrotare recte percipiunt, leviori minusque periculosa ratione in tempore, hoc est, in primo initio, illud malum e corpore expelleret.

Etiam in febribus intermittibus. 37. Præterea in febribus intermittibus paroxysmus ægros sæpe tempore quam maxime incommodo invadit, ubi ægri, præsertim Magnates, aut qui his sunt a consiliis vel auxiliis, vel belli Duces, alique haud raro gravissima negotia expedienda habent. Si ab anima actus ille paroxysmi dependeret, anima prudens vel alia ratione a malo illo se liberare studeret; vel saltem, si sine paroxysmo negotium hoc expedire non posset, alio eoque magis opportuno tempore, quia in intermittibus plerumque non adeo magnum periculum est in parva mora, eum institueret, dum ab anima, secundum Stahlianorum sententiam, tota res dependet. Verum ægri, licet hoc quam ardentissime sæpe velint, tamen illud omni animæ vi, conatu & sollicitudine obtinere nequeunt; sed paroxysmus statò tempore redit, sicut in horologiis statò suo tempore hujus vel illius horæ numeris, secundum mechanicas horologii leges, insistit. Itaque potius ille reditus regularis paroxysmi mechanicas magis rationes, quemadmodum horologium, veru automatum, clepsydra, aut aliæ similes machinæ, habere videntur, quam animæ directionem; qua vero de re infra plura. Quomodo enim ab hac oriretur, quia anima hominis libero arbitrio prædita est, ut ille qui sui juris esset, paroxysmum talem eo tempore institueret, quo ipsi minime molestum esset? Verum hoc animæ suæ voluntate &

imperio efficere non valet. Anima igitur ejusmodi hominis maximo sæpe ardore ac molimine vult, (quod Stahliani negare non possunt) ut *paroxysmus febris* vel omnino avertatur, vel ut saltem in magis opportunum tempus differatur; Stahliani contra quoque dicunt, animam ejusmodi hominis re vera illum paroxysmum, eundemque prudenti deliberatione atque consilio concitare: itaque una eademque anima eodem tempore, secundum Stahlianos, paroxysmum vult & non vult, ideoque duo contraria in una eademque re & uno eodemque tempore desiderat, id quod profecto absurdum ab omnibus Philosophis habetur, atque ab una eademque anima prudenti & quidem tam sæpe proficisci posse, nulla ratione verisimile videtur: præsertim cum id fiat, quod anima manifeste non vult.

38. Atque idem absurdum haud adeo difficulter ex convulsionibus & epilepsia ejusque horrendis ac periculosissimis paroxysmis, itemque ex inflammationum, angine, ophthalmie, peripneumonie, pleuritidis, apoplexie, vigiliarum involuntariarum, abscessuum, fistularum, strumarum, tumorum cysticorum, dolorum, calculorum, suffusionum, herniarum, aliorumque quamplurimorum morborum generatione demonstrari posset; quos omnes tamen Stahliani promiscue ab animæ voluntate & prudenti ejus directione in salutem corporis produci perhibent, atque contra omnem sanam rationem credenda tironibus commendant: quamvis hæc sententia, ut sæpius jam monuimus, ab ipsis non solum non probari, sed potius contrarium, sicut modo de febribus earumque paroxysmis diximus, quod scilicet ex mechanicis & physicis causis, vitio scilicet vel partium solidarum vel fluidarum, omnes hi morbi oriantur & producantur, facile demonstrari & evinci queat.

39. Ut tamen veram, aut saltem magis, quam Stahlianorum est, verisimilem sententiam de causa febrium, ex certioribus physicis & mechanicis fundamentis, producamus, ex phænomenis earum judicandum; atque, cum in omni febre motus cordis atque arteriarum naturali velocior, percipitur, id quod Stahliani, experientia edocti, concedunt, aliquid præter naturam in febrium generatione in vasa sanguifera adeo-

Et va-
riis a-
liis in
morbis.

Causæ
februm
mecha-
nicæ in-
dicantur.

que & in cor ingredi, (quod Stahliani quoque non negabunt,) quo illud, præsertim quia intus sensili tunica investitur, una cum arteriis, ad frequentiores motus excitatur, unde motus sanguinis necessario augetur; ab aucto vero isto motu, & attritu vasorum globulorumque sanguinis inter se oritur (sicut vulgaribus mechanicis experimentis quam plurimis constat) calor auctus, quem præter naturam vocamus, atque ex hoc postea siccitas oris & faucium, unde tandem reliqua febrium accidentia, ut sitis, dolor capitis, vigiliæ, anxietates, inquietudines, deliria, aliaque symptomata, immo & ipsa mortis causa haud adeo difficulter deduci poterunt.

Et uberiorius probetur, consideremus paululum causas febrium primo ex nonnullas remotas, ex quibus febres sæpe sequi, experientia, optima rerum magistra, jam dudum docuit. Oriuntur nimirum febres, & intermittentes & continuæ, sæpe post iram, quod forte nemo negat. In ira bilem, quæ liquor est in statu secundum naturam jam sanguine acrior, longe majorem adhuc acrimoniam acquirere, morsus hominum aliorumque animalium ira perculsorum, satis evincunt. Quando igitur acrior ejusmodi bilis post iram vehementem, eaque majori, quam par est, copia in sanguinem impellitur, facile concipi potest, quod cor atque arteriæ, partes egregie sensiles, fortius quam alias, atque eodem fere modo irritentur, ac si acre quid in oculos incidit, qui inde in contractiones frequentiores adigitur, quibus anima resistere non potest; quæ etiam prius haud cessant, quam causa illa irritans rursus ex oculo expulsa vel ita correctæ est, ut stimulare amplius nequeat. Si itaque aliud ejusmodi irritans præter naturam in sanguine hæere cogitas, simili ratione cor & arteriæ, aliæque partes sensiles in frequentiores contractiones, etiam contra animæ voluntatem sollicitantur, quæ adeo vehementiores erunt, quo vehementior illa causa irritans est, quæque etiam non prius cessant, quam irritans illud vel correctum & ad blandum morem redactum, vel e corpore eliminatum sit; vel donec ægrum, si corrigi aut expelli non

pos-

possit, interfecerit. Posse vero bilem aut alios humores acriores partes prædictas in motus vehementiores & p. n. concitare, uberius probamus ex eo, quod sæpissime post iram ventriculus vel ad vomitum, vel intestina ad fluxum alvi, immo haud raro ad choleram ea stimulentur; ubi humores acres & per vomitum & per alvum vehementissime rejiciuntur: qui vero morbi omnes, ablatō stimulo illo irritante p. n. ut experientia & præstantissimi quique practici testantur, tolluntur.

41. Febres quoque, sive motus illi cordis & arteriarum frequentiores, cum calore p. n. sæpe concitantur a ex crapula, sive copiosiori vini aliarumve inebriantium potione. Hæc enim cum particulas acres irritantesque liisq̃ue larga copia possideant, in promptu ratio est, cur cor & arterias ad illos motus velociores excitare, atque sic febrem producere valeant. Cum vero & aliis quam plurimis causis, ejusmodi irritantia in sanguine produci queant, quæ cor contra voluntatem animæ irritare aptant, immo spinæ infixæ, festuæ ossium aut aliæ res p. n. in vulneribus hærentes & nervos irritantes febres concitent, patet inde ex aliis jam dictis rationibus quam manifestissime, Stahlianam hypothesin circa febrium causam, valde incertam, aut prorsus falsam esse; cum cor, ut probatum est, agat contra voluntatem animæ: e contrario Mechanicorum sententiam ex observationibus certis, phænomenis, causis, itemque ex effectibus clare demonstratam esse.

42. Quemadmodum vero varia in sanguine acria febrem producere possunt, ita & sanguis tenax, & viscidus mechanica quoque ratione eam concitare valet, sicut demonstratu haud adeo difficile est, atque ex eadem hac causa ratio paroxysmorum, qui in febribus intermittentibus occurrunt, egregia quoque dari potest. Viscidum vero in his febribus sæpe; si forte non semper, peccare prudens & expertus Medicus facile negare nequit; dum id rursus probant causæ remotæ, ut victus errores, cibi crudi, duri, crassi, viscidi, difficilis concoctionis, iique præsertim magna copia assumpti & non probe digesti; deinde vomitus & rejectio materiæ valde tenacis ac viscidæ; denique stagnationes humorum in minimis vasis, ac præsertim cutis; unde

ob motum ibi sublatum pallor & frigus itemque os ficcum & sitis oriuntur. Quando autem vasa minima a materia illa viscida, quæ sensim parietibus minorum vasorum adhæret, fere obstructa, adeoque sanguis a corde projectus libere ea transire nequit, majori copia, quam par est, in arteriis & in corde tandem accumulatur; hæ partes necessario inde solito magis distenduntur, fibræ autem earum nerveæ musculosæ & elasticæ, quo magis distenduntur, eo magis renituntur & ad contractionem instigantur, ut ex mechanicis patet, adeoque eo fortius reagunt, ac simul eo fortius etiam in sanguinem viscidum agunt, eum vehementius commovent, exagitant, compellunt, comminuunt, calefaciunt, atque tandem comminutum rursus propellunt. Hinc eo tempore frigus ægri mutatur in calorem; pulsus parvus in magnum ac frequentem, hisque aliquamdiu continuatis, humoribus viscidis sic rursus *digestis ac resolutis*, tandem in toto corporis ambitu *tantumquam resolutionis effectus*, prodit sudor copiosus, & cum *urina multæ particule crassæ, viscidæ, terrestres*, lateribus tritis sæpe similes, expelluntur, quæ demonstrant, sub actu hoc mechanico sanguinem crassiores non solum atteri ac digeri; verum etiam ipsum re vera rursus fuisse digestum & attenuatum, atque simul quoque magnam noxiæ materiæ febrilis copiam & per sudorem & per urinam rejectam. Quo facto, dum, *libero circulo sanguinis iterum restituto*, illa cordis atque artiarum distentio violenta cessat, *cessat etiam violenta illarum contractio*; pulsus fortior & calor p. n. in statum naturalem redeunt, atque *sic paroxysmi finis est*.

De reditus paroxysmorum ratione. 43. Quando autem, hoc absoluto, nova ejusmodi materia vitiosa ex primis viis, quæ ex erroribus diætæ ibi genita est, ut e ventriculo, vel intestinis, hepate aut vesicula fellea, vel etiam ex pancreate, glandulis intestinorum, aliave quacumque parte, per vias consuetas chyloferas ad sanguinem influit, parva quidem copia ad stagnationem ejus producendam non sufficit, adeoque nec paroxysmum mox producere potest. Quando autem sensim sensimque in vasis sanguiferis *materia illa noxia magis augetur*, (id quod ad certam ac sufficientem copiam in ea vehendam certum tem-

opus requirit,) fit, ut determinato tempore tandem novus paroxysmus rursus producat, & ut ægri jam ante paroxysmum lassitudinem, oscitationes & pandiculationes, tanquam initia obstaculorum liberæ circulationis persentiscant, donec tandem ipse novo horrore & frigore, ut antea, ægrum invadat. Sed hæc ex pathologia, ad demonstrandum, quod Mechanica Medicina Stahlianam præstantia superet, tetigisse hic sufficiat. Pergamus ad therapiam sive Medicinam practicam, ut ex hac quoque eminentiam ejus ostendamus.

44. Quoniam vero in præcedentibus satis evicimus, *Stahlia* primaria de animæ in corpus potentia fundamenta non nisi falsas aut dubias esse hypotheses, quas probare aut evidentes ac certas reddere nondum potuerunt, idcirco forte non opus esset, ut speciatim hic ea adhuc uberius refutem, quæ in curatione morborum aducis hisce fundamentis superstruuntur. Verum ut tanto melius Mechanicæ Medicinæ & in curatione, tanquam principe Medicinæ parte, præstantiam demonstrarem, nonnulla etiam hic speciminis loco adducemus, atque inter hæc prius generalia quædam considerabimus, & postea ad speciales quosdam morbos progrediemur. Inter generaliora autem Stahlianorum fundamenta merito referendum est, primo, quod animæ ejusque prudenti directioni vim omnes morbos & producendi & rursus sanandi, corpusque a morbis liberandi, audacter adscribant. Verum quia hæc vis sive potentia non magis probata est, quam quod actiones naturales & p. n. excitet, sicut in præcedentibus ostendimus; nullæ autem propositiones, aut sententiæ, de quarum veritate non constat, in rationali Medicina sint assumendæ, adeoque & hæc pro vera assumi non potest.

45. Deinde cum in scriptis Medicorum ab Hippocratis usque temporibus vocabulum NATURÆ sæpius occurrat, ut v. g. quod natura sit morborum medica, quod Medicus sit naturæ minister, quod natura cum morbo luctetur, quod bona aut robusta natura magnum in curandis morbis sit auxilium; debilis contra Medicum & egrotum in curatione deferat, atque sine naturæ auxilio nihil efficere posse; multos morbos sponte natura, sæpe sine Medico & medicamentis sanari, præsertim

Animæ vim sanandi habere, negatur.

Naturam esse animam, negatur.

apud vulgum & pauperes: hinc cum, quid hoc *naturæ* vocabulum sibi velit, STAHLIUS & asseclæ ejus intelligere non potuerint, eam tandem, contra omnem præcedentium Medicorum sententiam, in opinionem, quod *anima rationalis hæc natura sit*, venerunt, hisque duobus vocabulis *animæ* & *naturæ* pro synonymis, sicut supra jam §. 4. diximus, usi sunt, atque sic, quod Hippocrates, Celsus, alique Medici *naturæ*, id Stahlia-
ni *animæ* tribuerunt. Verum quamvis vocabulum hoc quamplurimas habeat significationes, sicut ex contro-
versia, quam Celeb. STURMIUS & SCHELHAM-
MERUS publicis scriptis quondam de hac re agita-
runt, itemque ex BAYLII Institut. physicis & aliis quamplurimis videri potest, adeoque subinde aliquam obscuritatem involvat; tamen in morborum curatione *animam* hoc nomine haud intelligi posse, ex multis pa-
tere potest documentis, quorum nonnulla tantum pro
sententia nostra roboranda nunc proferemus.

Natu-
ram fa-
bricam
corporis
esse, pro-
batur.

46. Nimirum quando dicitur, *hunc hominem gaude-
re bona aut robusta natura*, profecto anima hic nullo
modo *naturæ* vocabulo intelligi potest; sed potius robu-
stum corpus, sive, quod idem est, *robusta corporis fa-
brica*, quæ sæpe vix credenda perfert: atque plerum-
que ea gaudere dicuntur rustici ac plebeji, milites,
juvenes, &c. Contra *debilem naturam habere perhiben-
tur* ii, qui *debile corpus, sive imbecillam corporis fabri-
cam obtinent* & qui propterea multa perferre nequeunt:
atque inter imbecillos hos plerumque referendos esse
CELSUS ait, *magnam partem urbanorum omnesque pe-
ne litterarum cupidos.* (a) Si anima esset natura, *eru-
ditis potius & sapientibus natura robusta esset* adscriben-
da; id quod vero est contra experientiam, dum urba-
ni homines & litteris dediti fere semper minus robusta
natura gaudeant, sæpiusque & periculosius quoque ut-
plurimum agrotent, quam ricolæ ac plebeji, qui
duris laboribus se sustentant, atque injurias aeris ac
victus, quam imbecilli perferre non possent, sine omni
incommodo sæpissime perferunt, atque etiam, si ali-
quan-

(a) Lib. I. Cap. 2.

quando ægrotant, sæpe sola natura a morbis rursus liberantur. Adeoque ex his quam clarissime patet, in Medicina non animam, sed corporis fabricam, sive de natura robusta sive imbecilla sermo sit, & a vulgo & ab eruditis intelligi. Ita etiam juvenibus præ senibus robusta adscribitur natura, atque in illis etiam facilius omnes fere morbi, & speciatim vulnera, ulcera, luxationes, fracturæ, febres, &c. curantur: non quod anima ipsorum anima senum sit sapientior; sed quia, experientia teste, illorum fabrica corporis magis integra & vegeta, adeoque seniorum fere jam destructa robustior est.

47. Sed Stahliani regerunt, si natura corporis esset *An hæc prudentes actiones perficere queat.* fabrica, quæ in rebus mere corporeis consisteret, hanc tanta prudentia neque in statu naturali agere, neque in statu p. n. tanta sapientia noxium corrigere, atque e corpore eliminare posse, quam in morborum plerorumque curatione fieret, ergo rationale principium, anima scilicet, hoc dirigere: dum modo per hæmorrhagiam quandam, modo per sudorem, modo per alvum aut urinam, &c. illud expelleret, atque hac ratione ægrum a morbo liberaret. Verum his responderetur, eos divinam corporis humani machinam (forte ob neglectum anatomes & mechanices accuratioris studium ejusque inde pendentes admirandas vires) non satis considerasse aut intellexisse. Nam sicuti illi, qui numquam horologium & cumprimis internam ejus fabricam accuratius inspexerunt, vix credere possunt ejus effectus ex mera corporea fabrica provenire, ut minuta prima, minuta secunda, horas, dies, lunæ cursum, mensem & quæ sunt alia; verum etiam pro lubitu hominis levi externa facta alicujus tuberculi pressione, repetitionem horæ ejusque minutorum, idque toties, quoties libuerit, sono vel pulsu indicare possint, & hoc rationali principio oriri putant, sicut de Americanis referunt, cum primum Europæorum horologia conspexerint; dum omnia illa, quasi cum judicio, certo temporis spatio & ordine, ab eo peragantur: id quod vero fabricæ horologii peritis non adeo obscurum, sed conceptu facile est; qui illud non rationali principio, sed a pura puta mechanica ejus fabrica fieri norunt.

*Videtur
pruden-
tia, quæ
tamen
ea non
est.*

48. Ita quidem etiam minus *cautis videtur, ac si* *machina nostra* in actionibus naturalibus cum prudentia ageret: verum cum ille effectus, qui prudens videtur, non a prudentia machine dependeat, utpote quæ, ut horologium, licet artificiosissimum sit, nec cogitat; nec deliberat, adeoque nec prudens dici potest; sed ob artificiosam suam fabricam, quam summus atque sapientissimus Artifex confecit, actiones suas, quasi cum prudentia eas faceret, perficit, quæ tamen, ut in horologio, omnes a sola ejus fabrica & motu, quibus prudentia tribui nequit, dependent. Quod verò ut clarius pateat, sciendum, quod *omnis mutatio in corpore humano fiat per motum & fabricam partium*, ubi qualibet pars ob peculiarem ac diversam suam structuram, quam anatome, immo & externa facies demonstrant, in determinatum finem a Deo conformatum, certas mutandi vires, suæ fabricæ convenientes, ut ex physiologia jam constat, obtinet: qua ipsæ mutationes illæ non animæ directione aut imperio, verum necessitate quadam mechanica, sicut in horologio aut mola quadam producuntur; quæ quidem ordinatæ & prudentes videntur, licet revera, ut antea dictum est, non sint, sed solum a mirabili earum fabrica, variisque physicis & mechanicis conditionibus proveniant.

*Quod
uberius
exponi-
tur.*

49. Adeoque cum ab adorando machine nostræ effectore corpus nostrum tanto artificio & ad modum perpetui mobilis, sicut supra §. 20. evictum est, sit constructum, ut sine concursu animæ circulatio sanguinis, digestio ventriculi, secretiones, &c. in nobis omnino fieri queant, & quod deinde cutis, viscera & glandulæ nostræ talem a Creatore adeptæ sint fabricam, ut in statu naturali omnis generis functiones, liquidorum mutationes & secretiones, ut jam supra §. 21. 22. probavimus, perficere queant; cur non etiam, quando ve humorum copia, vel eorum parva qualitas & nominalim bilis vitiosa, vel sanguis nimis spissus, ut §. 40. ad 42. ostendimus, corrigenda & eliminanda sint, motorem primarium corporis nostri, cor nempe cum arteriis, ita in motus excitare poterunt, ut non solum his motibus nimis viscidum humores atterantur, attenuentur & propellantur, verum etiam supervacanei & noxii, sicut in

in febribus, locis modo citatis, expositum est, vel per consueta sua excernicula, cutem nempe, renes vel alvum, vel quandoque etiam per narium aliamve hæmorrhagiam *excernantur*. Nam certissimum est quod supremus conditor, qui corpus nostrum quam sapientissime ita fabricavit, ut in statu sano, ope suæ fabricæ & sanguinis per tam multa viscera circuitus, humores suos in requisita qualitate sive temperie non modo conservet, sed ut etiam abundantes, inutiles aut effœtas sanguinis particulas per debita emunctoria expellat, *illud quoque ita struxerit, ut noxios etiam & superfluos humores in statu p. n. ob summam fabricæ suæ perfectionem, quam habet, ope ejusdem motus & circuitus mutare, subigere, digerere & expellere, seque ipsum hac ratione restituere valuerit*. Atque ex hoc profecto quam maximum divinæ potentiae, sapientiae & providentiæ argumentum petere licet; dum ex eo, quam egregie hæc machina non modo sanam sæpe quam diutissime se conservet, verum etiam, si forte vitium aliquod cepit, seipsam quoque suis *hiscæ viribus, a Deo ipsi datis, per meras causas sive vires naturales & mechanicas, sine animæ auxilio restituere valeat*, cognoscere licet: omnes enim corporis humani partes a sapientissimo Numine in determinatos fines & usus, tam in statu naturali quam morbofo fabricatæ, viribusque ad hos obtinendos necessariis instructæ sunt.

50. Adeo ex hætenus demonstratis omnes hodie prudentiores & Philosophi & Medici Mechanici *naturam* *nicis* hominis nil minus, quam animam, *sed re ipsa nihil quid aliud esse, quam fabricam illam artificiosissimam mechanica* *natura,* *sui corporis, nobiscum statuunt: (a) in qua mi-* *& quo* *rabi-* *sensu*

(a) Ex Philosophis, vid. Christ. VVOLFFII omniumque, qui cum eo sentiunt, scripta; ex Medicis autem non nisi SYDENHAMII, Fr. HOFFMANNI & BOERHAVII scripta, VVITTERBACHII differt. qua functiones corp. hum. & ægritudines necessitate mechanica fieri asserit; SCHREIBERI *Elementa Medicinæ*, & GROSII *Verum Medicinæ-Principium in structura corporis humani mechanica reperiundum*, Halle 1732. impressum, citabo.

vocabu-
lo hoc
utuntur

rabili modo solida liquores, & liquores rursus solida in motum reciprocum concitant, quo ipso autem motu & peculiari partium fabrica, in eo, ut in horologio vel mola certæ ac determinatæ, ex mechanica necessitate, fiunt actiones; quo autem motu cessante, cessant etiam hæ actiones, & neuter sine altero motus persistere potest. Huic etiam, quæ de ea a veteribus & recentioribus dicta sunt §. 46. egregie competunt, & quæ ea etiam omnia efficere potest, quæ tam in statu naturali quam p. n. ut modo §. 49. probavimus, ei semper tributa atque adscripta sunt. Igitur Mechanici quoque cum HIPPOCRATE, CELSO, aliisque Medicis utuntur vocabulo naturæ, verum ita ut eo non animam, sed fabricam illam corporis intelligant, eique etiam illas functiones & mutationes in corpore adscribant; quæ a Stahlianis animæ adscribuntur, ast revera a motu & fabrica ejus partium, tam in statu naturali, quam p. n. perficiuntur. Adeoque & Mechanici recte dicere possunt, quod natura sit morborum medica, quod natura cum morbo luctetur, quod hic homo robustam, alter debilem obtineat naturam, & quæ sunt alia. Quo etiam pertinet CELSI elegans monitum practicum, quando ait: (a) Ante omnia scire convenit NATURAM CORPORIS: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii calidi, alii frigidi, alii humidi, alii sicciores, alios adstricta, alios resoluta alvus exercet: quæ profecto de anima minime dici aut intelligi possunt. Quid igitur opus est, cum hæc res adeo clara sit, ad incertum, nondum probatum ac dubium prorsus actionum nostrarum principium, animam scilicet recurrere? præsertim cum hoc nullum prorsus in curandis morbis efferat usum; dum remedia nostra non in animam, sed in corpus agunt.

MechaniciMe- §1. Igitur cum corpus nostrum revera machina sive *automatum artificiosissimum* sit, & omnia, quæ in eo *dici qua-* fiunt, ex actionibus & fabrica ejus deduci possint, ne *re aliis* mo autem automati aut horologii defectus recte novit, *in praxi aut cognoscere*, multo minus corrigere rite potest, nisi qui *præstent. structuram ejus atque actiones singularum partium probe* cal-

callet, atque imprudens ille merito suo judicaretur, qui horologium nobile ac pretiosum rustico cuidam aliive rudi in his rebus homini reficiendum committeret. Ergo cum *veri Mechanici Medici*, qui semper *simul Anatomici & Physici*, ob tanto meliorem corporum naturalium cognitionem, *esse debent*, partium corporis situm, figuram, nexum, communicationem cum aliis partibus, structuram, actionem & usum optime sciunt, *sine dubio in curatione illis præstant*, qui hæc ignorant, aut ob ignorantiam, vel ob præjudicatam opinionem proterve contemnunt; de quibus vero recte dici potest, artem non habere osorem, nisi ignorantem: id quod quamplurimis, ac potissimum *ex Chirurgia*, tamquam parte Medicinæ, *depromptis exemplis*, ex quibus nunc solum luxationes, fracturas, gravia vulnera, suffusiones & fistulas oculorum, hernias, calculum vesicæ nominare sufficiat, quam *manifestissime demonstrari potest*.

52. Porro Stahliani tamquam fundamentalem regulam practicam assumunt; *naturæ ductum in morbis esse sequendum, & Medicum non nisi naturæ esse ministrum*. Sed quemadmodum jam dudum multis rationibus & exemplis, in dissertatione *de Medico naturæ Domino* (ad quam lectorem brevitatis causa nunc remitto) hoc posterius, quam tritum & verum illud etiam multis minus cautis visum est, falsum esse docuerim, & quod *Medicus potius Director ac Dominus naturæ esse debeat*, demonstraverim; ita paucis hic examinabo, *an prius illud pro certa & firma regula*, cui cum Stahlianis promiscue fidere possimus, in medicina facienda *assumendum sit*. Haud quidem ignoramus, hoc dictum a Medicinæ Parente, HIPPOCRATE provenire; verum postquam cum CARTESIO jugum auctoritatis excussimus, HIPPOCRATI (adeoque & aliis) *non aliter credendum, quam ubi ejus præcepta cum ratione & experientia conveniunt*. Nam ejus præcepta atque aphorismos quam plurimos *non in universum, sed solum in certis casibus certisque limitationibus, vera esse*, experientia & quamplurimi egregii Medici jam dudum observarunt.

Ductus naturæ non semper sequendus.

Ubi sequendus.

53 Mechanicus igitur Medicus & hoc & alia ejus-

mo-

modi præcepta non sequitur, nisi ubi ea cum ratione & experientia probe convenire didicit. Ut e. g. quando in febre, aut post errores in victu, æger quidam de sapore amaro, nausea & conatu vomendi conqueritur, ratio autem & experientia sæpius docuerint, vomitum in ejusmodi casibus ad vitiosum ex primis viis ejiciendum, prodesse, ductum naturæ recte hic sequitur, quæ indicat, noxium ad superiora vergere, adeoque remedium pro hoc excitando idoneum merito ei exhibet. Deinde quando morbus occurrit, ubi cognoscimus, naturam vitiosos humores vel sudore, vel exanthematibus per cutem expellere velle, ob eandem modo dictam rationem ductum hunc, jam in aliis multis ejusmodi casibus utilem observatum, & regimine & medicamentis convenientibus, recte sequitur. Porro si in dolore capitis; vertigine, oculorum & aurium inflammatione, variolis ut & calore p. n. qualicumque, sanguinem e naribus prodire observat, quia hæc excretio in ejusmodi malis, (nisi forte nimia sit) plerumque salutaris observata est; eaque natura a noxio vel abundante sanguine se liberat, eam non impedit, sed promovere satagit; atque idem etiam in plerisque casibus de mensium & hæmorrhoidum fluxu; itemque de multis alvi fluxibus facit: ita ut illud Hippocraticum, quo natura vergit, eo ducenda, per loca scilicet convenientia, (a) probe observetur. Verum quia multi casus & exempla, quæ contrarium quoque evincunt, facile afferri possunt, sequitur inde hanc regulam non pro universali, neque adeo simpliciter, sicut a multis Stahlianis proponitur, habendam; sed per prudentiam practicam multis incasibus magnopere limitandam esse. Imprimis vero genuinus Medicus ex historiis morborum & felicibus curationum successibus probe perspectis, nosse debet, ubi, aut quibus in morbis ductum naturæ sequi, & ubi eum non sequi conveniat; alias ipsum sæpissime graves in errores deducet. Si enim in machina nostra omnia, sicut decet, tam in sanitate quam morbis succedunt, ut bonus eques aut auriga, cujus equi officium suum ri-

te

(a) Vid. Sect. I. Aphor. 21.

se perficiunt, nihil mutare; sed naturam recte agentem sibi relinquere debet; quia alias tantum turbaretur; id quod etiam in bono horologio est observandum. Sin-
 tero aberrat & quidem tantum parum, blanda ratio-
 ne in rectum tramitem est reducenda: nam multis in-
 casibus, id quod etiam probe sciendum, natura blan-
 te duci, sed vi non vult cogi. Quando autem malum
 est vehementius, ut leni modo scopum assequi non va-
 eamus, tunc, ubi medicamenta parum sunt, ferro &
 igne sæpe cogenda, juxta HIPPOCRATEM: Quic-
 quid medicamenta non sanant, ferrum sanat; quod fer-
 rum non sanat, ignis sanat; & quæ hæc non sanant,
 insanabilia sunt habenda. Aphor. 6. Sect. VIII.

54. Ut igitur quam falsa & inepta hæc de natura Ubi eum
 sequenda sit Stahlianorum doctrina practica, per exem- non se-
 pla demonstrem, sumamus rursus hæmoptysin, morbum qui con-
 otissimum, de qua non solum, ut supra jam dixi- veniat,
 nus, asseverant, illam esse excretionem sanguinis noxii; exemplo
 prudenti: (si Diis placet) natura, in salutarem finem hæmo-
 constitutam, ad corpus a sanguine illo liberandum: im- ptysis,
 no ut hoc magis probent, etiam dicunt, animam ma- ostendi-
 nos labores per motus tonicos, & nescio quos alios, im- tur.
 tendere, ut sanguinem corpori illi molestum ad pulmo-
 nes compellat: adeoque hinc spirandi difficultatem,
 palpitationes cordis, angustias præcordiorum, tussim &
 alia mala inducere, donec tandem scopum suum, per-
 umpendo pulmones, assecuta sit, & sanguine pleno agmi-
 ne per illum rejecerit. Nunc gaudent Stahliani & qua-
 tripudiant, quod anima ipsorum tam feliciter finem
 suum consecuta sit, & tam nobilem sive heroicam prorsus
 actionem perfecit, laudantque quam maxime ejus
 prudentiam & providentiam, quam pro sanitate hujus
 hominis in procuranda hac sanguinis excretionem adhi-
 buerit. Verum cum eventus hujus excretionis sæpissime;
 ut supra jam diximus, funestus sit, phthisinque per-
 quam frequenter atque mortem post se trahit, hunc
 ductum naturæ sequi stolidum potius, atque a sana ra-
 tione alienum, adeoque omni modo, quia non fit per
 modum convenientem, prout Hippocrates hoc requirit,
 vitandum esse cum sanioribus Medicis Mechanicis esse
 arbitramur.

Quomo-
do Me-
chanici
eum con-
siderent.

55. Quid itaque Mechanici in hoc morbo agant, & an eorum sententia atque curandi modus melius cum sana ratione & experientia conveniat, prudentibus judicandum paucis nunc proponemus. Accidit nimirum aliquoties, ut mihi ejusmodi ægri, quos Stahliani antea tractaverant, curandi offerrentur, quibus hi Medici egregie quidem *illam salutarem*, ut vocabant, *animæ* in excitando hoc malo *actionem laudaverant*, multaque remedia ad hunc naturæ ductum, ut fideles ejus ministri, juvandum, adhibuerant; verum his ipsis, redeunte sapius hæmoptysi, tantopere tandem debilitati & ad incitas redacti fuerunt, ut mortui magis quam vivi hominis imaginem referrent. Quoniam vero cognitu facile est, *temere hic agi, si qui ductum hunc naturæ sequi aut juvare velit*, qui a prudenti directore anima; *quia per locum convenientem non fit*, minime oriri potest; dum illa alia potius ratione, si in ipsius potestate hoc esset, alioque in loco a se noxio liberaret, quam in adeo periculoso: sed potius ex hoc ipso actu contra Stahlianos cognosci posse existimo, *malum hoc non ab anima, sed ex caussis mere mechanicis oriri*, sanguinemque per ea loca erumpere, ubi vasa sunt debiliora. Itaque & hic minime ductum hunc naturæ sequi consultum duco; sed potius omnem primo curam eo dirigendam esse puto, ut *copia sanguinis alia via aliaque ratione imminuatur, sanguinis motus vehementior temperetur, impetus sanguinis a pulmonibus avertatur*, atque tandem pulmo læsus probe rursus glutinetur ac roboretur.

Quomo-
do eum
curent.

56. Ad copiam igitur sanguinis minuendam per manifestas rationes mechanicas egregie confert primo *parca victus ratio*; deinde *sanguinis per venas detractio*, ter vel quater, pro diversa ægrorum natura, per annum instituta; ac denique ob eandem causam *frequens, sed blanda per alvum evacuatio*: quæ vero medicamentis *calefacientibus*, quæ sanguinem exagitant; qualia sunt aloetica, myrrhata & similia resinosa, immo & ipsæ adeo a Stahlianis decantatæ *pilulæ Beccherianæ & Stahlianæ*, quas tamen in plerisque fere morbis, tamquam panaceas extollunt & commendant, *fieri non debet*; sed potius temperatis refrigerantibus, e.g.

deco-

lecoctis ex tamarindis, foliis sennæ, rheo & manna aut similibus, convenienti copia sæpius adhibitis : quippe quibus egregiam utilitatem in his ægris sæpius expertus sum, præsertim ubi jam novas in pectore congestionem ac molestias, quæ novam rupturam in pulmonibus minabantur, perceperant. Præterea quoties liquorem calorem p. n. sive sanguinis quasi ebullitionem sentiebant ægri, quæ ab acri alcalico vel bilioso sanguine, aut etiam a nimia vi elastica solidarum oriri solent, remedia temperantia & spasmos sive rigiditatem brachiorum minuenda, qualia sunt lap. cancror. aut contharæ acido citri saturati, salia media, præsertim tartarus vitriolatus, arcan. duplic. nitrum & cinnabaris, in pulverem redacta, bis vel ter in die ad drachmam dimidiam, ex aquis refrigerantibus jubeo, donec illa materia remittant. Pro pulmonibus denique læsis sanandis & corroborandis, infusa herbarum traumaticarum, ut veronice, scabiosæ, tussilaginis, pilosellæ, solidaginis, faniculæ, cum radice glycyrrhizæ & malvæ, itemque datylis, passulis & ficibus remixtis, ad modum herbæ theæ, bis vel ter in die, tepide, interpositis subinde blandis balsamicis, haurienda præcipio, eisque, præsertim ubi ægri a victus erroribus quam solertissime abstinuerint, modiceque corpus quotidie exercuerint, non paucos, qui mortis vicini videbantur, Deo benedicente, hoc modo restitui. Atque hæc ipsa quoque opera sunt, atque agenda in vomitu & mictu cruento.

57. Eandem fere & curandi & præservandi rationem in eis observo atque observandam suadeo in illis, qui tonsillarum & faucium inflammationi, aut ophthalmiæ, otalgia vel odontalgia, ob sanguinem abundantem sæpe obnoxii sunt, quos omnes morbos salutari naturæ intentioni adscribunt Stahliani. Adeoque quia in his, secundum hos naturæ intentio est, a nimia sanguinis per hæmorrhagiam narium vel per abscessum sese liberandi copia, juxta eorum doctrinam minister naturæ ductum hunc naturæ sequi deberet. Verum quam incerte ac difficulter hic scopus his in morbis per artem, ne metu graviora mala ægris inducendi, obtineatur, illi optime sciunt, qui in Medicina & observationibus faciendis ætatem fere consumserunt; non ve-

*Ductus
naturæ
sequen-
dus in
inflam-
matio-
nibus.*

ro illi, qui hypoteses in museo ex ingenio fingunt.

Rectius ergo longe & securius omnes ii morbi curantur, *si ductum illum naturæ non sequimur*; sed ut Medici rationales Mechanici, qui experientiam simul semper considerant, agimus. Exempli loco *in faucium inflammationibus*, quia prudenter rem ponderando cognoscere licet, minime sapientis naturæ institutum esse posse, per valde dolorificam *inflammationem* aut *abscessum* harum partium, qui sæpe maximis doloribus & suffocationis periculo comitati sunt; corpus a nimia sanguinis copia, quia plerumque *vix dimidiam puris unciam continet*, liberare velle; quippe a qua exigua quantitate tanta mala non essent pertimescenda: id quod & de *aurium*, *dentium* aliarumque partium inflammationibus & abscessibus intelligi debet. Sed oriuntur potius hi tumores *ex mechanicis & physicis causis*, quando v. c. *cuidam hæ partes natura sunt debiliores*, sicut sæpe homines videmus, qui a prima juventute hisce malis sæpius exercentur, & vel aliqua humorum abundantia vel ebullitio, vel spissitudo, vel aer frigidior, corpore præsertim calente, accedat, facile ejusmodi mala concitantur.

Quid
potius
facien-
dum.

58. In his igitur nullo modo ad ductum naturæ, qui nullus vel malus hic est, respiciendum, sed potius quando ejusmodi morbum imminere & humores abundare cognoscimus, sicut boni Mathematici aquas abundantes qui noxam aliquam ædificio, muro, vallo vel integro cuidam castello, urbi aut regioni inferre minantur, per alias vias a loco læso vel lædendo derivare solent; ita quoque Mechanici Medici hos humores faucibus, auribus, vel oculis ruinam vel saltem ingentes dolores, abscessus noxasque alias minitantes, ut mox dicetur, per alias vias abducunt & evacuant.

Quid
potius
facien-
dum.

Præterea ad humores in faucibus hærentes dissolvendos sæpe prodest vel solum *infusum herbe theæ* vel aliud simile sæpe haustum & *gargarisma resolvens*, quale egregium & euporisticum paratur ex spiritu vini & aqua flor. sambuci vel solis, vel pauca *salis ammoniaci*, vel *nitri* aut *aluminis admixta* quantitate, vel aliud ejusmodi, tepide sæpius adhibendum, præsertim si si-
mul

mul pulvis temperans ac resolvens §. 56. aliquoties in die assumatur ; atque victus & aeris conveniens regimen fervetur . Sequenti die , matutino tempore , si prædicta ad malum digerendum forte haud suffecerint , egregio cum successu ad humores in faucibus vel auribus congestos avocandos ea *potiuncula purgans* , quæ eodem loco indicata est , usurpetur , post cujus usum ejusmodi mala sæpissime sublata , & per alvum educta esse novi , ut aliis remediis haud opus fuerit . In casibus vero , *ubi major calor p. n. in sanguine , faucibus , auribus vel oculis percipitur* , vel eodem adhuc die , prætertim circa vesperam , quando malum a prædictis non minui observamus , *sanguinem per cucurbitulas* sub auribus , in collo , & *in dorso adhibitas* , (pedibus simul in pediluvium tepidum revulsionis gratia immisis) quam saluberrimo consilio evacuare ac simul revocare , & sic hominem ut plurimum his in integrum restituere possumus . Hoc si forte sequenti die nondum factum sit , vel *potiuncula laxans* , si ante cucurbitulas nondum fuerit adhibita , vel venæ sectio in pede aut brachio magno cum fructu adhibetur , iisque ipsis *hæc mala plerumque* quam felicissime tolluntur , quamvis nullo modo ductum nature sequamur .

59. Pleuritidem , peripneumoniam & spirandi difficultates nonnullas Stahliani , licet quamplurimas alias pleuritidasque manifestas causas habere possint , *sapienti tamen de duobusque sue nature directioni eas adscribunt* , cujus intentionis esset , *sanguinem vitiosum vel abundantem* , quem sic congestit , per *sputum cruentum e pulmonibus expellere* , quæ vero ob certa & sæpe haud cognita obstacula , scopum suum assequi non posset , adeoque sanguis in pulmonibus , ac pleura hæreret , atque sic inflammationes in his partibus prædictosque morbos produceret . Sed præterquam quod haud verisimile sit , *sapientem animam sanguinem noxium ad organa vitæ primaria , summo cum vitæ periculo compellere* , ille profecto , qui hanc ipsorum doctrinam sequi velit , efficere debet , *ut in omnibus hisce malis hæmoptysin produceret* . Verum periculosa & sana ratione aliena hæc esset curatio , partim ex iis , quæ de hæmoptysi modo §. 54. diximus ; partim ex eo , quod ipsi prudentiores Stahliani

ni ab hac curandi ratione recedant, atque experientia edocti aliam curandi viam in his malis, quam hypotheses eorum requirunt, sequantur.

Quomodo procedendum. 60. Quid igitur faciunt in pleuritide exquisita & peripneumonia, itemque in spirandi difficultate, quæ a copioso & viscido sanguine, circa præcordia hærente, oriuntur, Mechanici? Abundantem & viscidum sanguinem hic congestum partim per largas sanguinis missiones a pectore revocare, partim diluentibus & resolventibus medicamentis reliquum resolvere & in motum naturalem redigere student. Efficitur hoc, ut in præcedenti §. dictum est, *infusis herbarum resolventium moderate calidis, pulveribus §. 56. laudatis diaphoreticis resolventibus atque camphoratis, immo & essentiis ac potiunculis ejusmodi temperantibus his subinde interjectis, cum regimine blando diaphoretico & potu sufficienti aqueo, subacidulo; atque externe, fomentis calidis digerentibus, præsertim aqua vel lacte calido, vesica incluso*. Quibus ipsis, si stagnantis sanguinis qui obstructionem vel inflammationem fecit, resolutio obtinetur, quemadmodum sæpissime fit, etiam morbus tollitur. Quia vero *Stahliani* hos morbos fere eadem ratione curant, quis non perspicit, quod in his & similibus pluribus aliis malis, si recte curare velint, necessarium sit, ut hypotheses suas deferant, illosque ductus naturæ, qui ad curationes noxias deducunt, pro erroribus naturæ, ad quos tunc, tamquam ad asylum confugiunt, declarent, atque, secundum rationalem mechanicum modum curationes suas instituant?

Mechanici nulla absolute supponunt. 61. Atque idem quoque in quamplurimis aliis morbis, si limites dissertationis hoc admitterent, & speciatim in vomitu ac mictu cruento, lue venerea, herniis, visus & auditus vitiis, tumoribus, scrophulis, carcinomatibus, &c. facile ostendere possem. Interea tamen ex his pluribusque similibus, præstantia Medicinæ mechanicæ elucet, quæ nusquam adeo incertis, absonis & contradictoriis, ut vocant, hypothesis nititur; sed omnia secundum mechanicas leges, sanæ rationis scilicet & experientiæ normam, instituit, ut vel ipsi *Stahliani* ad eorum methodum sæpe confugere cogantur, quando suppositam naturam vel animam ipsorum errare,

ne & ipsi simul hic graviter errent, deprehendant. Pergamus itaque, ut nonnullas hic adhuc ex præcipuis Mechanicorum curandi regulis exhibeamus, ex quibus prudens facile, quod rationales sint, judicare poterit.

62. Si partes solidæ sunt nimis laxæ aut debiles, eæ, vi contrariorum, (nam universalis fere regula practica est, contraria contrariis curanda) sunt roborandæ; sin nimis adstrictæ & rigidæ, relaxandæ. (a)

2. Si cohesio sive unitas soluta, ut in vulneribus & fracturis, eæ rursus sunt conjungendæ & conjunctæ ope fasciarum & quiete servandæ; ita beneficio circuli sanguinis affluunt humores idonei ad partes læsas rursus glutinandas. Deus enim pro immensa sua sapientia, partes nostri corporis ita fabricavit, ut in ossibus succus osseus, qui in callum abire & ossa fracta rursus glutinare potest, vi fabricæ ipsorum præparetur & separetur, qui etiam ea glutinat; in musculis autem, cute & reliquis mollibus partibus succi quoque ipsarum naturæ conveniens, ita, ut frustraneum prorsus sit animæ directionem dubiam, quæ hoc efficiat, cum Stahlianis hic advocare, atque ejus hac in re sapientiam aut vim, quam non habet, collaudare; cum ex sola harum partium fabrica & generatione hoc secretionis & glutinationis negotium satis apte explicari comprehendique queat.

3. Si partes naturales clausæ aut p. n. coherent, illæ sunt dividendæ & divisæ servandæ. (4.) Si ex situ naturali dejectæ, sicut ossa in luxationibus, intestina in herniis, uterus in uteri prolapsu, &c. in naturalem situm & ordinem sunt redigendæ, atque in eo quoque, quantum satis est, continendæ. (5.) Si quid in corpore abundat aut supervacaneum adest, illud qua fieri potest, commodissima ratione auferendum; sin deficiat, addendum. (6.) Si mala aliqua conformatio corporis peccet, ea est emendanda; quæ vero omnia non melius, quam mechanica ratione, præstari posse, res ipsa loquitur.

(a) Hanc regulam veterum Medicorum de laxo vel stricto & Stahliani Mechanici Medici diligenter & recte, quia valde rationalis est, inculcare solent.

Leges
mecha-
nicorum
curandi
in soli-
dis.

In flui-
dis.

63. Deinde *in partibus fluidis peccantibus* in univer-
sum quoque apud Mechanicos Medicos generalis valet
illa regula, *contraria contrariis curantur*: ut si sanguis
abundat atque morbos creat, aut creare minatur, hi,
ut alii Mechanici, qui, ubi nimiae aquae loco cuidam,
quem satis roborare nequeunt, noxam intendunt, eas
vel minuunt, vel ad alia loca deducunt, sicut §. 58.
dictum est, sanguinem quoque minuunt, & per alia
loca, missionibus sanguinis, purgantibus, diureticis,
diaphoreticis, sudoriferis aliisque evacuantibus educunt.
Si *ventriculus & intestina saburra sordium* aut rerum
noxiarum nimis repleta sunt, ea quoque, ut alias Me-
chanici impura receptacula & canales mundant, aqua,
vomitoriis & eis, quae per alvum educunt, expur-
gant. Si *defectus humorum* adesse percipitur, sicut Me-
chanici alii aquis aliunde adductis hunc defectum re-
sarcire, ita & Medici deficiens idoneo potu, victu &
remediis restituere satagunt. Si *prava sanguinis quali-
tas peccat*, eam quoque suis contrariis, ex physica &
chemia cognitis, corrigunt. Ubi *spissitudo*, eis, quae
humores spissos resolvunt, aqueis scilicet, decoctis,
salinis alcalicis & mediis, quandoque & mercuriali-
bus, ubi haec prodesse usus docuit, resolvitur: ubi *te-
muitas* nimia, ea lacte, gelatinis, farinosis, gummosis
&c. inspissatur. Si *humores sunt nimis salsti*, aqua &
lacte ii demulcentur; si *acidi*, alcalicis; si *alcalici*,
acidis corriguntur ac simul aqueis. Quando *in nimio
motu & calore sunt constituti*, illi motus nimii, una
cum calore p. n. minuuntur, nitro, blandis acidis,
cinnabari, potu aquae, regimine frigidiusculo. Sed si
motus sunt nimis languidi & calor deficiens, excitandi
vino, spirituosis, aromaticis, aqua cinamomi, cort.
aurantiorum vel citri aliisque similibus, varia ratione
adhibitis: quo etiam saepe referri possunt martialia,
cort. chinæ, resinæ & gummata nonnulla. Sed *natura
Stahlianæ hic prorsus nihil efficere valet*, licet haec vir-
tus præ ceteris ei ab ipsis tribuatur; nam experientia
docet, eam nimis languidos cordis motus non excitare,
& nimis celeres haud quicquam voluntate sua retardare
posse.

Quid
de spe-

64. Denique quoniam nonnulla corporis vitia vix
nisi

nisi specificis apte corrigi possunt, sicut in febris inter-
mittentibus, lue venerea, affectibus uterinis, vigiliis sentien-
tibus & doloribus nimis conspicimus; Mechanici etiam spe-
cifica remedia, quæ speciatim huic vel illi malo con-
traria esse per experientiam cognoverunt & postea et-
iam ex parte per rationemprehenderunt, haud con-
temnunt; quia omnia, quæ vel ratione vel experientia
vera atque proficua esse cognoverunt, in Medicina facien-
da assumunt, & ex præjudicio, sicut Stahliani cum
cortice peruviano, marte, camphora, opio aliisque non-
nullis contra experientiam tot egregiorum Medicorum
faciunt, non contemnunt; præsertim si debita pruden-
tia, in subjectis idoneis, opportuno tempore atque
apta quantitate, immo & præmissis, ut ajunt, præ-
mittendis, adhibeantur: dum revera, si his cum ob-
servationibus usurpantur, ut multi ex Sthalianis, qui
vel clam vel palam iis utuntur, ipsi agnoscunt, nul-
lum damnum inferunt; sed quam maxime salutares ef-
fectus, qui ab aliis frustra expectantur, exerunt.

65. Nusquam vero magis & manifestius Mechanices Mecha-
nicæ in Medicina præstantia, quam in antiquissima & præ-
stantissima illa Medicinæ parte, quæ Chirurgia appel-
latur, se ostendit: quippe omnia, quæ in hac fiunt, me-
chanica ratione contingunt, atque aliter fieri profecto
nequeunt, animæque Stahlianæ impotentia quam ma-
xime in Chirurgia cognoscitur. (a) Nam luxationes
& fracturæ ossium non nisi mechanica ratione restitui
possunt; vulnerum oræ mechanico modo junguntur &
glutinantur, atque profusiones sanguinis eorum meris me-
chanicis artificiis, ut compressione, ligatura, torculari-
bus, &c. cohibentur. Venæ, arteriæ, abscessus, fistulæ
scalpellis inciduntur, ossa cuneis, forcipibus aut ferris
rescancantur; peregrina e vulneribus & aliis locis, digi-
tis, vulsellis, forcipibus, hamis, specillis aut uncis
extrahuntur; vulnerum ac laborum leprinorum oræ acu-
tus adunantur; calvaria aliave ossa terebris, si opus
est

(a) Videri uberius hanc ob causam potest STEN-
ELI dissert. de naturæ Stahlianæ in chirurgia impoten-
tiâ, Vitebergæ. 1729. 4.

est, perforantur; luxationes subinde non nisi machinis, iisque sæpe artificiosissimis restitui possunt; scarificationes, ustiones, suffusiones, fistulæ lacrymales, aliæque multæ operationes oculorum, nasi, aurium, dentium, sua peculiaria ferramenta & artificia mechanica desiderant, id quod & de collo & dorso incurvato, pedibusque distortis in ordinem redigendis recte dici potest. An non acus illæ triangulari cuspide donatæ, quibus aquam hydropicis atque hydrocele laborantibus educimus, & vincula, quibus hernias curamus, itemque illa ferramenta, quibus urinam & calculos e vesica educimus, secundum mechanicas regulas agunt? Verbo, in omnibus his Medicus, ut prudens Mechanicus, agit: non solum attendendo ad fabricam & situm partium, ne partes utiles & vitandas lædat, sed etiam ut instrumentis suis ita uti sciat, quo nullum damnum iis inferat; verum quantum fieri potest, tuto, cito & jucunde actiones suas instituat.

Præstantia Mechanices in Medicina 66. Denique ut *Mechanices in Medicina præstantiam* paucis complectamur, asseverare hic non dubitamus, *1. quod quicquid boni & certi in doctrina de usu partium habemus*, illud omne Medicis, qui mechanice partium fabricam, situm, nexum & actionem peruestigarunt, & secundum illius leges harum usus prudenter exposuerunt, debeamus. *2. Quod & ab iis didicerimus, omnes quoque morbos ex causis mechanicis in corpore oriri*, adeoque & eos mechanica quoque ratione tollendos esse. Ex quibus simul sequitur, eas curationes, quæ principiis mechanicis non nituntur, ut quas *sympatheticas* appellant aliasve similes, nihil certi præstare & sæpe non nisi aniles sapere fabulas, sicut frequens experientia docuit. *3. Mechanici ad laudem summi Numinis docuerunt*, quod artificiosissima nostri corporis machina ab ipso tam mirabili sapientia efformata sit, ut non modo seipsam, sine animæ adjumento, quam diutissime sanam conservare, verum & sub naturæ nomine, quando male afficitur, sæpe sola rursus noxia emendare aut expellere, seque ipsam sic in statum sanum ut §. 49. ostendimus, restituere valeat. Immo *4. & Mechanicis Medicis debemus inventionem tot præstantissimorum instrumentorum chirurgicorum*, quibus complu-

plura gravissima corporis mala curare possumus, & sine quibus Medicina practica admodum manca, quamplurimi autem ægri miserrimi & insanabiles essent. Testes hujus rei sunt scriptores & veteres & recentiores, qui res chirurgicas descripserunt atque idonea ferraamenta delineaverunt, qui revera Medici Mechanici fuerunt; quos autem, ne nimis longus sim, hic recensere nolo, sed ad Chirurgiam meam lectores ablegabo; in qua quicquid fere hucusque boni in hac Medicinæ parte præstitum est, quasi in compendio videri poterit.

67. Atque sic Medicinæ Mechanicæ præstantiam, præstabliana ceterisque forte simul reliquis sectis, quæ a Mechanica recedunt, satis nos evicisse arbitramur. Potuissent quidem, fateor, omnia hæc longè adhuc uberius exponi; verum quia jam ob rerum hic dicendarum copiam prolixior fui, ut brevior sine obscuritate esse vix potuerim, hæc nunc pro argumento hoc demonstrando sufficiant, dum plura ex ipso hoc libello petere possunt; quem post diuturnam experientiam, ut ægrotis & Medicinam discantibus hoc ipso prosim, conscripsi, & ut malevolos, qui, me non nisi Chirurgum esse atque internorum morborum curationes ignorare, apud Magnates sæpe calumniati sunt, hoc ipso aliqua ratione confundam, & quænam mea sit fueritque curandi methodus demonstrarem.

Conclusio.

CONSPECTUS CAPITUM

quæ hoc in Libro continentur.

CAP. I. *De plethoræ morbis.*

II. *De febribus in universum, & speciatim de intermittentibus.*

III. *De febribus continuis, & I. acutis.*

IV. *De febribus exanthematicis, & speciatim de variolis ac morbillis, quibus purpuratæ, petechialis, & scarlatina subjunguntur.*

V. *De febribus acutis stomachicis & intestinalibus, quibusdam mesentericis dictis.*

VI. *De febribus lentis & hecticis.*

VII. *De inflammationibus.*

VIII. *De hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis.*

IX. *De hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis suppressis.*

X. *De congestionibus & doloribus.*

XI. *De cachexia & cachecticis affectibus.*

XII. *De obstructionibus.*

XIII. *De fluxibus, sive fluxionibus, iisque maxime serosis.*

XIV. *De præcipuis sensuum morbis.*

XV. *De motus læsionibus.*

XVI. *De ventriculi & intestinorum morbis.*

XVII. *De morbis sexus fœminini præcipuis.*

XVIII. *De morbis infantium ac puerorum.*

XIX. *De venenis.*

XX. *De aquarum medicatarum natura & usu.*

I

LAURENTII HEISTERI
COMPENDIUM

MEDICINÆ PRACTICÆ,

*Sive de optima morbos internos &
cognoscendi, & curandi ratione.*

INTRODUCTIO.



I quis artis salutaris Candidatos firma solidaque Medicinæ practicæ, quæ victu & medicamentis medetur, *fundamenta*, (nam de Medicina, quæ manu sanat, alibi diximus,) ratione facillima, optimaque docere satagit, ei utilissimum, immo quam maxime necessarium existimo, ut postquam *theoreticam*, quam vocant, *medicinam*, non ex fictis aut suppositis, sed ex *anatomicis*, & *physicis*, atque mechanicis principiis, tamam genuinis & veris illius *fundamentis*, probe addiderint, memoriaque comprehenderint, morborum curandi rationes, non ordine alphabetico, neque secundum corporis partes, ut haud pauci Doctores artisque salutaris Professores fecerunt, tradat, quippe quod multiplicitationibus molestis, aliisque incommodis obnoxium est; sed ita potius rem suam instituat, ut *morbos* *generales*, tamquam *species*, ad unum genus sive *classem* *continentes*, simul & sub una quoque *classe* (sicut fere re herbaria fieri solet) *comprehendat*, atque sic uscujusque classis morborum ideam, naturam, causas, signa generalia, effectus, mutationes, eventus, rationem medendi, & quid in unaquaque classe potissimum observandum, faciendum, fugiendumque sit, s generatim bene exponat; ita enim specialiorum morborum, ad quamvis classem pertinentium, naturam curatio (quæ maxima ex parte ipsis communis est,)

est,) longe melius quam in antea dictis tractandis modis Æsculapii filiis patefient, eorumque memoriæ imprimuntur, ut deinde quid in quovis occurrente ægro ac morbo optime sit agendum, facilius intelligere, rectiusque dijudicare atque efficere valeant. Hoc itaque est, quod in hoc libello, jam a longo tempore in gratiam potissimum Auditorum meorum quam facilissima ratione, attamen haud perfunctorie, neque sine magno ac diuturno labore, quia ejusmodi satis idoneum aut perfectum (a) compendium, supra dictis fundamentis superstructum, haud prostat, præstare annisus sum, atque hætenus in multis fructum ejus percepit uberrimum, speroque ut & in posterum diligentiores eum abunde sint percepturi.

C A-

(a) *Boerhavi* quidem Aphorismi egregium ex hisce principiis conscriptum est compendium; sed quia primo multos morbos & quidem admodum frequentes, & graves omittit, eorumque curandi rationem prorsus prætermittit, ac deinde scribendi genere perquam difficili utitur, quod multi intelligere vix possunt, pleniori ac faciliiori compendio tironibus opus esse judicavi.

CAPUT PRIMUM.

De Plethoræ Morbis .

I.



Um vero *quamplurimi morbi multas* Pletho-
ob rationes a plethora mihi oriri vi- *ra quid*
 deantur, quia scilicet plerique homi- *& unde.*
 nes quotidie fere plura alimenta as-
 sumunt, quam pro nutritione corpo-
 ris & vitæ suæ conservatione indi-
 gent, atque simul otio nimis, quam
 par est, indulgent, motumque cor-
 ris ac labores, sanitati adeo utiles, ac necessarios,
 permittunt, immo omni studio fugiunt; mirum non
 est, copiam sanguinis in ejusmodi hominibus plus justo
 geri sive coacervari, atque sic id, quod Græci *ple-*
oram vocarunt, generari, idcirco vasa sanguifera, ab
 nimis repleti, distendi & quasi insarciri, eamque
 minora vascula vel obstruere vel comprimere, vel,
 a vegeto corde, causisve violentis fortius urge-
 ri, ea percurrere, unde sanguinis profusiones, vel
 item circulum sanguinis expeditum ac liberum impe-
 re, cordique, propter pondus hujus auctum, valde
 sistere, ita ut necessario multis, eisque gravissimis
 malis, ut obstructionibus, tumoribus, doloribus, spas-
 mibus, profusionibus sanguinis, quas *hæmorrhagias* vulgò
 appellant, inflammationibus, febribus, convulsionibus,
 epilepsiæ, vertigini, apoplexiæ, aliisque morbis quam-
 plurimis hoc ipso ansa præbeatur: hinc a plethora
 maxime nostræ medicinæ initium facere consultum du-
 mus.

I I.

Est vero plethora vel *simplex*, quando sanguis bo-
 nus, nondum depravatus, aut vitiosus, copia solum
 accedit, sive majori quantitate adest in corpore, quam
 conservatio & sanitas requirunt, aut vasa commo-
 vere ferre, vel cor apte propellere valent; vel *complica-*
 ta, quando is spissitudine sive crassitudine notabili
 acri-

*Pletho-
re divi-
sio.*

acrimonia vel salina vel biliosa, atque inde producto calore p. n. orgasmo, aut alia vitiosa humorum qualitate simul peccat. Præterea plethora vulgo dividitur in eam, quæ est vel *ad vasa*, vel *ad vires*: illa dicitur, quando venæ a sanguine ita impletæ vel repletæ sunt, ut valde turgeant; hæc vero, quando cum abundantia sanguinis ex causis (N. I.) nata, sine notabili vasorum expansione, insignis torpor, lassitudo, aut debilitas corporis simul adsunt.

I I I.

Plethoram dari autem *plethoram*, inter alia, contra *Helmontium* ejusque affectas, patere existimo i. ex modo dictis (N. I.) de nimia satietate sive excessu in victu; 2. ex motus voluntarii & laboriosi apud plurimos defectu; 3. ex spontaneis sanguinis profusionibus, sæpissime ægros & sanos a variis malis levantibus, aut omnino liberantibus; 4. ex manifesta utilitate evacuationum sanguinis artificialium in præservatione & curatione morborum quamplurimorum, quam experientia frequens, a longissimo tempore docuit; 5. ex morbis & symptomatibus evacuationes sanguinis naturales suppressas, vel naturaliter etiam cessantes, sæpissime consequentibus; 6. ex frequentissima & manifesta noxa, quæ evacuationes sanguinis consuetas naturales suppressas, vel artificiales neglectas, brevi, ut plurimum, excipere solet.

I V.

Diagnosis. Cognoscimus vero *plethoram* adesse in homine, licet forte ejus vasa haud turgeant, i. ex *lauto victu* prægresso, imprimis si accedat simul vita otiosa; 2. ex *appetitu bono* & *facili ciborum concoctione*, dum bene se habent; 3. ex *corporis & speciatim faciei constitutione florida & rubicunda* in sanguineis; in choleris vero & melancholicis, ex venis notabiliter turgesccentibus; 4. ex *somno* in nonnullis, præsertim sanguineis & *laxo corporis habitu* præditis, multo, profundo; in choleris vero & melancholicis, inquieto, turbulento; cum *anxiis sæpe insomniis*; 5. ex *inusu corporis, artuumque torpore & gravitate*; 6. *subita defatigatione a labore, ambulatione, vel motu qualicumque inconsueto aut paulo fortiori, cum respiratione difficili, aut palpita-*

one cordis ; 7. ex vertigine , præsertim si caput subito
orsum & iterum sursum movetur ; 8. gravitate aut
lore capitis frequentiori aut diuturniori , sine alia caus-
manifesta ; 9. ex pressione & anxietatis sensu fre-
quenti circa præcordia ; 10. ex hæmorrhagiis spontaneis
pe accidentibus ; 11. levamine ex spontaneis aut ar-
ificialibus sanguinis evacuationibus ; 12. ex evacua-
tionibus sanguinis naturalibus suppressis , vel artificia-
bus consuetis neglectis .

V.

Subiecti igitur sunt plethoræ quam maxime , 1. ho-
mines victu largo sive pleno utentes & simul otiosi , aut
tæ sedentariæ dediti ; adeoque & cumprimis littera-
rii , si parco non fruuntur victu , cujuscumque etiam
et ætatis , senes æque ac juvenes ; 2. qui evacuatio-
nibus sanguinis spontaneis quibuscumque antea adsueti
erunt , quæ vero jam suppressæ sunt ; 3. qui evacua-
tionibus sanguinis artificialibus aliquandiu usi sunt , eas
postea , victu haud diminuto , ob quascumque ra-
ones intermittunt aut negligunt ; 4. qui vitam antea
activam aut laboriosam in sedentariam atque otiosam muta-
verunt , & tamen victu parciori , quam antea , non utuntur .

Quintâ
plethoræ
subiecti.

V I.

Hinc causa plethoræ primaria est victus plenus cum
otio , aut vita sedentaria conjunctus ; & deinde suppressio
evacuationum sanguinis consuetarum , sive naturalium ,
sive artificialium ; itemque transpiratio impedita , vel
orsus cohibita : inde fit , ut plethora multorum mor-
borum fecunda evadat mater , licet per se morbus pri-
mi & proprie non sit .

Causa
ejus .

V I I.

Quod ad prognosin attinet , sciendum , plethoricos fa-
cilis , adeoque sæpius morbis esse expositos , quam alios ;
recipue vero periculosos profusionibus sanguinis , feбри-
bus acutis , atque inflammationibus internis & externis ,
atque obstructionibus , distillationibus , sive catarrhis ,
asymis ac doloribus omnis generis , & quam maxime
tam mortibus subitaneis , ut apoplexiæ , catarrho suf-
focativo , polyposis concretionibus in corde vasisque san-
guiferis . Speciatim vero plethora , quæ a suppressis hæ-
morrhagiis consuetis provenit , facilius ac citius plerum-
que

Prognosis .

que morbos excitat, quam reliqua. Ita & *complicata*, ubi simul sanguis valde viscidus aut pituitosus, plures & graviores morbos producit, quam simplex; hæc enim quam maxime lædit liberam circulationem, respirationem, secretiones atque excretiones: & hinc obstructions vasorum, tumores, inflammationes & corruptiones humorum oriuntur quam plurimæ ac variæ.

Si cum *acrimonia*, præsertim alcalica, aut biliosa, atque inde nato sanguinis calore p. n. five *orgasmo* combinata est, graviora quoque, quam simplex, mala inducit, adeoque, quantum fieri potest, evitanda.

V I I I.

Præservatio & cura simplicissima. In præservanda vero & curanda plethora duo præcipue requiruntur: primo victus, five *diæta moderata* aut parca, & deinde *motus corporis frequens*; qui enim hæc rite observabit, a morbis plethoræ liber erit, & præcipua sine sumptibus aut pretio, quæ Deus gratis unicuique largitur, adversus quam plurimos hos morbos novit & possidet remedia. (a) Quia vero plerique delicatiores ac ditiores, gulæ magis indulgentes, quam sanæ rationis ductum sequentes, vilia hæc, licet efficacissima atque certissima remedia, renuunt, & ignaviæ, gulæ, ac voluptatis causa, adhibere aut observare nolunt; hinc fit, ut hi non solum quam plurimis morbis acutis & tardis corripiantur, verum etiam, ut multi eorum morbi chronici, v. gr. articulo- rum morbi, podagra, hæmorrhoides, hypochondriaca mala, obæsitæ nimia, cachexia, hydrops, respiratio difficilis, asthma, catarrhi varii, febres chronicæ ac lentæ, hæctica, calculi, &c. funditus curari in eis non possint. Oportet enim, ut divus HIPPOCRATES monet, (b) non solum Medicum, sed & ægrum, immo & adstantes suum facere officium, si optatum finem hic obtinere concupiscit.

I X.

Artificiosa magis. Quoniam autem quamplurimi, præsertim Magnatū, divitū, ac gulæ deditorum, ut modo (N.VII.) di-

(a) Confer. uberius Regulæ pro sanitate conservanda in Compendio nostro Institut. Medicar. datæ p. 14.

(b) Aphorism. I. Sect. I.

factum est, hoc non faciunt aut observant, sed victus rationem, sive uno verbo, *diætā* ac motum negligunt, & tamen a Medicis desiderant, ut eos ab ejusmodi morbis, non solum curent, sed & præservent; nam propter, quia hic diætæ neglectus plerosque morbos post se trahit, adeoque Medicis maxima confert inolumenta, (dum jam diu a priscis *intemperantia* *Medicorum* appellata est), Medicus, ut quantum in se est, ac fieri potest, sanitatis eorum curaret, alias easdemque magis artificiosas ac cariores & præservandi & curandi rationes, aliaque remedia, plethoræ adversa, tam ex pharmacā quam chirurgia, constituere cogitur: & primo quidem præservandi causæ *purgationes alvi*, sæpius, singulis circiter mensibus, & in quibusdam adhuc frequentius, pro rerum, circumstantiarum, & malorum varietate, repetitas; deinde *sanguinis missiones*, vel per *venæ sectionem*, bis in anno, ut circa æquinoctia, aut quandoque frequentius, ut ter vel quater in anno, singulis scilicet tribus vel quatuor mensibus institutam; vel etiam *scarificationes*, singulis nimirum, aut duobus vel tribus mensibus repetitas: quibus etiam tertio *sudores*, vel saltem largior *transpiratio*, sæpius, matutino tempore, in loco commode & magno cum fructu, jungi possunt. Quæ eadem etiam in *curatione morborum a plethorā*, & sanguinis abundantia oriundorum, sunt facienda, *tamen sanguinis* iusta & opportuna detractio remedium princeps est.

X.

Ubi vero plethora complicata, & *spissitudo*, sive, Si cum vulgo dicunt, *cachexia plethoræ juncta est*, tunc *viscido* iter dicta, etiam remedia hanc *digerentia* atque *attenuantia* sunt usurpanda: sicuti sunt omnis generis *incompleta*. herbarum, radicum, lignorum, corticum, aliorumque remediorum attenuantium, solventium, aromaticantium, vel grato odore gaudentium, imprimis nominatim herbæ theæ, veronicæ, betonicæ, salicis, card. bened. trifol. fibrini, saponariæ, rad. scoræ, cichorei, sarsaparillæ, chinæ, lign. sassafras, iperi, santali, &c. cum aqua fervente, infusione leni cōctione, parata; præterea omnis generis *Tincturæ*,

Sturæ, Essentiæ, & Elixiria, eandem virtutem obtinentia, cumprimis amara, atque blanda, aromatica, ut Ess. absinth. simplex & compos. fumarizæ, trifol. fibrin. card. bened. scordii, cortic. aurant. rad. gentian. amara Hallensis, pimpinelinæ, aliaque similia. Elixiria quoque varia stomachica hinc inde in officinis usitata & extracta amara; Tincturæ porro salinæ acres, ut Tinct. tartari, antimonii, tartarizata, liq. terræ foliatæ tartari, ac sæpe ipsæ *aque medicatæ* sive *minerales*, egregia sane & valentissima sæpius his in morbis remedia; quæ vero, nisi evacuatio sanguinis sufficiens eorum usum præcedat, debitaque ratione & prudentia usurpentur, parum vel nihil proficiunt, immo perverso usu potius nocent. Ceterum in curatione hujus plethoræ *viæ sit parvus*, ac moderatus, vitenturque glutinosa, viscida, pingua, dura, legumina, farinosa, & similia.

X I.

Si cum calore. Si æstus sive orgasmus sanguinis concurrit cum plethoræ, qui ab acribus, alcalicis salibus, vel & a sulphureis sanguinis particulis copiosioribus oriri videtur, tunc *medicamenta temperantia* appellata, ut lap. cancr. & conch. citrat. hisque similia quam plurima, potus aquosus, nitrosa, salia media & lenia acidula conveniunt; ut sal absinthii, card. benedicti, centaur. minor. &c. nitrum depur. nitrum regener. nitrum antimoniatum, arcan. duplicat. tartarus vitriolatus antimonium diaph. pulvis temperans noster, aliisque similis; Tincturæ acidæ, ut Tintura rosar. flor. bellid. papaveris, *spiritus acidi*, dulces reddit, & similia. *Viæ sit refrigerans & leniter acidulus*; hinc pleraque vegetabilia blanda, acrimonia fervida destituta, his optime conveniunt, immo & *usus moderatus fructuum horæorum* bene maturorum his non nocet: *carnes vero & quæ inde parantur aromata*, cibique & potus omnes *calefacientes atque inebriantes* serio vitentur.

X I I.

Si hæmorrhagie suppressæ. Si narium hæmorrhagia, menses aut hæmorrhoides suppressæ sunt, harum fluxus propriis remediis, (de quibus infra suo loco,) est restituendus: quo facto, symptomata inde producta brevi plerumque cessant, & tunc

tunc artificiales sanguinis evacuationes, si fluxus rite rursus procedat, sæpissime intermitti possunt; *sin vero hæ evacuationes sanguinis restitui nequeant*, dum quandoque omnium remediorum vim eludunt, *sanguinis missiones artificiales* (N. IX.) *substituendæ sunt*; id quod etiam fieri debet in hæmoptysi, vomitu cruento, & mictu cruento, utpote quæ sanguinis vitiosæ excretiones, quando quiescunt, minime irritandæ aut resuscitandæ; sed potius per artificiales avertendæ: quo ipso autem Medicus ductum naturæ tunc non sequi, ut multi hodie volunt, & Ministrum ejus agere, sed potius *ejus debet esse director & dominus*; ut uberius evinci in Dissertatione de Medico naturæ domino.

Monita practica.

I.

Qui frugali utitur diæta & motu corporis frequentiori, vel laboribus aut exercitationibus se frequenter exercet, dum sanus est, efficacissima possidet remedia contra plethoram, & omnes inde pendentes morbos, atque evacuationibus artificialibus vix aut raro saltem indiget.

2.

Ubi venæ sectio requiritur *plethoræ solum minuendæ gratia*, perinde mihi esse videtur sive in brachio, sive in pede ea celebretur. Interim tamen multi malunt, ut *apud juniores in brachio*, post annum vero quinquagesimum *in pede* semper instituatur; id quod tamen non est perpetuum, quia res id sæpe aliter requirit.

3.

Si hominem *morbæ plethoræ affligunt in partibus supra diaphragma*, ut in pectore, verbi causa, hæmoptysis aut respiratio difficilis; vel in capite, dolor capitis, vertigo, apoplexia; in oculis, inflammatio, &c. phlebotomia in pede revulsionis gratia utilius plerumque perficitur; *sin vero infra diaphragma*, eandem ob revulsionis causam, in brachio, nulla ætatis habitatione, sanguis educatur. *Excipiendæ tamen mensium & hæmorrhoidum obstructions*, ad quas referandas aut revocandas, venæ in pedibus sunt secandæ, quando vero nimis fluunt, revulsionis gratia, in brachio. In-

terea tamen optimo etiam cum successu in variis capitulis, oculorum, faucium & pectoris morbis, & præcipue inflammationibus earum partium, sanguis quoque e venis brachii educitur.

4.

Sanguinis missio nimis parca in homine valde plethorico nihil proficit, atque non raro febres aut arthriticos affectus post se trahit: hinc sufficienti copia pro abundantia, morbi, aut ægri diversitate, semper educatur.

5.

Phlebotomias in variis paroxysmis, ut februm intermittentium & arthriticis institutas, aut in fluxu menstruum, aut hæmorrhoidum, aut narium modico, sæpius nocere, atque naturam turbare observatum est; adeoque expectandum tunc est ut plurimum cum sanguinis detractio, si ea opus est, donec paroxysmi præterierint, atque interea medicamentis temperantibus, blande solventibus, ac diaphoreticis agendum. Attamen inde non sequitur, ut nonnulli male docent, ac si in ullo paroxysmo vena secunda sit; cum potius contra in hæmorrhagiis nimis quibuscumque, revulsione causa, summo cum fructu, immo fere necessario sæpe instituatur, itemque in asthmaticis, suffocativis, & apoplecticis paroxysmis, a plethora oriundis, sine periculo omitti aut differri solum sæpe non possit.

6.

Sanguinis missiones, quæ præservationis gratia instituuntur, magis prodesse observantur, si circa æquinoctia, vere nimirum & autumno, quam si circa solstitia vel alio tempore fiant. Attamen valde plethoricis, vel ubi consuetudo jam invaluit, præsertim in vegetis ac robustis, sæpius quam bis adeoque etiam magno cum fructu circa solstitia sanguis abundans educitur: cum primis vero iis, qui hæmoptysi, palpitatione cordis vehementi, animi deliquiis, metui apoplexiæ, mictui sanguinis, fluxui mensium vel hæmorrhoidum nimio, aliisque similibus plethoræ morbis obnoxii sunt.

7.

Qui scarificationes lubentius admittunt quam phlebotomiam, vel qui phlebotomiam vehementer, ob quamcumque etiam causam, aversantur, quales multos novi, vel

ei quibus venæ non facile incidi possunt, ii eundem sectum & utilitatem, quicquid nonnulli obloquuntur, inde expectare possunt, quam a venæ sectione, et sæpe observavi, si modo larga satis sanguinis copia educatur, eaque certis temporibus, sicuti venæ sectiones, pro indole morbi & ægri repetuntur.

8.

Qui vero evacuationibus ejusmodi per aliquod tempus sunt assueti, nisi vitæ genus quietum in mobileve laboriosum transmutent, aut victu parciori utantur, plurimum ad seram usque ætatem, licet etiam octosimum annum superaverint, eas continuare debent, ne temere prætermittunt. Falsum enim est, sanguinis missionem senibus omnibus, ut multi putarunt & adeo putant, esse noxiam; aut, ut nonnulli dixerunt & adhuc dicunt, senibus sanguinem potius emendum & in venas infundendum, quam educendum aut subtrahendum esse.

9.

Plethorici imbecilles sive valetudinarii ab abusu omnium calorem nimium sive orgasmum sanguini inducentem, tam in victu quam medicamentis, abstinere & dulo sibi cavere debent.

10.

Itemque a motu nimis violento ac subitaneo, quia palpitationes cordis, animi deliquia, apoplexiam, sanguinis profluvia, ac speciatim hæmoptysin, aliaque multa gravissima mala hoc ipso sibi concitare possunt, quædam vero & moderatæ ambulationes, unctiones, exercitationes aliæve ejusmodi modicæ exercitationes his regie conveniunt; hancque ob causam aquæ mineralis tantos sæpe multis in morbis gravibus exerunt effectus: quia homines, in earum usu, frequenti & fere continua utuntur exercitatione ac simul moderato victu, quæ profecto ad sanitatem quam maxime conferunt.

CAPUT II.

De Febris in universum, & speciatim de
intermittentibus.

I.

Febris morbus frequens. Quoniam Febres morbi sunt frequentissimi & communissimi, ita ut effato celeberrimi Sydenhamii tertia pars ægrorum febribus laboret, & secundum Veteres nonnullos, *vix sit sine febre mori*; hinc præ reliquis hic earum considerationem trademus, præsertim quia multi admodum male aut obscure de ipsis scripserunt.

I I.

Definitio ejus. Febris vero generatim nobis dicitur *calor præter naturam, sive intemperies calida, cum virium læsione, & motu cordis & arteriarum frequentiore*, prægresso plerumque horrore sive frigore qualicumque, subsequente motu sanguinis vehementiori, & ut plurimum fiti ac dolore capitis, modo leviori, modo vehementiori, cum urina plerumque tinctiori, cibi appetitus, variarumque aliarum actionum corporis humani & præcipue virium insigni, nunc tamen majori nunc minori læsione: ita ut *calor præter naturam & pulsus celer*, sive motus cordis frequentior, cum virium læsione, sponte, hoc est, sine causa externa, ægrum affligentes, ac per aliquot horas aut diutius perdurantes, sit *signum Febrium certum sive pathognomicum*, atque essentiam febris quasi constituent; quo vero motu frequentiori humores noxii in corpore ægro sæpe subiguntur & expelluntur.

I I I.

Divisio generalissima. Pro continuatione vero caloris p. n. & pulsus celeris diversa, febres dividuntur in *continuas & intermittentes*; in his enim post aliquot horas intermittunt vel plane cessant; in illis vero diutius, per unum scilicet duos, tres, septem pluresque dies continuant, atque hinc a Germanis *feruide febres* appellantur. Continuas vero.

¶ *er*o rursus in *acutas*, & *lentas*, item in *continuas* con-
nentes, sive *synochum*, & *remittentes*, ut & in *exan-*
ematicas, & *non exanthematicas*; sed pro minori vi-
am læsione sive prostratione, aliorumque malorum
inore vel maiore vehementia, in *benignas*, & *mali-*
as dispescuntur. Plures earum divisiones vid. Cap. seq.

I V.

Quando febrilis quidam impetus plane aliquamdiu *Febris*
stat, ægerque per aliquod tempus a febre, id est calore *inter-*
pulsu p. n. liber est, & postea eum novo impetu, *mittens*
vo scilicet horrore sive frigore, & subsequente æstu & *para-*
greditur, talis febris *intermittens* dicitur. Vocatur *xyismus,*
tem nova talis aggressio, vocabulo Græco usitatissi- *quid.*
o, *paroxysmus*, elegantioribus Latinis *febris circuitus*,
cessio. (a)

V.

Incipiunt hæ febres intermittentes, singulique eorum *Sympto-*
paroxysmi ordinaria ratione cum horrore & frigore, le- *mata.*
pri aut vehementiori, quem calor præternaturalis le-
or quoque aut vehementior, modo citius modo tar-
as, presso subsequitur pede, tandem in sudorem de-
ens, qui paroxysmo finem facit. Sed præter hæc
ria adhuc alia secum trahunt symptomata, præcipue
s siccitatem, sitim, dolores capitis sive cephalal-
am, appetitum sive ciborum desiderium læsum, do-
es ventriculi, nauseam, vomitus, urinæ mutatio-
m, quandoque delirium in paroxysmo, modo so-
aum, modo vigiliæ.

V I.

Paroxysmi intermittentium ut plurimum statum diem *Divisio*
itus sive circuitus servant; attamen in hora plerum- *inter-*
e variant: nunc enim horam unam alteramve anti- *mitten-*
ant, nunc postponunt. Quæ singulo die redeunt, *tium.*
otidiane; quæ alternis, *tertianæ*; quæ vero quarto
recurrunt, ægrisque biduum integrum est, *quarta-*
appellatur, diesque a febre liberi *intercalares*, aut
æco vocabulo, *tempus apyrexie*, sive intermissionis,
antur. Sæpe etiam ex errore vel diætæ, vel curæ,

E 3

vel

(a) Vid. Celsus Lib. II. c. 17. Lib. III. c. 3. &c.

vel causæ materialis, benignioris aut peioris, febres hæ duplicantur, immo multiplicantur, ut inde *quotidiana*, *tertiana*, & *quartana* *duplices* quandoque fiant. Itaque ex iisdem causis diversa in diversis subjectis producuntur symptomata, ut diversum frigus & æstus, sitis major aut minor, fastidium ciborum majus vel minus, anxietates præcordiorum, tussis, vomitus, tormina, alvi fluxus, vel obstructio ejus, somnolentia, vigilia, delirium, &c.

V I I.

Causa. Causa proxima harum, sicuti ceterarum febrium, est *celerior motus cordis*, (qui ex pulsu arteriarum celeri cognoscitur,) productus ab irritatione ejusdem, sive ea fiat a plethora sive sanguinis abundantia, sive ab humoribus crudis, tenacibus, viscidis, biliosis, pituitosis, plus, minus acribus, tanquam *causa antecedente*, in vasis corporis capillaribus & præsertim cutaneis, quasi coagulatis, atque in paroxysmo fere stagnantibus, (unde *frigus oritur*) e ventriculo & intestinis, ubi potissimum nidulantur, cum chylo, per vias chyliferas in sanguinem delatis; quorum vero *causæ remotæ* varii in diæta aut ex rebus non naturalibus errores esse solent, & in primis aer humidus & frigidus, transpiratio suppressa, victus inordinatus, nimius, crudus, crassus, ira, horror, nausea, &c. quibus vitiosi ac noxii humores generantur, qui stagnando in capillaribus *frigus*, sive initium *paroxysmi* producant; postquam vero hoc ipso vasa, fibræ, at præsertim cutis itemque cor irritantur, quemadmodum oculus a corpore peregrino illapso, vel ventriculus a re molesta aut irritante in vomitu, intestina in diarrhœa vel dysenteria, fortius & frequentius moventur, constringuntur eoque sanguis & humores commoventur, exagitantur propelluntur; quo fit, ut frigus sensim sequatur calor sive æstus, stagnantium humorum exagitatio ac resolutio, propulsio, attenuatio, coctio, noxii tam per sudorem quam per urinam expulsio, & paroxysmi tandem finis. In *quotidiana* tamen, humores pituitosos; in *tertiana* biliosos; at in *quartana*, magis pituitam tenacissimam acido junctam, peccare, varia symptomata & causæ remotæ indicare videntur.

V I I I.

Multi hodie animam rationalem, quam naturam vul- *Stebli-*
 to appellant, pro febrium causa proxima & efficiente *norum*
 habent. Cum vero anima nihil hac de re sciat, & *senten-*
 paroxysmum pro voluntate neque accelerare, neque *tia.*
 tardare, neque minuire, multo minus inhibere aut tol-
 ere possit, neque in curatione animam curemus, sed
 causam febrium materialem, humores scilicet noxios;
 hinc cum illa doctrina, primo probari non possit, ma-
 timisque propterea ac multis dubiis sit obnoxia, &
 deinde multa phænomena ex ea non explicari, ac de-
 nique nullam in Medicina habeat utilitatem; merito
 am, tamquam incertam, haud probatam, & innumeris
 difficultatibus subiectam, rejicimus, præsertim quia ex
 nostra hac sententia omnia clarius ac melius explicari
 atque intelligi posse existimo.

I X.

Diagnos. harum febrium ex antecedentibus jam ha- *Diagn-*
 betur. Ad prognosin vero quod attinet, raro multum *sis* &
 periculi eas comitatur: quia paucissimi eis moriuntur; *Progn-*
 verum plerumque salutarem acquirunt eventum, nisi *sis.*
 perversa diæta aut inepta curatione in deterius muten-
 tur. Quotidianæ tamen & tertianæ facilius curantur
 quartanis, quæ intermittantium pessimæ sunt, & ple-
 rumque etiam, præsertim secundum vulgarem curandi
 modum, magis pertinaces ac diuturnæ. Ita & verna-
 les facilius plerumque sanantur autumnalibus, atque sæ-
 pissime post aliquot paroxysmos, servata præsertim ab-
 stinentia, sine medicamentis, sive sponte cessant: &
 nisi præpostere tractentur, aut præmature per incongrua
 medicamenta sistantur, meliorem sæpe sanitatem polli-
 centur; quia iis a multis noxiis rebus corpus per al-
 vum, urinam & sudorem liberatur, unde salubritas
 febrium a quibusdam ultra modum laudatur. Nonnul-
 læ vero febres intermittentes senum, quas vehemens so-
 mnolentia in primis paroxysmis comitatur, tertio vel
 quarto paroxysmo, inopinato sæpe lethales fiunt, nisi
 peculiari eaque efficacissima, de qua infra dicemus,
 methodo tractentur. Confer. doctissim. Tortus & Verl-
 hoffius de febribus, item Lancisius de mortibus subita-
 neis. Ita etiam intermittentes pertinaciores, si ineptis

aut etiam solum lenioribus, aut saltem minus efficacibus remediis tractantur, facile cachexiam & hydropem post se trahunt, sicut antiquissimi Medici jam notarunt.

X.

Curatio.

Curatio inter-mittentium. In curatione febrium intermittantium præ omnibus primæ viæ respicienda, dum plerumque victus errores sequuntur, & saburra viscida, pituitosa, biliosa, incidenda, attenuanda, emendanda, & evacuanda. Deinde dispositio similis in sanguine corrigenda, destruenda, expellenda, ventriculus, quia læsus, roborandus, bona digestio restituenda, & symptomata urgentia mitiganda.

X I.

I. Extra paroxysmum amara & salina. Extra paroxysmum humores peccantes viscida optime emendantur & attenuantur amaris & salinis, tam alcalicis, quam mediis: ut sunt Essent. absinth. simplex & composita. Essent. gentianæ, cort. aurantiorum, fumaricæ, centaur. minor. trifol. fibrin. cascarilla, alexipharmaca, aliaque similia, vel Elixir antifebrile Mynsichti, ejusdem Elixir vitrioli, Elixirium proprietatis, Mixtura simplex, R tartari, R antimonii tartarizata &c. &c. ad gutt. 50. vel 60. vehiculo quocumque, præsertim tamen mane, calido, vel etiam circa meridiem, & postea vino exhibita. Ex salinis omnia salia alcalica ex cineribus herbarum, præsertim amararum, parata: ut Sal absinthii, centaur. min., card. bened. &c. Ex Salibus vero mediis sive mixtis, tartarus vitriolatus, arcan. duplicat. Sal digestivum Sylvii, Sal antimoniatum, Sal ammoniacum, &c. quæ salia singulo trihorio vel quadrihorio ad ℥j. vel robustis ad gr. xxv. vel 3ß. alternatim cum Essentiis aut Elixiriis illis antea nominatis, ex infuso herbæ Theæ, decocto Caffæ, jusculo, cerevisia calida, vel aquis destillatis, ut aqua cardui benedicti, fumaricæ, menthæ, cinamomi, &c. propinanda; ubi tamen observandum, quod frigidioribus magis amara & aromatica, calidioribus salina & subacida magis conducant.

Ple-

Plerumque vero *in harum febrium principio* ad pur- Vomito-
 gandas ac liberandas a vitiosis humoribus prima vias *ria*.
Vomitoria quoque sunt utilia, imo sæpe necessaria, po-
 tissimum si ægri de amaritie oris, angustis, constri-
 ctionibus atque anxietatibus præcordiorum, cardialgia,
 pressione & ponderis sensu circa ventriculum, vertigi-
 ne aut singulari nausea, vel vomendi conatu conque-
 rantur: quæ tunc, vel *mox in principio*, vel etiam,
 pro rerum circumstantium varietate, post aliquot pa-
 roxysmos, usurpatis prius per aliquot dies prædictis
 medicamentis, corrigentibus, amaris ac salinis,
 (N. XI.) quatuor vel quinque horis ante paroxys-
 mum in quotidiana, vel die intermissionis, in tertia-
 na aut quartana exhibeantur. Dari hunc in finem
 commodissime potest *tartarus emeticus* ad gr. j. ℥. in
 debilibus; ad gr. ij vel gr. ij ℥. in robustioribus,
 ubi forma quacumque libuerit; optime tamen datur in
 forma pulveris cum ℥℥. vel ℥j. alicujus salis ex præ-
 nominatis; vel vini emetic. ℥ij℥. ad ℥ii. immo ro-
 bustis ad ℥ij℥. Si cui vero *radix hypecacoannæ* magis
 arrideat, hæc a ℥j. ad gr. xxv. vel ℥℥. exhibetur,
 adjuncto postea, si vomitus sequitur, potu frequenti
 copioso aquæ tepidæ, vel infusi tenuioris herbæ car-
 ui benedicti, pro meliori & faciliori saburræ peccan-
 tis solutione & evacuatione. Hæc in nonnullis, ubi
 amarities in ore, cibi fastidium, nausea, vomendi
 conatus inanis, aut cardialgia continuant; vel subla-
 ta, aut sponte, aut errore in diætâ commisso, re-
 ceunt, post aliquot dies subinde repetenda sunt: ita
 hoc modo noxia e ventriculo, intestinis, pancreate,
 hepate ac liene egregie excutiuntur, variæque in his
 partibus factæ obstructions referantur, ut non raro
 post vomitorii legitimum effectum febris non amplius
 redeat, sed tota sublata sit. Ubi vero nullum adest
 indicans vomitorii, æger difficulter vomit, aut debilis
 est, aliudve contra indicans adest, vomitoria omitti
 debent; quia ægris valde utplurimum molesta sunt,
 debiles magis debilitant, nonnullis vero, ut phthificis,
 hæmoptoicis, vomitu cruento, vel hernia laborantibus,
 &c. aperte nocent.

X I I I.

*Purgan-
tia.*

Quod si vero æger sit debilis, aut difficulter nimis vomat, vel nullum indicans vomitorii adsit, aut aliæ rationes adsint vomitoria vetantes, e contrario autem prava victus ratio prægressa, flatus, tormina, obstructions, dolores & molestiæ circa hypochondria, aliave in abdomine mala percipiantur, *purgantia*, eaque lenia, ac si res exigat, repetita, loco vomitoriorum substitui possunt ac debent: ut rhabarbarum, fol. fennæ, tamarindi, sub forma pulveris, boli, potiunculæ aut vini medicati; pulvis jalapæ, aut *pilulæ* variæ purgantes, hodie usitatiores, præsertim tartareæ Schröderi, Quercetani aut Bontii, Extr. panchym. Croll. aut pilulæ *balsamicæ* vel polychrestæ hodie adeo decantatæ, Beccherianæ scilicet aut Stahlianæ, nostræ aliæve similes; aut sal. amarum catharticum Anglicanum vel Bohemicum, ab ℥ss. ad ℥j. aut sal. mirabile Glauberi, abstinendo a violentioribus, quia turbant & debilitant; atque sic febrem vehementiorem reddunt. Ita & quandoque *Clysteres*, si alvus obstructa, & flatus sive fæces duræ ægro negotium facessunt, ad hæc mala mitiganda adhibendi sunt.

X I V.

*Venæ Sec-
tio.*

Phlebotomia, nisi manifesta & magna plethora, aut æstus valde ingens adsit, aut aliud quid eam indicet, in his febribus rectius omittitur; quando autem contra vel manifesta plethora adest, vel consuetæ sanguinis excretionis suppressæ, & cum primis in mulieribus menses, quam utilissime venæ sectio instituitur; ubi eam sæpius egregio cum successu institui; at si instituenda, eam extra paroxysmum atque die a febre libero, instituere præstat.

X V.

*Uberior
febris
Sympto-
matum
curatio.*

Postea *dyscrasia sanguinis*, quam a corruptis ac vitiosis humoribus e ventriculo & intestinis acquisivit, & quæ febrim fecit, iisdem medicamentis alterantibus, corrigentibus, sive attenuantibus, tam forma fluida, quam solida (N. XI.), continuato usu, emendatur, iisque ipsis etiam *symptomata* simul mitigantur & minuuntur, atque ipsa febris profligatur.

Speciatim vero *sitim*, æstumque nimium moderantur,
ac

ac simul sanguinem spissum attenuant, acremque temperant, partim *sufficiens potus aquosus*, ut infusum Theæ, Coffeæ, veronicæ card. bened. præsertim in principio paroxysmi, aliaque similia: item *cerevisia tenuis* cum pauco nitro, vel frustulis dissecti pomi citri adjectis. Vel, præsertim in progressu paroxysmi aut ejus declinatione, quando cum primis egri potum calidum averfantur, *decoctum hordei citratum* aut blande acidulatum, v. g. Subl. vitrioli, sulphuris clyffo antimonii, vel sirupo citri, sirup. ribesior. berberis, vel ceras. acidior. vel etiam *aqua simplex* pane tosto alterata, cum vel sine frustulis citri; vel sirupo acidulo q. s. ad gratum saporem, vel aqua simplex cum paucio vino & saccharo, additis vel omissis citri frustulis; partim *mixture diaphoreticæ* ex aquis destillatis temperatis, cum pulveribus temperantibus, & leniter diaphoreticis, pro materia vitiosa febrili cum corrigenda tum e sanguine expellenda, ut lap. 69. antimonio diaphoretico, aliisve temperantibus jam supra (N. XI.) laudatis, addito sirupo quodam grato ex modo laudatis. Quibus ita, una cum *dieta parca* & tenui, per aliquod tempus rite usurpatis, hæc febres, præsertim vernaes, post aliquot paroxysmos, intra quatuordecim dies, vel citius quam optime sæpe solent profligari.

X V I.

Quod si vero intra hoc tempus non fiat, primæ tamen viæ bene prius purgatæ & vitiosi humores ex parte correcti sint, tunc *ad specifica antifebrilia*, id est, *Specificæ anti-febrilia*, febrem peculiari virtute sistentia, accessus fieri potest: qualia plurima laudantur, & inter hæc maxime *specificum antifebrile Crollii*, aut *Strobelbergeri*, itemque *Regulus antimonii medicinalis*, aliaque similia terrea ad ℥j. biborio vel trihorio ante paroxysmum exhibita, commendantur. Ita & *mixture febrifuga Crollii*, ex aquæ cardui benedicti ℥ij. Sal. absinth. ʒss. succ. citr. ℥iij. constans, vel in robustioribus ex Sal. absinth. ʒj. & succ. citri; ʒss. aut Essent. absinth. ʒj. cum Essen. vitrioli ℥ss. ante accessionem semel iterumque data, sæpe juvat. Præterea *omnia superius laudata salia*, majori paulo dosi & sæpius exhibita, febres has sæpe profligant. Quidam *alumen* vel per se, ad ℥j. vel ʒss. vel cum

cum NM part. æqual. datum, valde extollunt, sed ob nimiam adstrictionem & inde metuenda mala, valde suspectum est; id quod & de pulvere *gallarum*, qui a Gallis in Acad. Reg. ad ℥j. valde laudatur, sentiendum esse puto.

Nonnulli *piper* quoque præsertim phlegmaticis, ad grana xx. & ultra; alii *capficum*, quod piper Hispanicum vulgo audit, ex spiritu vini ante paroxysmum aliquoties sumptum, valde commendant; quæ vero ob fervorem nimium facile præsertim imbecillis nocent, & calorem p. n. vel alia mala inducunt.

Alii *Nucem vomicam* & huic affinem *Fabam S. Ignatii* a. gran. v. ad x. vel solam, vel cum aliis mixtam, & ante accessionem datam, magnopere laudant (a); alii *vitrum antimonii*, immo ipsum *arsenicum* ad gr. j. vel ij. immo gr. iij. pro specifico euporisto habent; quæ vero tamquam violentiora & venenata, aut ad naturam venenorum quam proxime accedentia, non facile, & forte non nisi in casu necessitatis, ubi secura non prostant, adhibenda. *Flores chamameli* contra, tam in decocto, quam in forma pulveris aut electuarii, larga dosi propinati, securissimi sunt, & multum sæpe in febribus hisce debellandis præstant. Ita & *radix pentaphyli* aut *imperatorie* aut *gentianæ*, vel & *cortex cascarillæ*, vel *cortices aurantiorum* in pulvere vel electuario, larga & sæpe repetita dosi, febres has egregie & tuto sæpe tollunt (b). Id quod etiam haud raro *crocus martis antimoniat*, quem Stahlia valde extollunt, perficit, itemque *pilulæ Wildegansi* dictæ. At si securiora ex his debitum effectum non præstant, sicuti sæpius contingit, aut certioris effectus causa omnibus illis tamquam minus certis, uti nolimus, ne scilicet ægri nimis diu a febre torqueantur, *corticis peruviani* sive *chinæ chinæ* legitimus usus (licet multis adeo exosus sit, & multa obloquantur,) intermittentes quascunque certo & tuto etiam profligat, sub quacum-

(a) Vid. *Valentini Polychrest. exotic.* ubi de *Faba* hac disserit, itemque ejus *Museum Museor.* (b) *Conf. Dissert. nostra de Aurantiis*, eorumque eximio usu medico. 4. *Helmstadii 1741. edita.*

cumque forma exhibeatur ; qui propterea hodie mihi & plerisque bonis practicis præ omnibus aliis specificis usitatissimus, iisque merito præferendus est . (a) *Externis* vero *remediis*, quorum varia a nonnullis, ut pulvis applicentur , vel collo appendantur , tamquam specifica magnopere prædicantur, haud fidendum, quia vel superstitiosa, vel caussam non attingunt ; adeoque plerumque vana sunt, & non nisi forte fortuna juvant.

X V I I.

Diæta, febre durante, tenuis sit & parca, vel abstinentia aliquot servetur dierum: hac enim, experientia teste, multæ febres omnino profligantur. *Potu*, pro sitis ratione, utatur sufficienti, tenui, aquoso, (N. XV.) & quidem in frigore paroxysmi, calido vel saltem temperato ; in calore vero & declinatione paroxysmi (quia ægri a potu calido sæpe abhorrent) paulo frigidior esse potest, vitando tamen nimis frigidum, ejusque præsertim nimiam copiam simul & semel ingestam. Die paroxysmi, æger ante paroxysmum prorsus a cibo abstineat, & si sitis urgeat, nullum potum nisi calidum & aquosum, imprimis vero infusum Theæ vel Coffeæ, vel florum chamæmelli aut card. bened. assumat. *Vitet frigus* & aerem frigidum aut humidum, atque in paroxysmo, se lectulo mox committat, corporeque bene tecto, sudorem patienter ferat, vix enim ulla febris sine sudore bene curatur: qui vero in paroxysmo egregie promovetur potu calido vel saltem temperato, aqueo, sæpius assumpto, præsertim si in principio sudoris essentia amaræ alicujus (N. XI.), vel diaphoreticæ, aut alexipharmacæ gutt. 40. & 50. in potu calido simul assumantur.

Monita practica.

I.

Febre profligata victus parvus ac tenuis, medicamenta amara, stomachica & roborantia (N. XI.) adhuc aliquamdiu sedulo continuanda, haustulus vini generosi
in

(a) Vid. uberius de præstantia hujus corticis doctiss. *Werlhoffi* observationes de Febribus, & cautiones ejus medicæ.

in pascu usurpandus, *frigusque* diu vitandum, & ne morbus hic, quod ei alias solemne est, *facile recrudescat*, præsertim si jam antea pertinacioris fuit indolis, aut jam sæpius recruduit, bis terve in die *portio aliqua corticis chinæ*, vel *cascarillæ*, & quidem in tertianis curatis post octiduum a superata febre, in quotidianis vero & quartanis, tertia quavis post debellatam febrem hebdomade, salutariter usurpanda, subjuncto tempore idoneo motu corporis moderato, & præsertim ambulatione, aut equitatione, aut unctione frequenti.

2.

Si ægri sudores in paroxysmi declinatione oriundos refrigeratione corporis *impediunt*, augent lassitudinem corporis, morbum protrahunt, varia insolita eaque sæpe gravia hoc ipso symptomata excitant, & febres leves facile in lentas periculosissimas, hecticam, cachexiam, œdemata, asthmata, hydropem, aliosque pessimos morbos transmutant: quæ mala sæpe insonti Cortici peruviano, sed falso adscribuntur.

3.

E contrario, quo tranquillius ægri in paroxysmo *se gerunt*, patientiusque sudori indulgent, eo citius materia noxia febrilis subigitur & expellitur, eo citius proinde omnia symptomata mitescunt, eo citius febris curatur, & eo melius ac certius pravæ sequelæ avertuntur.

4.

Potus sufficiens tenuis (N. XV.) ægris, præsertim in paroxysmo, pro fitis ratione, non solum non dene-gandus, sed potius *commendandus*, qui vero in frigore, ut dictum, non frigidus, sed calidus, aut saltem, si forte æger calidum bibere recuset, temperatus esse debet; neque spissus aut inebrians, sed aquosus, quique non affatim, aut præcipiti modo, at modicis haustibus sensim sensimque ingerendus.

5.

Sudorifera & amara in paroxysmo, quando æstus minui, & sudor erumpere incipit, magno cum fructu, ad sudorem promovendum noxiumque e sanguine expellendum, exhibentur; si citius, calorem nimis augent, & deliria aliaque mala sæpe inducunt.

Fri-

6.

Frigus nimium in paroxysmo quarundam febrium, præsertim quartanarum, *lenitur* calore lecti, potu calido, balsamis stomachicis & aromaticis, ventriculo spinæ dorsi calide illitis. Item spiritu vini rectificato, linteis complicatis calide ventriculo impositis, stragulis sufficientibus, lapidibus, aliisque machinis calidis sedibus suppositis.

7.

Febre debellata, si *cibi desiderium diutius deficiat*, vitrioli martis Ludovici, aut Elixir. vitrioli Myns. s, terve in die ad gutt. 50. sumpta, egregie profunt, interpositis lenibus purgantibus.

8.

Cortex peruvianus, aliæve *specificæ febres sistunt*, præsertim vero adstringentia fortiora, si exhibeantur, antiquam materiam febrilem probe evacuata & correctæ est, graviora sæpe mala inducunt: ut obstructions alvi, angustias præcordiorum, dolores ventriculi, cachexiam, oedemata, asthmata, hydropes, inflammationes, febres lentas, hecticam, &c. Minus tamen hæc cortice peruviano, cascarillæ & aurantium metuent, quam ab adstringentibus aliis fortioribus.

9.

Cortex peruvianus, divinum sane remedium, non parvis adstringentibus, aut vi adstringendi, ut multi male existimant; sed *particulis suis amaris, roborantibus, ac balsamicis*, febres pellit ac sanat: hinc tantum periculum, ut multi putant, ab ejus recto usu non est timeendum.

10.

Voracitas in febribus intermittentibus morbum diu protrahit; aut morbo superato recidivam ejus excitat: hinc serio vitanda.

11.

Contra æstum & sitim ægris aqueus potus sufficienti copia dandus, isque pro majori effectu, gratis acidis citra nominatis est temperandus, vel & paucò vino canano & mosellano.

12.

Ægri, quo magis antea valetudinarii aut imbecilles fuerunt,

fuerunt, eo cautius cum specificis & vomitoriis sunt tractandi, robustioribus vero minus nocent.

13.

Febres intempestivæ suppressæ & alia mala, cum primis abdominis duritiem, adstrictiones alvi, & dolores circa hypochondria, excitantes, blande laxantibus, præsertim pilulis tartareis, balsamicis, aut polychrestis, aut vinis medicatis laxantibus, optime revocantur; quæ deinde præparato ac purgato rite corpore, methodo præscripta, denuo curandæ.

14.

Œdemata, post intermittentes, ut sæpe vel ob potum nimium fit, vel ob sudorem impeditum, relicta, frictionibus, motu corporis, exercitationibus, salibus digestivis, atque essentiis, itemque infusis amaris, cum vino aut cerevisia paratis, præsertim ex carduo bened. summit. absinth. bacc. juniper. cort. aurant. & cascarrill. immo & ipsius chinæ curantur, interpositis subinde remediis martialibus, lenibusque laxantibus, atque observata simul tenui ac parca diætâ, & vitato potu nimio.

15.

Absorbentia terrea antifebrilia, & *antimonialia* in febribus his nimis copiose exhibita ventriculum facile vehementer lædunt, adeoque nimius eorum usus vitandus.

16.

In quartanis præsertim senum, aut imbecillium, vehementiora remedia, ut vomitoria, purgantia drastica, volatilia fortiora, itemque V. S. (nisi forte fluxus sanguinis suppressus eam exigat,) ut plurimum nocent: in junioribus contra & robustioribus haud raro rationes adfunt, quæ vomitoria & V. S. ut supra docuimus, requirunt.

17.

In febribus intermittentibus senum, *soporosis* dictis, ubi ægro altero vel tertio paroxysmo in soporem gravem, & tertio vel quarto paroxysmo in apoplexiam lethalem incidere solent, ut præstantissimi practici observarunt, mox post paroxysmum, quo sopor ille accessit, cortex peruvianus sæpe & larga dosi est adhi-

ben-

endus, ut sequens paroxysmus avertatur; alias ægri
 lerumque in sequenti paroxysmo apoplectici moriun-
 ar. Confer. hanc ob causam utilissima scripta Celeb.
 tali TORTI & WERLHOFFII nostri *de febris*.

18.

In febris inveteratis aliquamdiu salia, vina medi-
 ta amara, & pilulæ amaræ balsamicæ, interjectis pur-
 gantibus, sunt usurpanda, antequam specifica sive si-
 entia exhibeantur.

19.

Quoties ex quartana hydrops oritur, nullo remedio me-
 us uterque curatur morbus, quam *cortice peruviano*,
 m in substantia, quam infuso, recte exhibito. Conf.
 ilii *Dissertatio de quartana & hydrope per corticem pe-*
ruvianum curatis, A. 1740. Helmstadii edita.

C A P U T III.

De Febris continuis & 1. acutis.

I.

Febris continua dicitur intemperies calida, aut mor- *Febris*
 bus, in qua pulsus celer & calor præternaturalis, *continua*
 cum variis aliis symptomatibus) usque ad finem mor- *quid, e-*
 cum periculo perdurat. Dividuntur ejusmodi febres *jusque*
 imo in *acutas*, & *lentas* sive *chronicas*. *Acutæ* vo- *divisio.*
 untur, quæ brevi tempore vel ad mortem, vel ad sa-
 tem decurrunt, & sunt vel *acutæ simplices*, sicuti fe-
 is ephemera, synochus, febris catarrhalis, &c. vel
racutæ, ut causus, febris petechialis, purpurata; vel
utissima, ut sudor Anglicus, febris pestilens, & pe-
 lentia sive pestis ipsa. Dividuntur præterea acutæ in
nignas, & *malignas*, pro minori vel majori virium
 osstratione, symptomatumque minori, vel majori ve-
 mentia: & in quibus simul *maculæ vel papulæ sive*
stule in cute, quas Græci *exanthemata* vocant; pro-
 niunt, ut in variolis, morbillis, febre petechiali,
 arlatina, miliari, seu purpura, urticata, peste, &c.
anthematicæ appellantur.

F

II.

Differe-
rentia
ab in-
termittentibus,
alieu-
que di-
visiones.

Eodem fere modo ut plurimum incipiunt continuæ, quo intermittentes: nimirum horrore vel frigore, quem pulsus celer & calor præternaturalis modo lenior modo vehementior subsequuntur; verum distinguuntur ab intermittentibus continuatione diuturniori horum ultimorum; calor enim & pulsus p. n. in his ante febris finem non plane intermittunt, licet in nonnullis quandoque parum remittant; quam ob causam etiam a quibusdam in continuas continentes, sive synochos, & in continuas remittentes, easque vel quotidianas vel tertianas dividuntur: ad quas potissimum febres ita dictæ catarrhales pertinent, quas coryza, tussis vel rauco comitantur, quæ vesperi ut plurimum ægros nova quadam accessione vehementius affligunt, & matutino tempore a vehementia sua aliquo modo remittunt. Nonnulli plures constituunt differentias; sed hæc sufficere possunt: atque hoc solum adhuc notamus, quod vocabulum continuæ febris etiam sæpissime latiori & naturali sensu quoque pro continente usurpetur, atque non semper a continente distinguatur.

I I I.

Symptomata.

Symptomata, præter jam dicta in his febris usitata, sunt cibi fastidium sive appetitus prostratus, sitis, cephalalgia, vigiliæ, virium major minorve prostratio, urina saturatius tincta, plusque minusve rubicunda, siccitas oris, faucium & lingiæ, harumque crusta modo albicans, modo fusca, aut subnigra, quem statum nonnulli barbæ prunellam vocant, deliria, anxietates præcordiorum leviores, vel vehementiores, & alia; pro quorum varietate varia recipiunt nomina: ut ephemera,

Nominum februm, varietas.

synochus sive continens, causus, angina, pleurilitis benigna, maligna, petechialis, sudor anglicus, morbilli, variolæ: purpurata vel miliaris, scarlatina, urticata, catarrhalis, biliosa, pestilens, pestis, epidemica, dysenterica, stomachica, intestinalis, sive mesenterica, castrensis, hungarica, vulneraria, erysipelacca, inflammatoria, lochialis, lactea, lenta, hectica sive phthisica, verminosa, &c.

Causæ
et pro-
pinque.

Causa proxima harum febrium quamvis non sit adeo plana, certa ac perspicua, sed potius valde obscura, mihi tamen esse videtur, ut in intermittentibus, materia

ria quædam p. n. modo acris, modo viscida, peccatis; partes multas; & cumprimis cutem, ad spasmos, sed cor & arterias ad frequentiores contractiones illicitans, non acida, ut olim putarunt, sed *sulphurea* tius aut *alcâlica*; id quod calor morbidus, sitis, siccas oris & cutis, aliæque phænomena evincere videntur: quo ipso deinde sanguis celerius, quam par est, per vasa propellitur; unde dolor capitis, vigiliæ, deliria, aliæque symptomata explicari apte possunt. *Antedens* vero hic magis in vasis sanguiferis, quam prius viis, in vario nimirum sanguinis vitio, vel quantitate, vel qualitate præsertim acri, alcalica, biliosa, & *sulphurea* peccantis, consistit, quo cor & ceteræ partes ad motus ejusmodi p. n. concitantur, aliæque symptomata inducuntur; quod vero sanguinis vitium, necumque id sit, hoc motu cordis & sanguinis auscipissime corrigitur, vel expellitur, morbusque sic subsistit, eumque motum & effectus *Naturam* ergo (quæ nobis cor potissimum, una cum arteriis, & utique tonico aliarum corporis partium, verbo, mirabilis fabrica corporis mechanica est, *Sthlianis* autem *ima rationalis*) præstare dicunt, id quod etiam sensu verum est, dum a sapientissimo Conditore animata est, sicut in statu naturali, ita & in morbo noxia atque supervacanea secernere atque expellere; atque hinc *Natura merito optima morborum*, & *primis febrium medicatrix appellari potest*, quia eas se sola sanat, cujus etiam ductum, si rite agit, sequi debemus. Contra sæpius occurrunt febres aliique morbi, ubi *Natura parum præstare valet*, ars vero multum; ubi *Medicus fit magister & dominus Nature*, in quibusdam vero *NATURA & ARS*, ut præsertim in malignis quibusdam, parum adhuc vel nihil efficere possunt.

V.

Remotæ vero causæ sunt itidem, uti in intermit-
tentibus, errores in rebus non naturalibus, cibo præsertim, potu, aere; motu vehementiori, vigiliis nimis, affectibus animi, commissi, atque inprimis etiam, maxime in epidemicis, contagium, si scilicet noxium quoddam in aere, quod sanguinem atque simul spiri-

2. Causæ
se re-
motæ.

tus vario modo corrumpere, ejus crasin naturalem destruere, atque partes multas, cum primis vero cor ad motus p. n. excitare, cerebrum vero in suis functionibus vehementer turbare valet. Pro diversitate vero harum causarum, & inde inducta minori vel majori corruptione sanguinis, itemque pro varia corporum dispositione, febres hæ evadunt vel leviores vel graviores, benignæ vel malignæ, varique earum gradus & diversitates oriuntur: quarum tamen causarum & corruptionum ab iis inductarum natura sive indoles a priori hætenus satis cognosci haud potuit; a posteriori tamen observatur, sanguinem & serum in quibusdam magis *spissum* sive *coagulatum*, in aliis vero, præsertim in malignis, nimis *dissolutum*, & ad *putredinem alcalicam dispositum* esse, immo in malignis atque ipsa pestilentia revera in celerem putredinem abire; unde necessario fluidarum ac tandem etiam solidarum partium fabrica, crasis & usus ita læduntur, ut omnia prædicta symptomata cum læsione reliquarum corporis animæque actionum, & sæpe mors ipsa inde subsequantur.

V I.

Diagnosis omnium continuarum.

DIAGNOSIS continuarum generalis ex definitione earum (N. I.) constat. Specialis vero ex specialibus circumstantiis & symptomatibus desumitur. *Benignæ* enim ex virium qualicumque aliarumque actionum constantia; *malignæ* vero ex earum subitanea & insigni prostratione, ac pulsu debili, quibus plerumque mentis quedam turbatio sive alienatio, præcordiorum anxietas, & respiratio anxiosa aut suspiriosa, vigilieque nimie ut plurimum juncta sunt, dignoscuntur. *Ephemera* sive *diaria febris* ex duratione 24. circiter horarum cognoscitur; *continua simplex*, *synochus*, sive continens dicta, ex signis febrium generalibus, viribus satis constantibus & symptomatibus plerumque non adeo vehementibus, per plures dies durantibus. *Synochus putrida*, ubi graviora adsunt symptomata, major anxietas præcordiorum, fœtor excrementorum vehemens, aliaque. *Causus*, sive *febris ardens*, ex æstu sive ardore, præsertim circa præcordia, intollerabili, & siti fere inextinguibili. *Angina* ex faucium inflammatione, deglutitione

atione & respiratione difficili, cum febre continua. *Pleuritis* ex dolore lateris punctorio, tussi & dolorifica expiratione, junctis signis febris generalibus, ex inflammatione pleuræ oriunda. *Phrenitis* ex faciei & oculorum rubore insigni in febre continua, itemque capitis dolore insigni, delirio, quod sæpe *furiosum* est, orta ex inflammatione cerebri. *Petechialis* ex maculis capitis, moribus pulicum fere similibus, & cutis superficiæ æqualibus, in toto fere corpore, facie tamen pleuræque excepta, in quibus vero stigma sive punctum, et in pulicum moribus, non apparet, sexto vel septimo die ut plurimum se manifestantibus. *Morbilli* papulas sive maculas rubras habent paulo elevatas, sed non pustulis, cum febre & tussi plerumque juncta. *Variolis* vero post tales papulas sive maculas, papulæ lentis vel minoris pisi magnitudine in iis elevantur; nunc purulenta, nunc aquosa sive serosa mater repletæ; priores *Variolæ veræ*, posteriores *spuriæ*, et *aquosæ*, vocantur. *Variolæ veræ* denique nunc *secretæ* sunt, nunc *confluentes*: hæ; pejoris moris atque sæpe valde *malignæ*; illæ autem plerumque memoris sunt indolis. *Purpura* vel *febris miliaris* distinguitur ex maculis rubris vel papulis seminis milii aut paveris magnitudinem, ut plurimum non excedentibus; quarum tamen hæ *purpuram albam*, illæ *purpuram rubram* constituunt. Quædam harum papularum haud raro liquidum perlucidum continent, & hic morbus hic a nonnullis *purpura crystallina* appellatur.

Urticata vero febris dicitur, quando elevationes sive papulæ puncturis urticarum similes cutem exasperant. *Febris scarlatina* cognoscitur, quando in febre acuta maculæ amplæ, rubræ, ad colorem scarlatinum accedentes, in cute hinc inde prorumpunt, eaque mox prius diebus, immo quandoque antequam febris percipiatur, quæ supra cutem non elevantur, & quidem etiam in facie, ubi petechiales vix unquam prodeunt. *Febris catarrhalis* cognoscitur ex eo, quando ita dicti catarrhi, ut Coryza, rauco, tussis, itemque capitis levitas, juncta sunt; calor non solet esse adeo vehemens; et sitis, attamen calor circa vesperam ut plurimum una-

cum ceteris symptomatibus increfcere folet, atque urina plerumque mox eft turbida, fed fine fedimento. *Febris biliofa* vero ex prægreffa ira, fubfequente fapore biliofo in ore, æftu magno, vomitu biliofo, vel faltem conatu vomendi, cum præcordiorum anxietate, donec biliofa materia vel fponte vel dato vomitorio rejecta fit.

Febres peftilentes appellantur, quando febricula correpti fubita virium prostratione affliguntur; nam eft fpecies febris malignæ, cum variis aliis febrium malignarum fupra indicatis symptomatibus, eisque adhuc gravioribus magisque infolitatis, multique ægrorum, quemadmodum in ipfa peſte, intra breve tempus, duos fcilicet, tres, quatuorve dies, immo fubinde adhuc citius inde moriuntur, atque ut plurimum funt *epidemicæ*: fiquè belli tempore in caſtris oriuntur, *febres caſtrenſes* appellari ſolent, atque ſpeciatim in Hungaria, *Febris Hungarica*, de qua mox plura. *Peſtis* vero five *Peſtilentia* ipſa innotefcit, quando una cum ejusmodi ſymptomatibus tumores hinc inde in corpore, qui *bubones* aut *carbunculi* dicuntur, erumpunt. *Epidemica febris* eſt, quando plures ſimul eodem tempore, eodem in loco vel regione, ex eadem fere Febre decumbunt, quæ quandoque benignæ, quandoque tamen malignæ funt. *Sudor Anglicanus* fuit febris olim admodum maligna in Anglia orta & obſervata, in qua ægri mox vehementi ſudore, & virium proſtratione corripiebantur, & multi intra unum alterumve diem, ut in peſte, ea interficiebantur. *Dysenterica febris* eſt, ſi cum calore & pulſu p. n. vehementia tormina & æſtus in abdomine, cum frequentibus & dolorificis dejectionibus, eisque vel cruentis, vel mucoſis, aut purulentis adſunt.

Febris ſtomachica vel *intefſtinalis* mihi eſt, quam fluxus alvi, & rejectio materiæ fæculentæ ut plurimum valde foetidæ comitatur, quam quidam *meſentericam* appellant.

Hungarica, quando ægri, præſertim in Hungaria vel ſaltem tempore belli Hungarici, febre peculiaris maligna, cum ſubitaneo virium lapſu, vehementiſſimo capitis dolore, linguæ & faucium inflammatione, ardore,

ore, nigritudine, atque ariditate afficiuntur, quam nonnulli barbaro vocabulo *prunellam* appellant, unde quamplurimi intra paucos dies pereunt. *Vulneraria*, quando calor & pulsus p. n. vulnere, abscessui vel operationi chirurgicæ graviori superveniunt. *Erysipellacea*, ubi febris erysipellas; *inflammatoria*, ubi ei inflammatio notabilis alicujus partis, sive externæ, sive internæ, conjuncta est; vel ubi inflammationi, præsertim majori, febris supervenit.

Febris lenta sive *hectica*, quando cum notabili corporis tabe calor lenis p. n. attamen continuus, cum pulsu celeriori ægrum perpetuo ac diu affligunt. *Phthisica*, ubi in viscere quodam, præsertim pulmonibus aut renibus ulcus est, una cum signis febris lentæ morbo indicatis. *Lochialis* vocatur, quæ lochiis obstructis supervenit. *Febris lactea*, quæ lactis difficilem proveniunt in novis puerperis comitatur: atque ex his febrium continuarum diagnosin satis patere existimo.

V I I.

Ratione prognoseos continuarum generatim probe notandum est antiquum atque verissimum Hippocratis monitum, (a) in acutis scilicet nullas certas esse prædictiones, neque sanitatis, neque mortis: quia adhuc hostie sæpius observatur, eos, qui nobis leviter ægrotare videntur, sæpe inopinato mori, graviter vero decumbentes, præter omnem spem haud raro reconvalescere. Interea tamen eæ, quas gravia comitantur symptomata, periculosiores ut plurimum sunt reliquis; speciatim vero illæ omnium periculossimæ esse solent, ubi subitanea eaque magna virium adest prostratio, ubi pulsus valde debilis, respiratio anxiosa, præcordiorum magna anxietas, urina tenuis, ignea, sine sedimento, vigiliæ perpetuæ, inquietudo & jactatio corporis continua, fluctuum collectio, tremores artuum & linguae, subsultus tendinum in manibus & circa carpos, quando pulsum explorare volumus, mentis alienatio, pudoris neglectus & corporis denudatio insolita adsunt: Pulsus denique myurus, fecum & urinæ involuntaria & inscisa excretio,

(a) Aphorismi 19. Sect. 2.

oculique caligantes, cum *perpetuis deliriis*, mortem indicant. Ita & si *urina* in his morbis prius tincta simul & semel *prorsus aquea* fit, & quidem subito, *deliria* brevi instare fere certissime significat, ac deinde plerumque mortem. *Optandum esset*, ut *æque valentia ac certa hic quoque haberemus remedia*, quam in *intermittentibus*; attamen hucusque ea adhuc desideramus. Interea tamen sciendum, plerosque, si rite tractantur, præsertim benignis aut saltem non adeo malignis laborantes, hodie a peritis & prudentibus Medicis restitui, atque *longe plures evadere quam mori*; licet quam plurimi adhuc optimis etiam Medicis, varias ob causas, sæpissime tamen ipsorum ægrorum aut adstantium culpa, moriantur.

V I I I.

Crisi Exitus vero harum febrium salutaris, quando per *notabilem quandam evacuationem*, ut hæmorrhagiam largam narium, sudorem fortem, urinam turbidam copiosam, cum sedimento largo, sputum multum, vel quandoque etiam alvi fluxum, &c. contingit, *Crisis* vocatur: quas evacuationes, si *sufficienti copia procedunt*, brevi euphoria & levitas sequuntur; sin contra, vel nulla, vel non satis larga aut sufficiens contingit, mortem vel saltem morbum diuturniorem aut mutationem in alium indicant. Et licet, ut modo dictum est, aliæ evacuationes criticæ accidant præter sudorem, quibus ægri servari solent, tamen quia plerique a febre sine sudore, non curantur, ut hic apta ratione, dum natura sæpissime hunc modum ostendit, producat, serio studendum, fugiendumque ut plurimum omne, quod eum impedire potest: quia quando impeditur, sæpissime inde mors, interdum febres lentæ, aut innumerabilia alia mala gravia sequuntur. Scire vero juvat *sudorem plerumque non in principio, sed in statu vel potius jam aliqua facta morbi declinatione*, remittente nimirum aliquo modo caloris & pulsus vehementioris impetu provenire, atque ut plurimum *nubecula in urina*, quam tunc coctam appellant, *indicari*, ideoque ægri *in principio* sive ante hoc tempus, ut olim pessimo sæpe consilio fecerunt, *ad sudorem non sunt cogendi*; multo minus valde calefacientibus bezoardicis, aut ale-

Lexipharmacis dictis remediis, ut quondam curarunt, tractandi, *sed blandis ac lenibus diaphoreticis*, præsertim fixioribus; tincturis ac mixturis temperantibus aciculis & potiunculis diluentibus, ac æstum temperantis, sic certius reconvalescunt. Quia tamen etiam *cere febres acutæ* materiam noxiam *per alvi fluxum* cum euphoria ægrorum expellunt, quæ in primis viis potissimum hæreere videtur, cavendum in his a sudoriferis, & sequamur ductum naturæ, qua de re uberius in Cap. V. dicemus.

I X.

In curatione igitur plerarumque acutarum Medicus ab initio & incremento usque ad statum morbi materiam noxiam, tamquam causam febrilem, corrigere, reparare, & ad ejectionem disponere, ast in statu & declinatione eam per convenientia loca, quæ decursus morbi plerumque indicare solet, eliminare debet. Ubi vero præ omnibus, melioris methodi causa, notamus, *febres continuas ac continentes leviores, benignas, ut ephemeras, synochum simplicem, febres catarrhales benignas, typhoidales, scarlatinas, vulnerarias, lacteas, variolas, & morbillos benignos* frequentissime salutariter decurrere, ussamque morbificam a natura sive motu cordis atque arteriarum frequentiori subigi, hoc est, corrigi, tendari, atque tandem quoque expelli, idque etiam sæpe sine medicamentis, præsertim si æger 1. *abstineat a cibis* valde nutrientibus, maxime carnibus, & utatur solum jusculis tenuibus, vel omnino abstineat a cibis, præsertim si ab eis abhorret; 2. *potu utatur* sufficiente, frequenti, diluente, aquoso, imprimis tepido, vel saltem temperato; 3. quiete, & 4. frigoris evitacione; his enim utcumque observatis, multi ab his morbis omnino & perfecte, sola sic dicta natura liberantur. Sed hæc si negliguntur, atque circa has res errores committuntur, aut incongrua remedia adhibentur, febris exitus sæpe invertitur, morbi quoque graviores, vel ipsa mors inducitur.

X.

Ubi vero febris gravioribus stipata est symptomatibus, Curationi vehementiori temperando, & viscidæ vel acris gravioris materię præparationi magis studendum: in quem finem rum exi-

*Curatio
februm
leviorum.*

dan-

git pra- danda sunt *Diluentia*, ut potus sufficiens, aquosus,
paratio- temperans, ex. gr. aqua simplex, pura, vel pane in-
nem quæ jecto alterata; vel decocta ex pane triticeo, aut hor-
fit I. po- deo, vel avena, vel decoctum hordei aut C. C. succo
tu apto. vel syrupo citri, vel spiritu vitrioli aut sulphuris, vel
 & spiritu nitri dulci sapore grate acido imprægnatum,
 & saccharo vel syrupo quodam suave redditum; vel
decoctum pomorum fragrantium, aut cerasorum acido-
 rum siccorum, aut *tamarindorum*, addito pauxillo sac-
 chari q. s. ad gratiam, vel & *serum lactis*, &c. qui-
 bus subinde infusum Theæ tepidum, vel veronicæ aut
 scabiosæ, præsertim mane & circa vesperam interponi
 potest. Paulo potentius vero tenacitatem sive spissitu-
 dinem humorum, *in peioribus ac malignis febribus sub-*
inde resolvunt, infusa vel decocta sic dictarum *planta-*
rum alexipharmacarum & quidem temperationum: ut
 sunt herb. scordii, alliaræ, salviæ, millefolii, rad.
 scorzonæ, caryophyllatæ, pimpinellæ albæ & simi-
 lium, itemque horum *essentiæ* debiliores mane solum
 exhibitæ, quæ vero in agris frigidioribus tantum sunt
 adhibenda & in calidioribus prorsus omittenda.

X I.

2. *Pul-* *Pulveres temperantes ac diaphoretici*, quales egregii
veribus parantur ex lap. cancrorum aut conchis, succo citri
 & *po-* vel aceto destillato saturatis, atque salibus mediis æ-
stiunculis stum blande temperantibus: ut sunt nitrum depura-
tempe- tum, nitrum regeneratum, sal antimoniatum, Tarta-
rantibus. rus vitriolatus, arcan. dupl. &c.; vel pulveres tempe-
 rantes compositi, in pharmacopoliis hinc inde prostan-
 tes, ex aquis temperantibus, borragin. bugloss. ceras.
 nigror. card. benedict. acetosæ, fumar. &c. ter. qua-
 terve die ad ℥j. vel 3℥. exhibiti, ex quibus etiam
 idoneæ potiunculæ sive mixturæ fieri possunt, quæ ve-
 ro quoque, præsertim si ægri pulveres averfantur, si-
 ne pulveribus dantur.

X I I.

3. *Blan-* *Blanda acida* ad acrimoniam alcalicam, biliosam aut
dis aci- sulphuream, & æstum temperandum, putredinemque
dis & alcalicam præcavendam, & quæ jam adest, destru-
 4. *emul-* dam: qualia, præter dicta salia media & nitrosa, sunt
sionibus. succus citri, tamquam acidum corpori nostro amicissi-
 mum;

num; syrupus citri, ribesiorum, berberum, cerator.
 cidor, rubi idæi, mororum, & Tinctura rosarum, fl.
 papav. bellid. vel aquilegiæ, &c. Acida autem fortio-
 ra sunt spiritus vitrioli, sulphuris, nitri, clyffus anti-
 monii, spiritus nitri aut vitrioli dulcis; vel \bar{r} ex præ-
 dictis, cum quarta parte spiritus nitri dulcis, tam-
 quam remedio perquam grato, &c. quæ decoctis hor-
 lei aut CC., si modo tussis abest, ad gratum acorem
 instillantur, vel etiam per se aliquoties in die exhi-
 bentur; itemque *Julapia* grata ex aquis, syrupis,
 iuncturis & spiritibus modo laudatis, refrigerantibus
 blandisque refocillantibus, quæ ultima remedia pueris
 plerumque, aliisque qui a pulveribus abhorrent, gra-
 tiora esse solent (a). *Emulsiones* tenues, ex amygda-
 lis dulc. rec. pistaceis, pineis, sem. card. Mariæ, a-
 quilegiæ, vel semin. 4. frigid. major. non rancidis,
 addito pauco saccharo ad gratam dulcedinem, pro acri-
 monia alcalica demulcenda & sanguine temperando.

X I I I.

Materia hæc febrilis corrigitur & expellitur quoque 5. *Essen-*
 medicamentis diaphoreticis sive alexipharmacis, quæ *tiis* &
guttatim assumuntur, qualia sunt, Mixtura simplex, *tinctur.*
 Essentia scordii, helenii, angelicæ, contrayervæ, pim- *diaphor.*
 pinellæ, alexipharmaca, Tinctura bezoardica & simi-
 lia, mane potissimum cum infuso aquoso ad guttas
 xxx & vel xxxx exhibita; ex quibus vero priora sunt
 temperatiora, posteriora calidiora, adeoque tempera-
 tiora magis ægris calidioribus, posteriora vero frigidio-
 ribus sunt danda, atque magis in declinatione, quam
 in principio morbi, ubi calidiora remedia, præsertim
 in calidioribus, quam maxime sunt vitanda, reliquo
 autem diei tempore iis temperantibus remediis est per-
 gendum, quæ §. X. XI. & XII. commendata sunt.
 Hæc diaphoretica sive *alexipharmaca temperatiora*; illa
 vero, quæ ex vegetabilibus calidioribus parantur, &
 quidem cum spiritu vini, alexipharmaca sive *bezoardi-*
ca calidiora appellantur.

X I V.

(a) Obs. in cholericis & melancholicis calor melius
 nitro; in sanguineis melius acidis temperatur.

De Venæ Sectionis usu in eis. Quod ad venæ sectionem attinet, ea locum habet in principio & incremento, quando æger est *plethoricus* & robustus, ubi *magnus æstus*, atque *pulsus fortis* aut vehemens adsunt; quibus in casibus sanguinis ad *zvj. viij.* & plures, pro ægrorum & symptomatum varietate, e vena educi potest ac debet; imo quæ etiam subinde repetenda, si modo dicta symptomata brevi non remiserint. Ubi vero ejusmodi rationes sive indicantia non adsunt, vel ægri valde debiles, vel calor lenis aut valde moderatus, ac pulsus languidus, V. S. omittenda est, præsertim si malignitas adest, & constitutio epidemica repugnat.

De Vomitorio-rum usu. Vomitoria non nisi in febribus illis continuis indicantur, ubi *caussa hæret in ventriculo*, ut ubi vel *nimiam repletio*, vel *ira præcessit*, (præsertim in biliosis) & *nausea*, *amarities oris*, vel *sapor nidorosus*, vel *inanis vomendi conatus*, vel *dolores circa hypochondria*, cum *præcordiorum anxietate*, ægrum affligunt; ubi vero *lenia* sint, & præcipue hic *hypecacoanna* est laudanda tanquam divinum præ ceteris remedium: quia alia, & præsertim *antimonialia*, facile *hyperemesin* aut *hypercatharsin* inducunt, aut vires nimis prostermunt, alia-ve mala concitant, quod *hypecacoanna* non facit, sed potius vim simul aliquam alexipharmacam, præsertim in malignis atque exanthematicis exerere solet. Sed ubi danda, mox, si fieri potest, in principio exhibenda; quandoque tamen etiam adhuc in progressu locum habent, imo necessaria sunt, præsertim si in principio neglecta fuerunt, symptomata vero prædicta continuant; hoc igitur in statu, si ægros ab iis, imo ab ipso mortis periculo, liberare volumus, quocunque adhuc morbi tempore cum fructu dari possunt, recorderque me ea aliquoties die demum decimo, duodecimo, imo decimo quarto morbi cum optato successu adhuc dedisse, ægrosque brevi postea convaluisse. Quando vero nulla ejusmodi indicantia adsunt, non promiscue, ut nonnulli suadent, exhibenda; quia tunc non nisi debilitant ac turbant, causamque, quæ tunc non hæret in ventriculo, haud tangunt, multo minus tollunt.

X V I.

Purgantia vero fortiora, in his morbis nunquam con- *De Purgantium usu.*
ducunt, quia debilitant, humores tenues expellunt, morbi cursum naturalem invertunt, naturam in subvertenda & expellenda causa morbi e sanguine turbant, facileque fluxus alvi periculosos excitant. Attamen omnia sæpe usum habent. 1. in febrium illarum principio, ubi indicia adsunt Saburræ noxiæ in primis viis ærentis, ut molestiæ sive dolores circa hypochondria, murmura ventris, vel ipsa diarrhœa, &c. deinde 2. cum primis in febribus catarrhalibus, aliisque epidemiciis stomachicis aut intestinalibus, ubi ea conducere observatum est; 3. in prima variolarum invasione; liberatis enim sic prius primis viis a materia vitiosa, reliqua deinceps tanto facilius corrigitur: imo in catarrhalibus solo fere purgante totum morbum sæpius debellari, & quidem potiuncula, quæ ex tamarindis, oliis fennæ, vel rhabarbaro & manna conficitur, vel ex sale amaro catartico, vel pilulis balsamicis Becherianis. In principio autem variolarum commode quoque datur mercurius dulcis cum rhabarbaro, vel jalappa, aut decoct. tamarindorum. In progressu vero aut statu febrium, præsertim exanthematicarum, & cum primis variolarum, alvus purgantibus non est irritanda, sed si obstructio alvi molesta, clysteribus tantum blandis emollientibus referanda; nisi epidemica forte constitutio id suadeat.

X V I I.

Ceterum in tali febre, sive venæ sectione aut vomitorio, aut purgante opus, sive eis opus non fuerit, *Diaphoretis quomodo procuranda.*
quando per remedia prædicta (N. X. XI. & XII.) morbus ad statum pervenit, vel calor aliquomodo temperantibus illis, jam imminutus est, & in urina coctionis signa apparent, cutisque humida percipitur, atque inde constat, materiam morbi coctam, subactam & ad excretionem præparatam esse, tunc medicamentis diaphoreticis sive excretionem promoventibus huic indicationi uberius satisfaciendum est. Hoc præstant. 1. pulveres diaphoretici, ut Lap. Cancr. citrati cum antimoniio diaphoretico aut bezoard. minerali & pauxillo, niri, ex aquis diaphoreticis, ut aqua fumar. card. bened. scor-

scorzoneræ, flor. sambuci, scordii, cinamomi, cord. frigid. galegæ, ulmariz, ceras. nigror. acetositis citri, vet totius citri, &c. &c. exhibiti, quibus in casibus gravioribus, *ubi anxietates præsertim adsunt magnæ, vel deliria, aut inflammationes, in quavis dosi pulveris camphoræ grana ij. iij. ad iv. magno cum fructu addi possunt, itemque pro ditioribus, lap. bezoardicus; quibus 2. subinde parca dosi, præsertim si ægri non facile sudant, aut frigidioris sunt constitutionis, & cum primis matutino tempore, interponi possunt Essentiæ diaphoreticæ aut alexipharmacæ, aut Tincturæ blandæ bezoardicæ variæ: ut vel sola Essentia Scordii, vel Angelicæ ad gutt. xxx. vel cum paucâ copia Ess. pimpinellæ alb. vel helenii, vel contrayervæ mixta; vel & harum loco mixtura simplex; aut R bez. Vvedelii, vel & ess. alexipharmacæ Stahlii, eadem vel adhuc minori dosi. Parcissime tamen his ultimis, utpote calidioribus, utendum, ubi magnus calor adhuc in ægro percipitur, vel quando ægri natura sunt calidioris temperamenti, resque tunc præcipue pulveribus & aquis illis diaphoreticis & ad summum essentia scordii, vel mixtura simplici, interpositis moderate acidis, peragatur.*

X V I I I.

Quid in diuturnioribus facendum. Quia vero nonnullæ febres diuturniores, aut minus acutæ sunt, & per xiv. ac plures sæpe dies sese extendunt, methodo hac generali temperante ac diaphoretica modo descripta, mutatis pro symptomatum ac circumstantium rerum varietate remediis ac formulis, usque ad finem continuandum, nisi forte diarrhœa præfens, dolores circa hypochondria, excrementa valde foetida, laxantia suadent. Quod si vero in lentas & hecticas degenerent, earum curatio infra peculiari capite tradetur.

X I X.

Dieta. Ratione Dietæ æger loco servetur temperato, vitetur calor cubiculi & stragulorum nimis, attamen & frigus; præstat tamen, ut cubiculum aliquo modo magis ad frigus, quam æstum nimium inclinet. Potus congruus, diluens, aquosus, subacidus, gratus, ac pro siti moderanda sufficiens, modo non sit nimis frigidus, concedatur;

atur; hoc enim æger multum reficitur ac roboratur, flus minuitur, humores visceri diluuntur, temperantur, quies, somnus & sudores promouentur: imo & statu morbi, & adhuc magis in declinatione, quando vires fractæ sunt, etiam haustulus vini rhenani, Mosellani, vel rubri cuiuscunque temperati, vel solus el cum aqua mixtus, ægro non interdicitur, maxime si vinum appetat, vel saltem illud non aduerfer, eive alias assuetus sit. Pro cibo, iuscula tenuia vegetabilibus parata, præsertim farinacea, avenacea & hordeacea, succo citri, vel pauco aceto subacifacæ, aut ex pomis parata, &c. item pruna, cæsa & poma cocta, parcissime usurpata, optime coniungunt. Carnes vero quæcunque & quæ ex his parantur, maxime hic sunt vitanda, natura hoc dictante, quæ ab iis plerumque his in febribus abhorret. Nullus etiam cibus qualiscunque sit, ægro nauseanti, obviatur, quia ut HIPPOCRATES recte docet, quod si hos agros nutriveris, eo plus nocebis; multum enim in febribus præstat abstinentia, aut saltem si nihil appetant, aut aliquid ipsis porrigatur, semper sit tenuissimus ac tenuissimus, & quidem, ut jam dictum est, ex vegetabilibus paratur. Atque hæc curandi ratio mihi hæctenus optima in his febribus perspecta est: Interantur tamen adhuc diligenter sequentia.

Monita Medica & Symptomatum Curatio.

1. Ut nimius calor, ita nimia refrigeratio, siue externa sit, siue interna, per potum scilicet nimis frigidum, in continuis, & præsertim in sudore, summe vitanda est, adeoque & lecti & indusiorum mutatio, maxime in exanthematicis.
2. In omnibus acutis, & speciatim quoque in malignis, atque exanthematicis, ut variolis, morbillis, purpura, &c. regimen blandum diapnoicum siue diaphoreticum, sed non coactum, atque legitima victus ratio, cum quiete, præcipuum curationis negotium absolvent.
3. Evacuationes alvi in his febribus in incremento vel

vel statu, *nisi natura viam demonstret*, aut epidemica constitutio id doceat, ut plurimum sunt periculosa, ipsaque clysmata aciora tunc quandoque non fatis tuto applicantur; primo autem initio, praesertim, *ubi repletio vel ira praecessit*, lenia ex rhabarbaro vel ex decocto tamarindorum aut foliorum sennae cum manna, non nocent.

4. Sed si alvi obstructio in incremento aut statu molestias creat, vel lotionem emollientem vel decocto tamarindorum, addito sirup. acetositat. citri vel rubi idaei q. f. ad gratiam loco potus usurpato, solvi potest, idque adhuc magis in declinatione, ubi etiam saepe lene evacans, ut potiuncula ex foliis sennae, vel rhabarbaro, vel ex tamarindis & manna, aut etiam sale amaro cathartico dari tuto potest.

5. Speciatim tamen in malignis, petechialibus & catarrhalibus, praemisso leni ex hypecacoanna emetico, causa maligna corrigenda est 1. idoneis acidis, ut potu ex decocto hordei vel radic. scorzonerae, aut CC. citrato, cum syrupo ribesiorum, vel rubi idaei suaviter temperato: vel potu ex aquae part. iij. & vini part. j. pomis citri & saccaro grato reddito, vel & cerevisia tenui, cui aliquot guttae clyssi antimonii vel spiritus sulphuris ad gratum usque saporem acidum, instillandae. Ita & 2. infusa ex herb. scordii aut cardui benedicti radicis scorzonerae vel helenii, vel florum calendulae ad modum Theae subinde usurpata, cum vel sine syrups laudatis acidulis egregie profunt. 3. Rob. sambuci & juniperi, itemque diascordium cum aceto praesertim rutaceo subinde inter praedicta data, specificè contra malignas profunt. 4. Pulveres ex antimonio diaphoretico vel bezoardico minerali, aut conchis cicratis, cum nitro antimoniato & camphora, parca sed saepius repetita dosi, ex potionibus illis vel aquis diaphoreticis dati acre malignum egregie destruunt.

6. In Febris malignis epidemicis, praesertim petechialibus & catarrhalibus, vel ubi alias aegri valde debiles, Venae sectio ut in peste, noxia plerumque esse solet; adeoque, potissimum, ubi noxia jam deprehensa est in aliis aegris, postea omittatur in sequentibus, nisi ingens forte plethora id suadeat.

7. In febribus exanthematicis, ut maculis petechialibus & purpura, itemque variolis & morbillis, si non te erumpunt, id quod inter alia anxietas circa præcordia indicare solet, valde conducunt emulsiones diaphoreticæ (præmisso ex hypecacoanna emetico) ex seminibus quilegiæ, cardui Mariæ & napi paratæ, quia hæc semina vim obtinent expellendi, sive, ut dicunt, alexipharmacam; ita Essent. scordii, helenii, pimpinellæ, vel cascarillæ, subinde ad gutt. xx. vel xxx. ex vehiculo apto, præsertim calido, exhibita, hoc in statu valde conducit, non neglecto potu Theæ aliave liquido superingesto. Vulgus nostrum frustulum radicis helenii potui ordinario horum ægrorum haud sine fructu immittit, vel cum Thea commiscet.

8. Ubi metus est exant hemata retrocessura esse, potus liquidus cum Essent. scordii, vel helenii, vel pimpinellæ, aliave simili diaphoretica, corpore probe tecto optimum est remedium, adhibitis simul, si graviora symptomata adsunt, cantharidibus in brachiis & pedibus.

9. Quando vero exanthemata jam retrocesserunt, atque incipit mors fere certa est metuenda, Essentia quoque alexipharmaca, ut Essent. scordii, pimpinellæ, aliave similes sæpius, simul cum infuso Theæ, scordii vel millefolii exhibeatur, atque cantharides sive vesicatoria tertio dorso, brachiis & pedibus applicentur, corpore frigore probe defenso.

10. In malignis & peste ipsa, dato prius laudato, opus est, emetico, nihil melius conducit quam quies in lecto, regimen blandum diapnoicum continuum, servando nimirum corpus in perpetuo calore, exhibendoque sæpius potum tepidum, aquosum, infusi Theæ, radic. scorzonæræ, herb. scord. salviæ, millefolii, veronicæ, &c. interponendo subinde ptisanas subacidulas. Deinde, præsertim in malo graviore, etiam subinde danda alexipharmaca temperata, præsertim tempore matutino, parca sed sæpius repetita dosi, ut mixtura simplex, vel Essentia scordii aut alia quædam alexipharmaca, & pulveres diaphoretici ex lapidibus cancrum vel conchiis, succo citri præparatis, cum pauxillo nitri & camphoræ, qui pulveres vel alternatim cum

essentiis sumendi, vel horis solum pomeridianis, sic tamen, ut Essentiæ magis frigidioribus, pulveres magis calidioribus temperamentis, exhibeantur: quibus etiam *potione ex aquis* diaphoreticis cum antimonio diaphoretico, vel temperante quodam pulvere paratæ, magno cum fructu subinde interponuntur.

11. Quia in peste, in *Bubonum legitima tractatione*, maxima felicitis curationis pestis pars consistit, hinc opera danda, ut emplastro vel cataplasmate emolliente mature extrahantur, ac maturentur, postea aperiantur, mundentur, & essentia vel balsamo vulnerario consolidentur. Qui plura de his *Carbunculis pestilentibus* sanandis nosse vult, itemque de *præservatione* ejus, evolvat Instit. nost. chirurgic. Part. I. Lib. IV. cap. IX. seqq.

12. *Nocent vero plerumque in malignis & præsertim in peste*, V. S. vomitoria ex antimonio, purgantia fortiora, omnia medicamenta vehementia, ut nimis calida, aut volatilia, opiata, valde camphorata, ac regimen quoque nimis calidum, quemadmodum fere omnes scriptores, qui in ultimis pestilentibus vixerunt, testantur. Atque hæc ipsa etiam methodus in *sudore Anglicano* optima quondam observata est.

13. In *febris catarrhalibus*, mane, *brevis* in principio ad materiam vitiosam evacuandam vel potiuncula mannata, vel pilulis lenibus; postea frigidioribus essentia quædam diaphoretica, vel liquor CC. succinatus cum leni sudoris regimine, ad materiam noxiam noctu subactam, expellendam, ex infuso herbarum pectoralium calido exhibeatur, & reliquo tempore diei aliquoties pulvis quidem temperans, salinus, resolvens, cum succino & nitro ad materiam vitiosam uberius corrigendam, vel ex simili infuso, vel ex aquis diaphoreticis detur; *calidioribus* vero soli pulveres & aquæ diaphoreticæ exhibendi. Ad *materiam acrem*, quæ *raucedinem & tussim* producit emendandam & incrassandam *linctus pectorales* conveniunt; pro materia vero *tenaci* e pectore evacuanda oxymel squill. ex aquis pectoralibus dandum. In *alvo obstructa* clyisma vel potiuncula laxans mannata adhibeatur. Simulac vero *mador percipitur*, & æstus paullulum remittit, aquis & potiun-

potiunculis diaphoreticis una cum infuso pectorali sedulo continuetur.

14. *Bezoardica sive alexipharmaca calidiora, ut salia volatilia urinosa, spiritus volatiles alcalici, spiritus vini rectificatus cum radicibus aliisve calidioribus destillatus, Essentie & Tincturæ e calidioribus paratæ, myrrhata, ligna sudorifera, aliaque medicamenta æstumducentia, quæ haud adeo pridem a Medicis plerumque hic in febribus acutis adhibebantur, valde noxia sunt, & cumprimis calidioribus; ardorem enim augent ac sitim, inflammationemque, anxietates, deliria, summas virium prostrationes, & sæpe mortem producunt.*

15. In *Bezoardicis* vero mere terreis, qualia fere sunt terræ sigillatæ, Cornu Cervi ustum, pulvis Pannonicus nuber, Mantuanus, bezoard. Sennerti, Anglicanus, &c. parum virtutis deprehenditur, nisi forte in alvi fluxibus nimis: ubi tamen ipsis cortex cascarillæ cum nitro jungendus, si bonus effectus inde sperandus.

16. In caufa & ardore circa ventriculum externe spiritus Vini camphoratus scrobiculo cordis cum linteis complicatis calide impositus, superimposita vesica aquæ vel lacte calido, præsertim si in eo flores chamæm. corti, repleta, egregie conducit: quia hic inflammatio ventriculi adesse solet, quam potenter resolvit, maxime si camphora etiam interne simul exhibetur.

17. In febre Hungarica, præter remedia febribus magnis adversa & modo commendata, conducit sæpe initio vomitorium, idque potissimum ex hypecacoanna, quia sæpissime ex prava Militum diætâ ortum ducit: sed quod subinde, si malignitas post primum non satis emisit, repetendum.

Deinde, quia fauces in ea plerumque valde inflammatae, aridæ, fuscae & siccae sunt, atque capitis dolor vehementer valde molestus esse solet, quæ mala sæpius nimio potu vini hungarici vel spiritus vini ortum ducere solent, non solum Venæ sectio in brachio aut pede, sed etiam in venis jugularibus & raninis, itemque gargarismata ex decocto & succo herbæ sedi majoris, vel endiviæ cum nitro depurato, vel antimonio liato, aut lapide prunellæ, aut sale ammoniaco, cum

syrupo mororum necessaria ac proficua esse solent. Ita & *mucilago seminis cydoniorum* aqua rosarum parata, cum syrupo mororum & nitro; faucibus & linguæ aridæ sæpius illita, egregie opitulatur.

18. *Hæmorrhagiæ quæcumque in his morbis*, & *imprimis narium criticæ* præmature non sunt sistendæ: facile enim ægri his in morbis sine noxa aut vitæ periculo duas sanguinis libras amittere possunt; cohibita vero, citius quam par est, gravissima mala, ut calorem majorem, dolores capitis vehementes, anxietates circa præcordia, præsertim vero deliria & phrenitidem inducere valent. Quod si vero sint nimia, tandem fisti debent, & quidem externe aceto, vel solutione aluminis aut vitrioli, in aqua cum turundis in nares immixtis; interne temperantibus, nitrosis. Multi quoque hic *bufonem* sub axillis alligatum valde commendant.

19. *Vomitibus*, cumprimis in causo, aut febris biliosis, itemque in variis malignis, quia plerumque salutares aut criticæ hic sunt evacuationes, per adstringentia & opiata, ut ab imperitis sæpe fieri solet, præmature non sunt sistendi, sed potius in vomitu potus largus aquæ tepidæ, vel decocti tenuis hordei vel avenæ, vel herbæ cardui benedicti, addito pauxillo *hypecacoannæ*, ad materiam acrem probe eluendam & ejiciendam sæpe ingerendus, donec sponte remittant; at tamen si nimis diu continuant, tandem *theriacæ* vel *diascordi* ʒj. ex aqua cinamomi, cydoniata semel iterumque data conducit.

20. *Alvi quoque fluxus* quicumque, non mox adstringentibus curandus, sed materia peccans per diluentia potius & blanda evacuantia, imprimis *rhæbarbarina* & *tamarindinata*, deinde & absorbentia ac nitrosa, partim evacuanda, partim corrigenda, ita post aliquod tempus plerumque sponte cessat. Aut si his præmissis, non remittat, ægrique debiliores fiant, *Diascordium* *Fraxinæ* castorii, vel *theriaca*, ad ʒj. ut modo dictum est § 19. vel pulvis *cascaïllæ*, a gr. iij. vj. ad xij. cum pulveribus temperantibus vel terreis, ut coralliis, CC. ulto, terra sigillata, pulv. bez Sennert. vel anglicano vel pannonico rubro, ex aqua cinamomi cydoniata vel

vel aqua menthæ sæpius, donec cesset, exhibenda; aut
Essent. cascarillæ & Essent. scordii aut diascord. propi-
nanda; hæcque potissimum horis matutinis, illa a me-
diedie & circa vesperum.

Crystallus montana præpar. ac nitro aut cascarillæ,
aut utrique simul sociata, in diarrhœis excedentibus
quoque egregia est, maxime si magis, quam antea,
ad sudorem se componant ægri, eumque patienter fe-
rant. Ita & *emulsiones* ex amygdalis dulc. & semine
papav. alb. paratæ, ad ℥j. sæpius exhibitæ, non raro
has diarrhœas compescunt.

21. In diarrhœis febrium quarumcumque & præsertim
malignarum (a), aut si tempus frigidum, præter jam
dicta, opera danda, ne æger e lecto facile surgat ad al-
vum exonerandam; quia diaphoresis, hic adeo neces-
saria, impediretur, sed potius vas vel patina apta ægro
in lecto decumbenti supponatur; vel si hæc desint, aut
alias surgendi necessitas incidat, ut vestibus, stragulis,
aliisque rebus a frigore probe defendatur, frigus enim
hic valde noxium est, adeoque & potus semper vel
calidus sit vel minimum tepidus. Nitrum deinde cum
absorbente & pulv. cascarillæ junctum, atque parca,
sed repetita sæpe dosi exhibitum, remedium hic, &
præsertim etiam in *variolarum* & *morbilorum diarrhœa*,
alias valde periculosa, est efficacissimum: imprimis si
emulsio (N. XX.) laudata, addita ℥j. vel altera gum-
mi arabici, ad acre in intestinis temperandum sæpius
interponatur.

22. Si *Dysenteria* febris superveniat, eadem curandi
ratio est adhibenda, vel & sæpius ægro Ess. rhabarbari
ochleare unum, ad materiam noxiam evacuandam,
donec malum remittat, exhibeatur, atque etiam ægro
in lecto, si alvum deponit, vas subjiciatur; vel si sur-
gere vult, vas aquam calidam continens supponatur, &
stragulis vel vestibus probe contegatur; *Clysteres* ex la-
te & theriaca hic quoque egregie profunt; conf. simul

(a) Quas sæpe salutare esse, præter alios cel. Hoff-
mannus egregie probavit, in Dissert. de diarrhœa in ma-
gnis salutari, aliisque scriptis.

Cap. XIII. N. XIV. & seq. ubi speciatim de Dysenteria agitur.

23. In singultu febrium acutarum prodest *spiritus niri dulcis* cum essent. quadam alexipharmaca ad gutt. xx. vel xxx. per intervalla ex infuso Theæ vel aqua diaphoretica datus, donec cesset.

24. Ob vigilias aut capitis dolores ægris non facile opiata, præsertim fortiora, exhibenda, quia obstructiones inferendo morbum plerumque reddunt graviolem, atque deliria, soporem, aliaque prava symptomata facile inferunt; febre enim, laudatis remediis mitigata, aut superata, symptomata hæc sponte cessant. E contrario potus sufficiens, aquosus, acidulus, medicamenta nitrosa, cinnabarina, & emulsiones tenues præsertim papaveratæ, hic multum valent. Externæ in principio dolorum capitis, spiritus vini camphoratus fronti & temporibus, vel per se, vel philonio Romano roboratus & cum splenio calide applicatus, prodest; in progressu autem acetum rosarum vel solum, vel cum nucleis persicorum aut amygdalis amaris rasis, impositum; vel & emulsio ex semine papav. & nucleis persicor. cum aqua solani parata, addita portiuncula camphoræ egregie conducit, vel & unguentum alabastrinum camphoraque roboratum temporibus illini potest. Clysmata etiam emollientia, ubi alvus simul obstructa, hic multum contra dolores capitis & vigilias prodesse possunt: ut & cataplasma ex fermento panis cum ruta, sinapi, sale & aceto plantis pedum impositum.

25. In anxietate & cardialgia febrium petechialium aliarumque malignarum affinium, præmissa hypecacouana, theriacæ ʒj. cum salis absinthii & antimonii diaphor. a gr. xv. ex aceto bis vel ter post intervalla duarum vel trium horarum, si malum citius non remittat, apte exhibetur, subiectis potiunculis diaphoreticis camphoratis.

26. In capitis doloribus & deliriis harum febrium præter modo dicta, etiam sanguisugæ, temporibus & post aures adhibendæ, itemque vesicatoria pone aures, brachiis, cervici, & suris pedum, item sinapismi brachiis & plantis pedum, revellendi atque avertendi fine, imponendi; interne vero nitrum & camphora, vel in pulvere

vere cum aliis temperantibus, vel in emulsione sæpius, quovis scilicet bihorio aut trihorio, danda.

27. *Contra tussim* sæpe molestant cum primis *catarrhum febrium infusa aquosa* ex speciebus pectoralibus parata, calida subinde sorbillata, itemque *emulsiones* ex amygdalis, sem. card. bened. card. Mariæ, papav. alb. & aquis pectoralibus, ut scabiosæ, hyssopi, tussilag. card. bened. confectæ, præsertim versus noctem æpius datæ, egregie conducunt: ita & *linctus pectorales* ex oleo amygdalarum dulcium, syrup. violar. vel papav. err. & sperm. ceti, addito pauxillo laudani liquidi, usum hic habent non spernendum, si circa tempus, quo tussis maxime affligit, assumuntur. *Acida vero mineralia*, quæ ob vehementiam tussim facile augent, tunc sunt vitanda.

28. Quando *faucium inflammationes* percipiuntur, ita ut ægri de *deglutiendi difficultate* conquerantur, mox *argarismata* leniter adstringentia & resolventia, rad. tormentillæ, bistortæ flor. & fungis samb. flor. ros. papav. rhead. aqua japon. nitro & paucò alumine, vel tiam sale ammoniaco, addito syrupo mororum vel nukum, sunt adhibenda. Externe emplastra discutientia, ut Empl. de meliloto camphorarum, vel sacculi ex herb. aut florib. resolventibus applicandi, itemque si *ilvus obstructa, clysmata, vel ipsa lenia laxantia* ex tamarind. fol. senn. rhabarb. & manna, revellendi fine, nature exhibenda, antequam *aphthæ*, quæ plerumque in his casibus periculosissimæ sunt, superveniant, & quando *faucium tumores*, ingruente febre, *incidunt*, hæc laxantia optimo cum successu mox in principio antur.

29. Alias vero, ubi *anginæ indicia*, ut cum difficili deglutitione difficilis quoque *respiratio* incidat, Venæ sectio larga & quidem primo vel in brachio, subuncto idoneo purgante vel adhuc melius in pede; deinde, si malum non remittit, in *vena jugulari*, ac deique sub lingua *in raninis*, si præcedentes non suffecerint, instituenda est, itemque *clysmata* sæpius applicanda, atque vesicantia extus variis partibus imponenda.

30. *Aphthæ* in febribus malignis, quæ pessimi sunt

moris & indicii, abstergendæ Eff. succini & myrrhæ; vel pimpinellæ, ope penicilli; vel & liquore myrrhæ per deliquium, interponenda gargarismata ex decocto herb. plantag. aut veronicæ cum melle rosar. & syrupo mororum; vel ex aqua plantaginis phlegmate vitrioli acidulata.

31. *In continuis remittentibus* ante novam accessiorem pulveres salinos antifebriles temperantes, vel adhuc magis, *corticem peruvianum* dare utilissimum.

32. *Sudores nimii* sive *colliquativi* requirunt aerem cubiculi frigidiusculum, integumenta lecti leviora ac tenuiora, potum frigidiusculum, acidulum, ad quem & serum lactis & lac ebutyratum pertinent, Tinctura rosar. aliæque acidulæ, vel & horum loco spir. niri aut vitrioli dulcis, ac denique terrea, ut terra sigillata, corall. rubr. gemmata & præsertim spec. de hyacinth. cum nitro & pauxillo opii, vel & dosi diascordii.

33. *Vires debiles*, præsertim in *malignis* vel in statu & deelineatione benignarum, potiunculæ analepticæ, cum confect. elkerm. Tinctura coralliorum, emulsiones ex amygdal. dulc. pistaceis, pineis, sem. card. Mariæ, card. bened. aqua borrag. bugloss. rosar. cinam. flor. aurantior. lilior. convall. totius citri, cordial. frigid. perlat. & camphora roboratæ: itemque *poma citria*, *aurantia*, *sinesia*, aliaque similia quocumque modo exhibita; immo & ipsum *vinum* bonæ notæ modice sumptum, præsertim si ægri illud appetunt, tam merum, quam aqua temperatum & pauxillo sacchari edulcoratum, adjectis vel omissis orbiculis dissecti pomi citrei, egregie refocillant. *Externe* carpis manuum & quandoque etiam cordi, aqua Anhaltina, Reginæ Hungariæ, carbunculi, itemque aceta varia, ut rosarum, lavendulæ, rutæ, caryophyllaceum, &c. tepide applicantur, quæ & naribus pro odoratu sæpius adhibita roborant.

34. *Contra convulsiones*, in his febris, quæ symptomata sunt periculosissima, prodest spiritus cornu cervi, vel liquor succinatus, sal CC. volatile, itemque pulvis ex sale card. bened. nitro, cinnabari & camphora: quibus nonnulli etiam vel pauxillum opii addunt, vel theriacam interponunt.

35. In Febris, quæ gangrænam aut sphacelum comitantur, interne ad hæc mala compescenda, ex nobilissimis observationibus valentissimus sæpe est cortex Peruvianus, eadem ratione, ut in vehementibus febribus intermittentibus, sæpius & larga satis copia exhibitus.

36. Post febres acutas omnes & præsertim exanthematicas ac malignas usus lenium alexipharmacorum, quæ simul stomachica sunt, ut Essent. cort. aurant. genian. pimpinellæ, angelicæ, helenii, card. bened. cascarillæ, scordii, adhuc aliquandiu continuandus est: si speciatim quoque cortex cascarillæ vel in pulvere, vel in electuario, vel ejus extractum in pilulis egregiam utilitatem præstant. His etiam *lene laxans* sub inclinatione, immo etiam in fine, antequam aerem rursus ingrediuntur, cum fructu interponitur, sic appetitus ac vires citius redeunt, ægrique rectius reconvalescunt.

37. Si post acutas vires & appetitus redire nolint, ergans dandum, & postea stomachica subjungenda: ut ut plurimum tunc appetitus, ob humores vitiosos in ventriculo hærentes, læsus est.

38. Denique reconvalescentes post quascumque tales vires operam dent, ne facile errores in dieta committant; cumprimis ne carnes, maxime duriores, aut pinguioribus, præsertim suillam, aliaque concoctu difficilia cito comedant, aut etiam in levioribus copia cedant. Vitent etiam adhuc aliquandiu aerem frigidum, ventosum ac pluviosum, matutinum & vespertinum. Nisi enim hæc observent, facile in febres novas, æque sæpe peiores, immo sæpissime lethiferas; vel etiam in alios graves morbos relabuntur.

CAPUT IV.

*De Febris exanthematicis & speciatim de Variolis
ac Morbillis, quibus purpurata & pete-
chialis subjunguntur.*

I.

*De exan-
themati-
cis spe-
ciatim
agendū.* Quid Febres exanthematicæ sint, & quidem nomi-
natim Variolæ & Morbilli, quænam earum dif-
ferentiæ ab aliis, supra jam Cap. III. n. VI. dictum,
earumque etiam curatio generalis eodem Capite tradi-
ta est. Interea tamen earum frequentia, dum pauci
homines ab his prorsus liberi manent, illarum discrimen
ac valde dubius sæpe eventus aliæque causæ me
permoverunt, ut de iis adhuc specialius hic exponere
consultum duxerim.

I I.

*Quatuor
variola-
rū tem-
pora sūt
notanda.* Inprimis vero in Variolis melioris curationis causæ
probe cum Sydenhamo notanda *quatuor earum tempora*,
invasionis scilicet, *eruptionis*, *suppurationis*, & *exsicca-
tionis*, ut tanto accuratius, quid in quovis optime sit
agendum, observare queamus. Tempus igitur 1. *inva-
sionis* sive *ebullitionis* materiæ p. n. aut malignæ voca-
tur primum morbi tempus, quando ægri languere aut
male se habere incipiunt, ad tempus, quo maculæ ru-
bræ in cute & præsertim in facie erumpere incipiunt,
quo ægri prægresso plerumque levi horrore, plus mi-
nusve calere solent, quo ipso tempore nonnulli etiam
convulsionibus atque *epilepsia*, cum primis infantes &
pueri, ex improvise sæpe corripuntur: hocque ebulli-
tionis tempus trium quatuorve dierum spatio circum-
scribitur.

I I I.

*Tempus
eruptionis
&
suppura-
tionis.* Tempus vero 2. *eruptionis* vocatur, quando maculæ
rubræ erumpunt & sensim sensimque in papulas elevan-
tur, quod ut plurimum a tertio vel quarto die ad septi-
mum usque durat in veris & discretis. 3. Tempus *sup-
purationis*, a die scilicet septimo ad diem plerumque
unde-

decimum, quo papulæ rubræ in pustulas pure reple-
transmutantur; & 4. *Tempus exsiccationis*, ab un-
timo plerumque ad decimum quartum vel decimum
antum in veris & ordinariis. Sed in *spuriis sive aquo-*
citius & suppuratio & exsiccatio contingere solent,
sæpe die octavo, nono, vel decimo omnino rursus
siccatae sunt, in anomalis vero sive irregularibus ac
alignis eas die xvii. imo vigesimo nondum exsicca-
esse memini, sed *Morbilli* citius, & fere ut vario-
nothæ, intra novem vel decem dies periodum suam
solvunt, & per squamulas exsiccati decidunt, *tussi-*
men plerumque fortiori, quam in variolis, afficiun-
t.

I V.

Caussa proxima horum morborum & speciatim vario- *Caussa*
um est *materia quædam p. n. sive vitiosa in sangui-* *earum*
, quam natura, inde irritata, in hoc actu separat *proxi-*
que per cutem sub puris forma expellit, videturque *ma.*
in in utero matris cum sanguine infantibus commu-
tari, quia infantes variolis & morbillis nati legun-
t, aut eis sæpius primis post partum diebus vel heb-
madibus corripuntur, ubi aerem nondum ingressi &
illo adhuc alio victu, quam lacte, usi sunt: & quia
erique homines vel citius vel tardius semel eos susti-
re coguntur. Interea tamen exempla etiam eorum
stant, qui bis, imo ter iis correpti fuerunt.

V.

Diagnos horum morborum ex Cap. III. n. VI. jam *Diagno-*
tet. *Prognosis* etiam valde cum aliis febribus acutis *sis &*
nvenit (ibid. n. VII. & VIII.). Attamen specia- *progn-*
m hic adhuc notandum, quod, *quo citius erumpunt,* *sis.*
plerumque fiant copiosiores, quo vero *copiosiores,*
plerumque, sicut in aliis exanthematicis, periculo-
res, atque ut plurimum *confluentes*, quæ longe majus
tæ periculum portendunt, vel saltem faciem imo &
culos vehementius, quam discretæ, corrumpere solent.
que vero circa finem diei tertii, vel quarto demum pla-
de proveniunt, plerumque pauciores, discretæ & mi-
ores evadunt. Hinc haud probandus est illorum mos,
ni *variolas aliasve quascunque continuas ac speciatim*
exanthematicas vehementioribus & calidioribus expellen-
tibus,

ribus , itemque calore magno hypocausti ac stragulorum præmature expellere satagunt : quia his ipsis sanguis , jam quasi ebulliens , qui temperandus est , magis incallescit & corrumpitur , atque ex levioribus & discretis peiores , confluentes & malignæ conficiuntur . Præterea sciendum epilepsiam , quæ tempore invasionis sæpe pueros aggreditur , quamvis parentes aut amicos sæpe vehementer terreat , plerumque nihil mali denotare , & variolas ut plurimum satis bene ei succedere . Quando autem nimis copiosæ prodeunt , præsertim in facie , aut confluentes sunt , aut malignæ gravioribus & inusitatoribus malis stipatæ , vel collabuntur aut retrocedunt , vel justo tempore non exsiccantur , periculosæ sunt ; & contra , minus periculosæ , si blande & tarde prodeunt , & discretæ & paucæ sunt , atque sine gravibus symptomatibus .

V I.

Curatio
per ino-
culationem .

In curatione igitur lenissima via per blanda temperantia , diluentia , & diaphoretica , ut in aliis continuis , mihi & plerisque hoc tempore bonis practicis optima deprehensa est . Antequam vero de hac plura dicamus , pauca monebimus de ea curandi ratione , qua multi variolas periculosas , malignas & confluentes , per ita dictam inoculationem benignarum , præcavere studuerunt , & quam minime rejiciendam , sed potius maxime salutarem , generique humano utilissimam esse existimamus .

Nam omnino verisimile videtur , jam ab utero materno variolarum materiam sanguini admixtam esse , quæ semel in omni propemodum homine defervesce debet . Quod ipsum quo citius , sive quo minori ætate hoc fit in infantibus aut pueris , eo securius ab eo veneno ut plurimum liberantur , atque eo melius evadunt . Quo autem diutius hæc pestifera materia hæret in sanguine , eo peior ac malignior ea fieri videtur , dum observatur , adultos plerumque longe gravius inde affligi quam pueros , & quam plurimos illorum veneni vehementia vinci . Igitur quando variolarum benignarum insitio præstat , ut citius atque in ipsa infantia , præparato præsertim corpore , defervesce sanguinis istud venenum queat , dubium sane mihi non est , quin homines quam plurimi , præsertim nobiliores & Principes quam

am aptissime non solum ab ipso mortis discrimine ;
 rum etiam a variis aliis gravibus malis , quæ mali-
 as sæpe comitantur , hoc ipso curationis genere de-
 adi , atque faciei pulchritudo oculorumque integritas
 conservari queant , quæ alias quam sæpissime graviter
 duntur , immo visus acies haud raro maximo cum
 rorum damno ac molestia omnino tollitur .

Neque curandum , quod timidiusculi hic opponant ,
 in experientia frequens in Turcis & Anglia , in Ger-
 enia vero , Hanoveræ , Onolsbaci , Pyrmonti , aliis-
 e locis ejus utilitatem satis comprobaverit . *Quomo-*
autem hæc inoculatio sit instituenda in Chirurg. no-
æ P. II. Cap. XV. docuimus .

V I I.

Cæterum in curatione vario modo , pro morbi varie- *Curatio*
 te & vario morbi tempore , est procedendum . Nam *leviorū.*
blande , hoc est , *sine gravibus malis invadunt &*
impunt , ægrique bene se habent , a medicamentis se-
 omnibus , vel saltem calidioribus aut vehementiori-
 s expellentibus abstinendum , atque *totum hoc opus*
cure recte agenti relinquatur , suadendo solum regimen
 temperatum , quietum ac diapnoicum , legitimam vi-
 sis rationem ex vegetabilibus , cum potu cerevisiæ te-
 is , vel alio aquoso , ut decocto avenæ vel hordei ,
 in aliis febribus levioribus , & inprimis etiam hic
drogalæ potum ex part. iij. aquæ & part. j. lactis
 alde idoneum deprehendi , servando ægros extra le-
 tam , quamdiu ambulare possunt ac volunt . Alii pro
 tu valde commendant *decoctum milii* , nonnulli etiam
otium ; quæ etiam non contemnenda .

V I I I.

Quando autem opus eruptionis non legitime succe- *Quæ*
 t , sed ægri *anxietates* , *inquietudines* , & *æstum ni-* *diffici-*
um , aliave mala sentiunt , in *calidioribus* nimius im- *lius e-*
 tus est cohibendus : & quia materia sive venenum *rumpit.*
 riolarum tunc peioris est indolis , ea corrigenda &
 temperanda per pulveres temperantes , cinnabarinos ,
 l apud eos , qui pulveres averfantur , sicut infantes
 pueri sæpe facere solent , per tincturas refrigerantes ,
 r flor. papav. rh. vel aquilegiæ : quibus quarta vel
 inta pars spir. nitri. dulc. commode addi potest ,
 item-

itemque per potiones & emulSIONES similes, potum sufficientem idoneum (N. VII.) acidulatum, atque regimen frigidius. *Sed in frigidioribus variolæ eruptionis tempore difficilius erumpunt*, vel depressoires subsistunt indeque ægri anxietates persentiscunt, atque vehementius ægrotant: stimulanda atque juvanda est natura *lenibus alexipharmacis*, ut radice *helenii* frustulo cerevisiæ tenui, tanquam potui ordinario injecto, quod vulgi nostri est remedium, vel granis aliquot *myrrhæ* prædictis pulveribus additis; vel essentia scordii, *helenii* vel alexipharmaca, aliquoties in die parca dosi cum potu calido, imprimis Thea pectorali exhibita, itemque *aquis diaphoreticis* & speciatim fumaricæ, card. bened. aut flor. sambuci, vel etiam *emulsionibus* ex seminibus aquilegiæ, cardui Mariæ & napi, paratis. *Decoctum* ex ficibus & herbis diaphoreticis aut pectoralibus compositum, præsertim ubi forte simul tussis adest, egregium hic est, si aliquoties in die calide bibatur ubi etiam in paullo graviore malo *vesicatoria* recte brachiis & pedibus applicantur. Cæterum *in mitiori siu medio statu*, quando variolæ non nimis facile erumpunt blanda diaphoretica ex prædictis aquis & terreis citratissive temperantibus pulveribus, cum syrupo acidulgratis redditis, sufficere sæpe solent.

I X.

Ubi Venæ
na se-
canda.

In paulo peiori statu invasionis, *ubi calor & ebullitio sanguinis est admodum vehemens*, præsertim in juvenibus & adultis sanguineis, principio utilissime *sanguis larga satis copia detrahitur*: id quod præcipue iis est faciendum, qui quotidie laute vivunt, vinumque simul & quidem larga copia bibunt, sicuti aulici nobiles juniores, & magnates; alias plerumque sunt confluentes, & ægri inde moriuntur. Ubi vero hæc indicia non adsunt, aut ægri defectu virium laborant consultius intermittitur.

X.

Quando
evacuã-
tia dan-
da.

Sic, si eodem tempore *nausea, anxietas, aliave vomitum indicantia adsint signa*, tunc sicut in aliis febribus (Cap. III. N. XIII.), docuimus, præmissa, si æger est plethoricus, *sanguinis detractio*, vomitus radice *hypecacoannæ* exitandus, vel si vomitorii usum res qua-

dam

in vetant, aut indicia Saburræ crudorum humorum intestinis adsint, hi *leni purgante ex rhabarbari*, vel *apæ & mercurii dulcis* apta dosi, vel *decocto rhabarbari* in aqua vel sero lactis cum manna, vel *tamarinum* vel *passularum cum manna*, vel & Tinct. sive ma rhabarb. commode evacuari (a), hisque *temperantia*, *diluentia* ac *diapnoica* sive lenia expellentia, materia vitiosa acri corrigenda & expellenda, subigi, prudenterque per eruptionis & suppurationis tem-
continuari possunt.

X I.

Si invasionis atque eruptionis tempore *calor vehemens*, sive nimia ebullitio in ejusmodi ægris percipitur; ter laudata temperantia, N. VIII. ad hanc modicam *acida* quoque remedia, Cap. III. N. XII. laudata, in potu ordinario & in potiunculis data egregie sunt; eo autem post eruptionem imminuto, *diapnois* & *potu sufficiente*, temperante, eruptionis & suppurationis tempore prudenter continuandum. *Epilepsia invasionis tempore incidens*, nulla alia, quam lenia expellentia, addita pauca cinnabari, tanquam nervino, currit, eisque plerumque variolis provenienti-
bus ce-

*Quid in
vehe-
mentio-
ri inva-
sione fa-
ciendū.*

X I I.

Si *variolæ* eruptionis vel suppurationis tempore *retrocedere videntur*, *vesicatoria* brachiis, pedibus & cervici applicanda, atque interne *alexipharmaca* sive expellentia paullo fortiora, N. VIII. laudata, corpore tecto, ex vehiculo calido sunt exhibenda: id etiam, & quidem adhuc majori cura est faciendum, quando jam retrocesserunt, alias certa fere mors subsequitur.

*Quid si
retroce-
dere vi-
dentur.*

X I I I.

Tussis in variolis, & cumprimis etiam in morbillis vehementer sæpe affligens, temperatur, omis-
sis mineralibus, *infusis pectoralibus* ad modum her-
Theæ, aliquoties in die, usurpatis, itemque emul-
sioni-

*Quomo-
do tussi
meden-
dum.*

(a) Multi quidem evacuantia quæcunque hic me-
ntat & prohibent; ego vero alique præstantes Me-
dicina ea utilia deprehendimus.

tionibus, aquis & essentiis diaphoreticis, N. VIII. quæ ipsa quoque tussi post variolas haud raro affligenti & phthisin sæpe minanti, optime opponuntur, ubi etiam *linctus pectorales* ex oleo amygdalarum dulcium & syrupis pectoralibus cum fructu his adjungi possunt.

X I V.

Quomodo oculi præservandi. Quoniam vero oculi in variolis sæpe vehementer afficiuntur, ut non pauci inde visu vel omnino, abscessibus scilicet in ipsis subortis, vel saltem ex parte pri-ventur, quando nimirum cicatrices & maculæ in cornea iis concitantur, ad mala hæc præcavenda & aver-tenda optime conducit, si *allii* a sano homine *manducati vapor* in oculos ægrotantium aliquoties in die in-spiratur; vel si *splenia spiritu vini, camphora & croco* im-pregnata, imbuuntur, ad ignem deinde fere rursus exsiccantur, oculisque, aliquoties in die renovata, im-ponuntur. Ægri vero a splendore solis & ignis, *frictionibus* oculorum rudioribus & *ploratu* quoque sibi cave-re debent. Infantibus, præter vaporem allii, etiam utiliter *lac muliebre* ex uberibus in oculos aliquoties in die instillatur; vel in hujus defectu, *lac aliud te-pidum, croco impregnatum*, eadem ratione adhibetur.

X V.

Qua ratione fauces? Præterea tam oculis quam faucibus a malis metuen-dis præservandis, (nam hæ sæpe intus valde intume-scunt, ut ægri vix deglutire possint) egregie quoque conducit, si *quid croci & camphoræ*, linteolo inclu-sum, anteriori collo appenditur, atque per totum pe-riculi tempus ibidem relinquitur, imo & dierum triu-quatuorve intervallo renovatur. Deinde si jam aliqui-tumor fauces occupavit, adhibendum *gargarisma* repe-mens, ex radic. bistortæ, floribus rosarum & malvæ cum syrupo mororum paratum, atque extus vel cr-cus vel theriaca cum camphora, collo circumdatur.

X V I.

Quid glutina-tis pal-pebris. Si palpebræ ob inflammationes sunt glutinatæ, ut si-pe fieri solet, vi numquam sunt divellendæ, quia in-flammatio inde augeretur, & visus læsio inde esset m-tuenda: hinc, si dolores aliave symptomata desunt in ægris, qui judicio pollent, ita sine damno relinqui possunt, donec sponte dissolvantur. Sed si dolores a-vehe-

hemens pruritus in oculis urgeant, vel ægri infans sunt vel impatientes, & oculos aperire volunt, ferari possunt vel *saliva ægri* aut alterius hominis ni ac jejuni, vel lacte tepido, & cum primis camphora & croco imprægnato, si eis sæpe foveantur, donec a se invicem rursus recedant. Idem quoque prætere potest *oleum ovorum* recens paratum & inflammationis minuendæ causâ camphora roboratum.

X V I I.

Alvi obstructio tempore eruptionis, immo & primis purpurationis diebus neque clystere, multo minus purgante est irritanda, quamvis per septem vel octo dies turet, præsertim quando æger nullum inde percipit incommodum. Sed si nimis diuturna, aut æger ventris dolores aliave incommoda inde sentiat, primo victu luscante ex prunis vel pomis coctis, itemque decocto marindorum, pauco saccharo edulcorato, loco potus ordinarii solutio est tentanda, quæ vero si parum succedat, aut periculum sit in mora, *clystere emolliente* solvenda.

*Quid
alvo ob-
structa?*

X V I I I.

Alvi fluxus contra, qui ut plurimum valde periculoso, cohibetur pulveribus terreis, ut pulv. pannon. board. Sennert. vel Anglicano, cortice cascarillæ & nitro roboratis, in primis crystallo montana, coralliis rubris præparatis, vel & CC. usto aut cera sigillata, ex aqua menthæ vel cinamomi cydonata, parca, sed sæpe repetita dosi data, ut in initio 9. & 10. Cap. III. dictum est, curatur. *Dysenteria* vel eadem ratione, vel interposito in magis graviore, præsertim vesperi, leni opiato ex diacordio, vel laudano liquido, aliove simili, itemque clysteribus ex lacte & theriaca subinde injectis, curatur, ea simul adhibita cura, ne ægri, quando sum exonerare volunt, e lecto surgant, quod ob refrigerationem, hic summe noxiam, probe vitandum. Atque illa ipsa quoque medicamenta interna in initio nimio, præmisso potu largo aquæ tepidæ, sæpe repetitis modicis dosibus, optimo cum successu adhibentur.

*Quid ea
nimis
soluta?*

X I X.

Quid in
hemor-
rhagia
narium?

Hæmorrhagiæ sive profusiones sanguinis e naricibus, plerumque hic sunt salutares; adeoque nisi forte nimix, non sistendæ, sed sibi relinquendæ, donec sponte desinant; sin vero nimix, ita ut æger valde inde debilitetur, eadem sunt faciendæ, quæ Cap. III. monito 18. commendavimus.

X X.

Quid in
deliriis
& con-
vulsio-
nibus?

Contra deliria & convulsiones pulveribus temperantibus, nitrosis, cinnabaris & camphoræ aliquot grana, immo & pauxillum opii vel theriacæ addantur, atque emulsiones quoque cum camphora, aut potiunculæ ac tincturæ acidulæ his sæpe interponantur. Vesicatoria deinceps furis & cervici applicentur, atque clysmata revellendi & temperandi scopo cumprimis ex sero lactis, nitro & melle, vel saccharo, vel aqua tepida cum nitro, injiciantur, & subinde aliquot guttullæ spiritus CC. vel liquor CC. succinati exhibeantur.

X X I.

Quid in
virium
defectu?

In virium defectu, quia variolarum recessus metuentus, dandæ essentix diaphoreticæ, alexipharmacæ, vel Tinctura coralliorum, & aquæ roborantes pro fibris languidis stimulandis, hisque subinde interponatur haustus vini rhenani vel alius generosi ac bonæ notæ, quale forte æger maxime appetat. (Conf. monitum 20. Capitis III.) Atque hoc ipsum in tarda nimis suppuratione & exsiccatione variolarum, quia hæ plerumque ob vires nimis prostratas contingere solent, fieri debet, ubi & myrrha pulveribus expellentibus cum fructu ad aliquot grana additur.

X X I I.

Quid in
lingua
& na-
rium vi-
tiis?

Lingux & labiorum fissuræ demulcentur mucilagine seminis cydoniorum sæpe illitæ. Sed in narium vehementi exulceratione turundæ oleo ovorum imbutæ, in eas immittendæ, & subinde renovandæ, ne inde forte, ut aliquoties vidi, inter se concrecant, & respirationem postea ac loquelam valde corrumpant.

X X I I I.

Quid in
nova cõ-
fluentiu
febris?
febris?

In variolis confluentibus suppurationis tempore, & cumprimis circa undecimum morbi diem, nova quedam febris incidere, eaque ipsa sæpe perniciosissima mala,

ac

et mortem ipsam haud raro concitare solet . In hoc
 erum statu , ubi vehementissimæ anxietates aliaque
 effima symptomata plerumque oriuntur, *nihil magis*
modest, quam *si atrox lenibus purgantibus ducitur* : id
 quod optime fit decoctis sive potiunculis ex tamarin-
 s, vel rhabarb. aut foliis sennæ paratis, quorum apud
 ultos uncis tribus, deinde mannæ ℥j. additur, unde
 erumque magnum levamen sentiunt, aut prorsus ab
 malis liberantur. Quod si vero his prima vice præ-
 sta symptomata non valde imminuta sint; eadem
 edicamenta semel iterumque sunt repetenda, donec
 tri melius se habeant. Nam hic periculum a pur-
 gentibus ejusmodi non est metuendum, ut quam plu-
 ni hucusque sibi imaginati sunt, cum evacuando ma-
 iam noxiam, morbi tempore in intestinis collectam,
 regie profint, iisque omissis vel neglectis, hi ægri
 rumque moriantur. Conf. celeb. Angli *Freindii* Lib.
 purgant. in nova variolarum confluentium feбри ad-
 pendis, & *Dissertatio nostra de Manna* ejusque usu in
 va hac confluentium feбри.

X X I V.

Ad foveas & cicatrices turpes faciei evitandas non- *Quid*
li suadent, ut ægri tempore invasionis pediluvia te- *ad tur-*
a emollientia quotidie adhibeant, atque mox quoque *pes ci-*
impetum a capite & facie averrendum, vesicatoria *cicatrices*
chiis & pedibus eorum, revellendi causa, applicen- *evitam-*
: quarum vero rerum periculum meis ægris hucus- *das?*
 varias ob rationes suadere nolui. Attamen circa
 m suppurationis pustulas majores *acicula* *aperiri ju-*
 ut pus effluere atque partes subjectas erodere ne-
 at. *Pustule exsiccatae* eundem in finem avelli, &
 ulcerata deinde oleo amygdalarum dulcium vel
 ararum, vel ovorum illini possunt, ita foveæ vel
 æ vel saltem minus deformes remanent, præsertim
 gri antea in regimine præscripto temperamento ser-
 neque calidioribus medicamentis tractati fuerunt,
 te a quibus alias deformes cicatrices sæpissime pro-
 untur. Pustulis exsiccatis eisque vel avulsis vel la-
 s, facies sæpius vapore lactis calidi, vel decocti ave-
 foveatur, quod multum ad cutis æqualitatem & le-
 tem producendam facit.

Quid
morbo
supera-
to?

Morbo superato ægri semel iterumque, præsertim post peiores variolas, *antequam aerem ingrediuntur*, (quod non nimis cito fiat,) *probe sunt purgandi*; hisque purgantibus semper apta *mercurii dulcis* dosis est addenda; alias plerumque varia gravia mala & cum primis ophthalmiæ, spina ventosa, tumores glandularum, & ulcera varia variolas sequuntur: id quod etiam *in oculorum inflammationibus* variolas sæpe excipientibus, est faciendum; quibus vero adhuc diaphoretica varia & imprimis infusa ex herba euphrasiæ, veronicæ, sem. fœniculi, ligno sassafras, sunt interponenda & subjungenda, haud omissis idoneis collyriis aliisque discutientibus, quæ in aliis oculorum inflammationibus prodesse solent.

X X V I.

Quomo-
do pejo-
res præ-
caven-
dæ?

Quando variolæ epidemicæ grassantur, magnates, nobiles, aliique honoratiores a Medicis desiderant remedia, quæ liberos præparent, ne, si forte eos aggrediantur, nimis copiose aut periculose a variolis corripiantur. Ordinavi sæpius & adhuc ordinare in ejusmodi casibus soleo, primo purgans, ætati & viribus aptum, ex mercurio dulci & rhabarbaro, vel jalapa, aut similibus; hocque præmisso, *Tincturam* quandam acidulam ex floribus rosarum, papaveris, bellidis vel *aquilegiæ* (a), mane & vespere conveniente quantitate ex infuso Theæ, vel cerevisia, vel aqua quadam destillata assumendam, una cum modica & apta *victus ratione*: quibus observatis, plerumque factum est, ut liberi illi vel immunes prorsus a variolis manserint, licet in tota vicinia sævierint, vel leniter saltem ut plurimum eis correpti fuerint.

XXVII.

(a) Ex hoc genere quondam fuit celebris in Germania Tinctura antivariolosa Dolai & Waldschmidtii.

X X V I I.

De Morbillis.

MORBILLI (a) eadem ratione ac variolæ curantur, nihilque fere aliud requirunt, quam quia tussis ægros ut plurimum, aut potius semper, attamen modum minus, modo vehementius affligit, ut ter vel quaterve die ægris detur infusum vel decoctum idoneum pectorale, & huic linctus pectorales subinde interponantur, conf. Cap. III. monitum 27. In nimis vehementi, noctu syrupus diacodii vel extracti papav. errat. j. vel alterum, vel aliud blandum opiatum, modica dosi dari potest, & in fine morbi, sicut in variolis, alvus purgetur.

Quid
Morbilli
desiderent?

X X V I I I.

De Febre Miliari, sive Purpurata.

FEBRIS MILIARIS SIVE PURPURATÆ (a) ratio quoque potissimum in blando regimine temperante ac diapnoico consistit; adeoque potus sufficiens aqueus, acidulus, ut cerevisia tenuissima, vel decoctum panis, vel hordei aut scorzonæræ citratum haud rigidum, & remedia temperantia, diaphoretica, aquientia sæpius, & cum primis N. VIII. hujus Cautis jam laudata, primaria sunt: & quidem sic, ut tunc essentia blande diaphoretica, postea mixturæ, stiunculæ, & pulveres diaphoretici, nitrosi exhibeantur. Interea tamen in maligna, vel ubi nausea vel anxietas cardialgica adest, usus maturus radicis hyeococcae causam horum malorum ut plurimum egregie expellit, ut laudatis remediis temperantibus ac aquientibus curatio tanto commodius absolvi queat.

Quid febris
miliaris?

H 3

Si

(a) Horum Diagnos. vid. Cap. III. n. VI. & Prognosis eod. Cap. n. VII. & VIII.

(b) Diagnos. & Prognosis peti possunt ex Cap. III. VI. VII. & VIII.

Si in puerperis purpura a lochiis suppressis oriatur, sanguis quoque e pedibus detrahatur, & pilulæ Becherianæ noctu simul exhibeantur, ad fluxum eorum, si fieri potest, restituendum. Si non a lochiis suppressis, venæ sectio omittenda, & cetera laudata solum adhibenda.

X X I X.

De Febre Petechiali.

Quid
Pete-
chialis?

Petechiales & petechizantes febres (a) eadem fere ratione per lenissima diaphoretica, diluentia ac nitrosa optime curantur, cavendo sudores coactos. Ubi vero adsunt nausea, vel conatus vomendi, respiratio anxiosa, vel anxietas circa præcordia, principio lene vomitorium, præsertim ex rad. hypecacoanna, utilissimum, immo necessarium est; id quod etiam, si mala illa & præsertim respiratio anxiosa non remittunt, repetendum, eisque diaphoretica lenia cum camphora interponenda & subjungenda.

Alvi fluxus, si adsit, præsertim moderatus, per adstringentia non est cobibendus (b), sed naturæ potius relinquendus, vel ejus successus, quando forte natura segnior aut ad expellendum nimis debilis, leni laxante adjuvandus (c); & postea a prædicta curandi ratione non recedendum, sicuti Capite sequenti uberius exponemus.

Venæ sectio locum non habet, nisi forte ubi magna adsit plethora, vel abusus potionum calefacientium præcesserit.

XXX.

(a) Harum Diagnofis vid. Cap. III. N. VI. & Prognofis N. VII. & VIII. (b) Vid. hac de re *Stahlii* Opusc. Chym. Phys. p. 660. & seq. atque *Hoffmanni* Differt. egregia de Diarrhœa in malignis salutari. (c) Conf iterum si lubet, modo laudata *Hoffmanni*, itemque *Bürchard*. Med. Rostoch. utilissima Differtio, de Febr. Mesenter. Ann. 1727 edita, ubi usum purgantium leniorum in his & similibus febribus egregie evicerunt.

X X X.

De Febre scarlatina.

In Febre, *Scarlatina* dicta (a), quæ per se quidem n adeo periculosa, & pueros fere solum aggreditur, quando levior, sola natura, præsertim si aptum regimen accedat, sæpiissime sine medicamentis curatur; sed paullo gravior, causa morbi optime quoque corrigi- & expellitur sufficienti potu diluente, temperante, dulo, potiunculis & mixturis temperantibus ac di- entibus, ut & pulveribus temperantibus & blande phoreticis, quando ægri a pulveribus non abhor- at, vitatis medicamentis & alimentis omnibus cali- ribus, quia ab his morbus redditur gravior, serva- que eodem regimine & victu, ut in ceteris exan- thematicis ac speciatim variolis (b). Qua via macu- post aliquot dies sensim disperebunt, cuticula fere a per lamellas decider, & ægri tunc reconvalescunt: o tempore purgandi, & postea adhuc per plures dies cubiculis, præsertim si tempestas frigida est, conser- adi, ut transpiratio aliquamdiu libera conservetur, note quod ad sanitatem integram recuperandam val- hic est necessarium.

X X X I.

Quod si vero ægri aut parentes hoc negligent, post circiter hebdomadas tumores ventris, immo totius e corporis, sive *anasarca*, cum, vel sine febre cor- untur, immo & tumoribus glandularum aliisque sæ- s. malis gravibus; *urina* simul solet esse fusca ac bida, & multi inde moriuntur. Cum vero novus morbus (quem quidam pro altera febris scarlatinæ modo habendum esse censent,) ex retentis noxiis moribus in corpore ortum trahat, optime ei mede- remediis, quæ hos humores e corpore educunt: id

H. 4

quod

a) Diagnos. tradita est Cap. III. N. VI. (b) Ob- are etiam hic juvat, hæmorrhagias narium in hoc rbo plerumque non nocere, sed potius prodesse dum hora eum reddit. graviolem.

Quid
Scarla-
tina?

Qua via
anasar-
ca post
scarlati-
nam cu-
randa?

quod optime fit ; 1. alvum ducentibus , iisque per intervalla repetitis ; 2. quæ eos per urinam , utpote quam viam natura , urina illa fusca & turbulenta , indicare videtur , expellunt : quale præ ceteris est tinctura tartari bis terve in die ad x. xv. vel xx. guttas exhibita ; vel & huic liquor terr. foliat. tartari aut spiritus nitri dulc. commode admisceri potest ; 3. quando infantes aut pueri purgantia assumere renuunt , *clysteribus* quoque e decoct. fol. fennæ satis apte purgantur (a) ; *Sudoriferis* vero hic nihil efficitur , dum sudor vix ulla ratione obtineri potest . Interea tamen *partes tumidæ a frigore probe sunt defendendæ* : nam si valde frigent , sæpe instantis mortis indicium præbent . Si *febris combinata* est , quæ frequentissimum hujus mali solet esse symptoma , mixturæ & potiunculæ temperantes ex aquis diureticis paratæ , horis pomeridianis & vespertinis sedulo exhibendæ . Alia symptomata remediis suis propriis sunt oppugnanda .

X X X I I.

Obser-
vatio ra-
tione re-
giminis.

Denique in omnibus exanthematicis *refrigeratio* , item-
que *lecti & indusii mutatio summe sunt noxia* , adeoque serio vitanda : nam hæc facile mortem , ut sæpe vidi , aut gravissima saltem mala inducunt . E contrario autem *nimius calor* quoque est perniciosissimus . *Transquillus vero decubitus in moderato & æquali calore* , ad blandam & æqualem transpirationem semper conservandam , quam utilissimus est , atque quam maxime commendandus , nisi forte in lenissimis Variolis , morbillis , scarlatinis & urticatis , ubi *deambulatio in cubiculo temperato , clauso* , ipsis concedi potest , quamdiu ambulare volunt aut possunt .

CA-

(a) De hac febre scarlatina haud pridem peculiariter libellum evulgavit cel. Medicus Gothanus , Jo. Storchius , Gothæ 1742. 8. lingua vernacula .

CAPUT V.

De Febris acutis stomachicis & intestinalibus quibusdam, mesentericis dictis.

I.

D Enique peculiare adhuc genus est februm acutarum a plerisque Scriptoribus hucusque valde neglectum, quod ratione symptomatum & curationis multum a ceteris differt, attamen apto satis nomine nonnumquam descriptum, & plerisque adhuc prætervisum esse mihi videtur.

Peculiare acutarum genus.

I I.

Differt autem a reliquis febris acutis primo in eo, quod alvi fluxus ipsam plerumque comitetur, sed inno-
rentia a
ceteris.
rius, inmo potius salutaris, & quem reprimere periculosum est; deinde quod non tam medicamentis temperantibus ac diaphoreticis, quibus fere omnes reliquæ acutæ curantur, multo minus sudoriferis aut alexipharmacis calidis vinci queat, verum his exacerbetur, & egri perdantur; sed potius alvum blande ducentibus, vel & vomitum leniter moventibus, optime profligetur. Adeoque falluntur ii, qui omnes acutas diaphoreticis potissimum aut sudoriferis curandas esse existimant aut nocent.

I I I.

Priscis quidem Medicis hoc februm genus haud ignotum fuit: nam manifesta ejus vestigia jam apud Hippocratem & subsequentes Græcos, inmo & apud Celsum reperiuntur. Deinde etiam ex recentioribus Duretus, Forestus, Sennertus, Riverius, Sydenhamus, Ettmullerus, Baglivius, Medici Ratislavienses, Stablius, Hoffmannus ac Lancisius, ut alios nunc taceam, illud viderunt, & quidam brevius, quidam prolixius descripserunt.

A quibus observatum.

I V.

A plerisque hæc febres ad malignas relatæ sunt, quia ad ma-
nusitata quædam ac gravia, vel mox in principio symptomata ipsas comitabantur, vel per curationem consue-
lignas
relatæ.
tam

tam diaphoreticam & potissimum sudoriferam eas infequebantur, qua plerisque ægris præcordiorum angustia, anxietates, dolores circa ventriculi regionem, virium prostratio, deliria, exanthemata varia, & præsertim petechia, aut purpura inducta; & in ipsum tandem mortis periculum ii sæpe coniecti sunt.

V.

Earum
caussa
& sedes
in pri-
mis viis.

Febres autem hæ in primis viis, hoc est, in ventriculo & intestinis potissimum, sedem suam, ob phænomena §. 2. relata, habere videntur; vel si forte sedes aut caussa quarundam earum in his, sicut tamen verisimile est, non sit, tamen materia sive caussa ipsarum, quæ in putrida colluvie consistit, per has vias optime, experientia teste, evacuatur; adeoque vel non in sanguine ea hæret, ut plerarumque acutarum aliarum caussa, vel saltem per illas vias longe felicius, quam per cutem aut sudorem, vel etiam sanguinis missionem, natura sæpe viam monstrante, eliminatur, utque sic illa viscera a saburra vitiosa, putrida vel maligna, has febres inducente, brevissima ratione liberantur, sicut hoc etiam in febribus dysentericis & dysenteria ipsa optime fieri solet.

V I.

De no-
minibus
earum.

Nonnulli has febres *mesentericas* appellarunt, ut Baglivius (a) & speciatim Burchardus (b) Med. Rostochiensis quondam celeb. sed nuper magna rei medicæ jactura defunctus; quia vel in mesenterio, vel circa illud sedem suam ipsas habere existimarunt. Sydenhamus, summus ille Medicus, similes quoque febres descripsit in tractatulo de *Novæ febris ingressu*: attamen quia idoneum aliud nomen proprium ignorasse videtur, generali nomine *novæ febris* contentus fuit, & sub hoc eas satis bene descripsit.

Mihi vero, quia raro forte in mesenterio earum caussa, att sedes est, dum difficile concipitur, quo in me-

(a) In Praxi Medica Lib. I. itemque Lib. de Fibra motrice Cap. XIII. & in Ep. II. oper. ejus annexa ad Andryum, mihi pag. 701. (b) In Dissert. de Febris mesentericis supra jam laudata.

mesenterii loco illa hærrere, aut etiam ex eo ope pur-
antium expelli possit, adeoque nomen *febris mesente-*
ricæ falsam ideam lectoribus & præsertim tyronibus con-
stat, de meliori nomine cogitandum esse existimo;
que donec forte aptius inveniatur, rectius eas *stoma-*
gicas vel *intestinales acutas*, a sede, quam revera ha-
bent (a), vocari posse censeo; ita ut ad hoc genus
omnes fere illæ febres acutæ, quæ fluxu alvi stipatæ
sunt, commodè referri queant; quæ tamen deinde rur-
sus varia nomina specialia a variis ipsas concomitanti-
bus malis recipere, iisque in suas species distingui pot-
unt. Absonum itaque videtur, omnes acutas una ea-
demque ratione, ut recentiores plurimi voluerunt, dia-
phoreticis vel sudoriferis, vel etiam venæ sectione, sa-
tis velle; cum natura in his alias vias demonstrat,
usus alios quoque & quidem jam indicatos curandi
modos comprobet, immo illis multum præferat.

V I I.

Manifeste igitur ad hoc genus pertinent *dysentericæ*
petechiales sive *petechizantes* (b), aliæve congeneres,
malignas vulgo referri solitæ; præterea febres non-
nullæ *catarrhales* dictæ, itemque *continuae quotidianæ* &
iam maxime *tertianæ*, ut & *febris semitertiana* sive
mitritæus, quo nomine a veteribus eæ intelligi solent,
si ægri vel quotidie, vel tertio quovis die, novani-
tationem sive horrorem ac postea calorem experiun-
tur magis intensum, & ubi sæpe, quando corpus in le-
thum commovent, horrore quodam afficiuntur, unde & op-
eribus, id est *horrificæ*, veteribus dictæ sunt, atque
mitritæus & *hemitritæus* HIPPOCRATI synonyma sunt
(c), quas veteres rursus pro symptomatum varietate
plures alias, ut *Typhodem*, *Assodem*, *Elodem*, *E-*
pia-

*Species
hujus
generis
sive va-
rietates
ejus &
signa.*

(a) Ita enim Baglivius quoque sentit, quando ait
c. febres omnes gravioribus symptomatibus stipatæ vel
viscerum inflammationibus pendent, vel a pravis con-
ditis in primis viis.

(b) Conf. si placet, Stahl. Opusc. Physico-Chymic.
ed. p. 660. & seq.

(c) Teste Burchard. Diss. laud. p. 4.

pialam & Lipyriam subdiviserunt: quæ vero *essentia* omnes conveniunt, sed symptomatibus tantum nonnullis differunt, sic, ut nimis subtilis illa divisio entium præter necessitatem fere sit multiplicatio, atque tyronibus minus utilis. *Hemitritæi* igitur quæ & *tritophyæ* veteribus dictæ, proprie sunt febres, quæ tertio quovis die horrore exacerbantur, immo & alias subinde, ut jam dictum est, leviozem horrorem ægris concitant, ita ut horroris illa frequens perceptio signum pathognomonicum *hemitritæi* constituat (a): quare hi ægri corpus semper probe contactum amant; unde vero ii, qui ad sudores proclives, facile in sudores, nihil proficientes, sed potius noxios incidunt; id quod jam HIPPOCRATES notavit (b), dum dicit: *in phricode, qui sæpe & multum sudore diffluunt, miserandi*. Nam mali hujus causa non hæret in sanguine, sed in ventriculo & intestinis, atque sic non per sudorem, (quia noxius in eo observatur,) sed per alvum, aut os quandoque tanquam vias proximas, quas natura hic sæpe indicat e corpore eliminari desiderat. Atque hæc febres largi ejusmodi sudoribus præditæ, elodes veteribus dictæ, & valde periculosæ ab ipsis merito habitæ sunt. Dum vero regimine sive diaphoretico sive sudorifero materia noxia ex intestinis in sanguinem propellitur, sed ad transpirationem inepta est, in cute hærens maculas sæpe rubras, vel lividas concitat, sic inde fiunt petechiæ, quæ statum tunc, tanquam novam febris mali moris speciem considerarunt; aut malignæ aliæ inde concitantur immo ipsæ pestilenciales; vel materia vitiosa in nobiliores partes ope bezoardicorum pessima metastasi transferatur, ut Sydenhamus & Baglivius etiam jam notarunt, atque inflammationes in eis producit, sic ut, si ad cerebrum transferatur, deliria aut phrenitidem; ad pulmones, peripneumoniam vel pleuritidem; in aliis partibus alias

(a) Hujus horroris seu frigoris frequentem perceptionem a vitiosis humoribus in primis viis hærentibus ea que vellicantibus oriri cum Burchard. in citata modo Dissert. p. 5. haud sine ratione existimo.

(b) Vid. Duretus in Coacis prænot. p. 9.

ias producat, quibus ægri, orta gangræna, vel brevi
 regulantur, vel suppuratione facta, lenta tabe confi-
 untur. Quando autem hæc primarum viarum mate-
 ria vitiosa non adeo mali moris est, & vel ad *nares*,
lucos aut *pulmones* transfertur, leviores inde prove-
 unt morbi, quos *defluxiones* sive *catarrhos* vulgo ap-
 ellant; vel febre juncta, *febres catarrhales*, materia-
 re illa per hæc loca evacuatur; aut quoniam hæc de-
 fluxiones *hemitriteum* haud raro concomitantur, eam
febris catarrhalis nomine salutabant, & quidem vel *be-*
gnæ vel *malignæ* pro magis vel minus gravibus, quos
 corpore ægri edunt, effectibus.

V I I I.

Tritophyæ vero *febres* proprie dictæ sunt, quæ qui-
 m quoque *tertio* sive impari die suas per horrores ha-
 nt *exacerbationes*; verum minus certas, sed erraticas
 majore calore ægros affligunt, atque ad *ardentes si-*
causodeas magis accedunt; ideoque gradu fere tan-
 m ab ardentibus diversæ: hinc a recentioribus hæ
 æ sub eodem vocabulo *febris cholericæ* sive *biliosæ*
 mprehendi solent, a quibus, etiam haud raro *febres*
tridæ, ob fœtorem conjunctum, dictæ fuerunt: at-
 e hæc omnes, quod caput fere rei est, *sæpe alvi flu-*
m habent comitem, & in primis viis ut plurimum se-
 m obtinere videntur. Frequens præterea & *molestum*
 lde symptoma est horum morborum, *anxietas circa*
recordia, interdum sine, interdum cum *cardialgia*,
 o in statu *Affodes* a veteribus dicta est, unde tene-
 res subinde *syncope* corripuntur, a quo symptomate
 res *syncopales* etiam dictæ sunt, adeoque ob vehe-
 entia hæc mala *malignis annumeratæ*. Haud raro his
 ribus stomachicis atque intestinalibus *dolores hypo-*
ondriorum perquam graves ac molesti superveniunt,
 i, præsertim si *tussis* accedit, *pleuritidem* sæpe men-
 untur, & quidem ob cætera gravia mala simul jun-
 a, *malignam*; ita ut minus cautis minusve exercita-
 ejusmodi febris pro pleuritide habeatur, atque pro
 , sed malo cum successu, tractetur.

I X.

Verum omnia hæc symptomata a constrictionibus spas-
 modicis, tam ventriculi, quam intestinorum, cum te-
 nuum,

*Aliæ
 adhuc
 differen-
 tiæ &
 signa.*

*Causæ
 harum
 varia-
 tionum.*

nuium, tum crassorum ab acri in iis contenta putrida materia irritatorum, quæ ad has admodum proclives sunt, oriuntur; quibus ipsis veto simul *respirationis organa*, ob nervorum nexum, *in consensum*, sicuti alias in spasmodis hypochondriacis & hysteriis fieri solet, rapiuntur; id quod non solum magna pituitæ tenacis ac foetidæ copia, quæ vel clysteribus vel lenibus evacuantibus; sed maxime, quæ sponte natura, magna sæpe copia, cum fructu & haud raro integra morbi solutione expellitur, docet, sicut HIPPOCRATES id satis manifeste jam notavit, quando ait: (a) *quibus in febre dolore lateris oboriente, alvus multa aquosa & biliosa egerit; hi allevantur.*

X.

Omnes hæ Febres in fundamento conveniunt. Quoniam igitur hæ febres omnes re ipsa convenire & ejusdem fere naturæ esse, atque non nisi certis symptomatibus variare, mihi variisque aliis, ex supra laudatis Scriptoribus videntur, omnes commode unico *februm stomachalium & intestinalium acutarum* nomine comprehendi possunt, nec opus hic esse existimo, ut jam dixi, entia ac nomina præter necessitatem multiplicare, iisque tyrones confundere, & frequentem errandi occasionem præbere; nomine, ex mea sententia satis apto (saltem longè, ut opinor, *aptiori, quam mesentericarum* aut ceterorum omnium nominum hætenus prolatorum), ita enim juniores in his morbis & cognoscendis & curandis minus errabunt: quia sic certius meliusque scient, ubi eorum sedes, quænam sit causa, & denique quid in eis sit agendum: *cum eadem omnium, paucissimis pro ægrorum forte diversitate mutatis, sit & indicatio & curandi ratio.*

XI.

Et per evacuatia curari desiderant. Observatio enim nonnullorum supra laudatorum Medicorum præstantissimorum docuit, *earum naturam ita constitutam esse, ut causa sive materia morbi per alvum ut plurimum educi desideret, & sponte sæpius a natura, licet nullo certo die, dum dies certi critici hinc non dantur, etiam per hanc viam expellatur; minime per*

(a) Vid. Coacas prædict. T. I. p. 527. edit. Lind.

per transpirationem, ut aliæ pleræque acutæ, multo minus per sudorem; quippe quia his, ipso etiam STAH-
LIO teste (a), semper in deteriore statum conjunguntur, adeoque probe ab illis distinguendæ, quæ vel per sudorem vel hæmorrhagiam critice solvuntur: quod vero, quia paullo difficilius a junioribus Medicis judicatur, operæ pretium erit signa hic suppeditare, eaque certis, quibus hæc febres, quæ evacuationes per alvum postulant, a ceteris dignoscere queant.

X I I.

Sunt itaque omnes hæc febres tales; 1. ut ægri eis Earum
trepti per vices horreant, sed incertis temporibus; diagno-
dentes, lingua & fauces viscida & spurca pituita; sis & 1.
speciatim lingua squalore sæpe luteo, fusco vel ni- leviore.
icante, ipsis obsitæ sint, ita ut adstantes plerumque
oris, ægri vero ipsi adversum saporem gustu in-
percipiant; 3. alvi fluxus ut plurimum adest, & ex-
crementa, quæ per anum ejiciuntur foetorem sæpe pesti-
fam spirent; (b) 4. hypochondria tensa sunt & sæpe
valde dolent, (sine dubio a copiosis & turgentibus
humoribus noxiis, in ventriculo & intestinis con-
statis;) 5. pavores frequentes in somno incidunt, ut
propter eos dormire aut quiescere nequeant, qui sen-
tioribus etiam vigilando haud raro sunt molestissimi,
ita ut ex levissima sæpe causa concutiantur & ve-
ementer expavescant: atque hos pavores in febribus
cunctis quibuscumque haud sine ratione pro certissimo in-
dicio habet BURCHARDUS mineram febris in in-
finis hære; quæ etiam ratio esse videtur, quare
opphyas febres HIPPOCRATES terrificas dixerit, at-
tuali plerumque præsagii habuerit; (c) 6. dolores
que plerumque adsunt capitis & cervicis, a spas-
mo, ut videtur, oriundi; 7. urina initio morbi ut plu-
rum naturali similis (forte quia causa morbi tunc
dum est in sanguine,) in progressu turbida fit ac
limbo.

(a) Libro & loco supra jam citatis. (b) Quæ o-
mnia etiam Baglivius jam bene notavit in Prax. Med.
Vid. Duret, Comment. in Coacas prænot. p. 20.
Aph. 67, Sect. IV.

limosum sedimentum deponit, quod sæpius usque ad finem ita durare solet.

X I I I.

2. *Graviorum* Atque ex his signis primarum viarum febres acutas satis cognosci posse existimo. *Ad sunt quidem sæpe adhuc alia, quæ vero non tam febres hæc, quam potius lignarum gravem & periculosum earum statum, si adsunt, indicum pro- care solent; qualia 1. sunt, summæ præcordiorum anxietates; 2. dolor ventriculi aut lateris unius circa hypochondria acutissimus, pleuritidem mentiens; 3. vires valde prostratæ & lypothimiæ; 4. ardor interne, sed externe frigus; 5. motus manuum tremulus, subsultus tendinum, mens vacillans, singultus, floccorum collectio & sudor frigidus; quæ ultima simul materiam morbi malignam atque summum vitæ periculum indicant, atque simul ex his indiciis peti potest præsagium.*

X I V.

Symptomata minus consuetata. Sunt & quædam symptomata hisce febribus familiaria, quæ vero proprie non ex natura earum, sed potius & plerumque, sicut in aliis multis, ex malo ipsarum regimine, ac præsertim nimis calido, vel sudorifero dum scilicet eo ipso, ut supra jam dictum est, materia vitiosa ex intestinis ad sanguinem ac partes nobiliores propellitur, sed exhalare forte e sanguine in cute ob spissitudinem vel aliam rationem nescia, hinc inde in ea hæret, & maculas aut papulas rubicundas aut lividas producit, quo casu tunc febris petechialis vel purpurata dici consuevit; vel si ad aures internas deponitur, surditatem sæpe producit; vel circa glandulas parotides vel maxillares, atque ibidem tumores, inflammationes, & abscessus pessimos concitat; si ad cerebrium transfertur, deliria & phrenitidem: atque sic prout in partem corporis magis vel minus nobilem impellitur, diversa necessario mala ac pericula, ut pleuritidem, peripneumoniam, hepatis, lienis, ventriculi, intestinorum, &c. inflammationem producit; quæ diversissimam causam & morbum diversum indicare videntur licet revera unus idemque sit morbus, & una eademque causa, atque vix nisi loco affecto malisque accidentibus inde oriundis differat.

X V.

Quare si hisce in malis alvi fluxus supervenit, isque Diar-
 ter medicamenta cohibetur, ægri in pejus ruunt (a), rhæan
 quia materia noxia excernenda retinetur; sed si sibi sistere
 relinquitur, dum causa primaria in intestinis hærens pericu-
 e corpore expellitur, morbum plerumque minuit, losum.
 ut omnino solvit, quemadmodum HIPPOCRATES
 generatim de febre lateris cum dolore combinata, sicut
 paullo supra indicavi & speciatim de surditate & pano-
 dibus. (b) Gerard. Columba de feb. pestilent. aliique
 pra N. III. laudatis præstantissimis Medicis de pete-
 chialibus, mesentericis, epidemicis, catarrhalibus, horri-
 s, aliisque testantur.

X V I.

Cum autem maligna ac vitiosa harum febrium, ut Evacua-
 multa phænomena, (excrementa v. gr. saliva, sudor, tio pri-
 etida & subinde cadaverosa) suadent, materia non marum
 in halitiosa quadam, ut Stablius existimavit (c), viar.ne-
 bstantia tantum, sed sæpe in putrida quadam pravo- cessaria.
 m humorum colluvie consistere videatur, in ventri-
 to aut intestinis, vel in ambobus simul collecta, at-
 te attenta observatio & usus docuerint, eam correctio-
 m; (saltem per hætenus nota atque usitata reme-
 a) sæpius non admittere, sed evacuationem potius
 alvum desiderare, quemadmodum etiam hoc in fe-
 bus a vermibus oriundis, qui quoque ut plurimum in
 multa putrida pituita nidulantur, & alii & ego fre-
 quenter observavimus, quæ febres revera sæpe valde ve-
 mentes & periculosæ sive malignæ sunt, hinc nisi il-
 materia vitiosa a natura sponte ejiciatur, sicut id for-
 sæpius ob tenacitatem fieri nequit, præsertim in il-
 , ubi calor non est adeo vehemens; sed potius hor-
 res frequentes incidunt, arte a Medico, naturæ tunc
 agistro, (cujus prudentia & directio hic plus valet
 am natura) sed non violenta, verum blanda ratione
 I eva-

(a) Teste experientia & ipso Stablio Opusc. Chym.
 ed. p. 612. & seq. (b) Aphor. 28. Lib. IV. & Epi-
 n. Lib. I. (c) In Opusc. Chym. Med. ubi Histor. Fe-
 s epidem. Petechizant. exponit. p. 636.

evacuari debet. (a) Doctissime hac de re etiam dis-
ferit celeb. Lancisius, quando ait: *In febris novis*,
præsertim malignis, castrensibus, petechizantibus, &c.
Medicus diligenter naturæ motus observare debet, & qui-
dem sic, ut salutaribus faveat, noxiis obstat, ægrum-
que translatione saltem in chronicum morbum, (quod
est hac in re, ut admodum frequens, ita summopere
utile) ad salutis portum utcumque perducatur. Exinde
fit, ut in hujusmodi febris raro purgantia, nisi ab ini-
tio, & quidem cum absente diarrhœa, quotidie remi-
serint, aut alternis diebus rigore, aut saltem frigore
exacerbentur, juvare solent: tunc enim non levis mate-
riæ febrilis portio circa hypochondria aut primas vias hæ-
rere solet, quæ vel emeticis, vel purgantibus evellitur.
Vid. doct. Lancisii Epistola, in Cochii Epistolis Med.
p. 23. de Febris castrensibus, contenta.

X V I I.

Alii alio modo cu- rationē institue- runt. Modus vero evacuandi materiam corruptam in febris acutis e corpore varius hætenus fuit apud Medicos, & quidem plerique hoc per sudorifera, vel saltem diaphoretica, præstare voluerunt. Verum usus docuit, rem hac ratione, si in ventriculo vel intestinis materia noxia hæret, haud feliciter succedere; sed potius eo ipso eam in sanguinem promotam, petechias, aphthas, phrenitidem, anginas, inflammationes, & abscessus periculosos, vel omnino gangrænam, sphacelum partium internarum, ac mortem inductam esse: unde HIPPOCRATES jam miserandos illos dixit, qui in phricode multum sudant: quia hi ægri his solum debilitantur causa tamen per ea ex ventriculo & intestinis haud aufertur.

X V I I I.

Optime Rectius vero, & per viam longe breviorē hoc fit per pri- per os vel per alvum, natura hic sæpe viam mon- mas vias strante, atque usu quoque hanc curandi rationem con- evacua- firmante.

tia cu- rantur. Testes habemus egregios Medicos jam supra N. 3. laudatos, & ex parte etiam Stahlum (b), qui tamen
ulti-

(a) Libro modo citato p. 639. seq. 647.

(b) Opusc. Chym. jam sæpius citatis.

tinuus; licet observaverit; *diarrhæam* agris hujusmo-
 febribus laborantibus non nocuisse; itemque ægros ta-
 s longe melius se habuisse; quibus alvus fluxerit,
 am quibus obstructa fuit; immo empirici cujusdam
medium alvum ducens indicet; quo quamplurimi febril-
 s *petechizantibus*; prout ipse eas appellat; sive quo-
 dianis continuis; *castrënsibus* aut *epidemicis*; *acutis*; de-
 mibentes optime curati fuerint; tamen; quantum ex
 as scripto videre est; ipse lenia evacuantia; licet na-
 ra viam per alvum demonstraverit; isque naturæ du-
 am sequi alias ubique fere docuerit; iis porrigere au-
 non est; attamen circa finem illius scripti p. 687.
 ondet; se brevi aliquid editurum esse; quod *emetico-*
rum & cathartico- eis in morbis usum uberius sit
 positurum; quod vero an factum sit; dubito; quia
 ad videre haud memini. Interea tamen & antea lau-
 ti Medici; & nonnulli alii postea; ductum naturæ
 sequentes; *felicem evacuantium*; & cum primis *le-*
tem emeticorum & cathartico- usum; ejusmodi in
 orbis tentarunt; eumque longe saluberrimum depre-
 nderunt; inter quos præter nominatos etiam est CA-
 OLUS (a); aliquæ forte plures: cum primis vero
 RICHARDUS in Dissert. sua jam aliquoties lauda-
 de *Febribus mesentericis acutis*; hanc curandi viam
 phoreticæ & sudoriferæ haud sine ratione quam lon-
 gime prætulit; & nuperrime etiam adhuc DEGNE-
 US in libro de *Dysenteria Biliosa*; in *Febribus Dy-*
tericis. Quamvis autem fluxus alvi sponte iis super-
 iens *febres has intestinales* sæpe solvat; rectissime ta-
 m Burchardus; eum in omnibus ægrotis sponte non ori-
 naturamque ad noxiam materiem expellendam sæ-
 s haud satis validam esse monet; aut nimis quando-
 a vitiosa putrida materia irritatam; plus; quam
 est; expellere; atque sic agris vires nimis exhauri-
 eosque hoc ipso sæpe perdere. Itaque *hisce in mor-*
plus valere Medici prudentiam; quam naturam; sci-
 t ut languentem; quæ hic quod facere debet; non
 I 2 fa-

a) Sive Carl. Medicus Practicus egregius, & Da-
 Regis Archiater; in scriptis suis practicis.

facit, blandis emeticis, vel alvum moventibus remediis excitet, & e contrario nimis violenter expellentem ægrumque debilitantem, prudenter moderetur, sicut id ex viribus ægri & pulsu dijudicare debet.

X I X.

Quibus remediis evacuatio instituenda. Duretus antiquo medicamento purgante, *hiera picra* dicto, per aliquot dies in ejusmodi casibus *felici cum successu* usus est (a), cujus primarium ingrediens est *aloe*, quod & *Baglivius* hic valde commendat: ideoque & *alia aloetica* blanda remedia, ut pilulæ *Francosurtenſes*, *Immanuelis*, vel *Becherianæ*, hisve similes, vel alia idonea aloetica compositio hic adhiberi poterunt. Alii decocto vel *rhabarbari*, cum aut sine *manna*, utuntur; vel horum loco apte quoque *Tinctura* sive *Anima rhabarbari*, ad morem *Degneri*, ad cochleare j. vel ij. per intervalla, dari apte potest; infantibus vero gutt. 20. ad 50. *BURCHARDUS* *ſal anglicanum purgans* hic laudat, ejusque ℥j. puerperæ cuidam optimo cum successu exhibuit, quo fedecim secuti sunt sedes, cum perfecta febris ejusmodi intestinalis solutione, adeoque & aliis cum fructu dari potest. Alii ægro *mannam cum cremore tartari & nitro* feliciter dedit. Ego sæpius potiuncula ex leni decocto *tamarindorum & foliis sennæ cum manna*, feliciter usus sum, vel *& anima rhabarbari*, vel etiam pulveris *rhabarbari ℥ss. cum nitri ℥ss.* vel in mulieribus, ubi forte menses instant, pilulis etiam *Becherianis*: hisque & similibus evacuantibus *dolores ventriculi & hypochondriorum*, itemque *præcordiorum angustia* egregie hic tolluntur. Cum itaque *evacuantiæ* ejusmodi lenia egregie hic profint, *sudorifera autem, & quæcumque corrigentia alia* hætenus tentata, *noxiam hanc materiam* in primis viis non destruant, haud male *BAGLIVIVS* indignabundus quasi in eos, qui febres tales solis alterantibus curare volunt, invehitur Medicos, dicendo: *Quantum exardeo, cum video Medicos ad corrigendam & dulcificandam solum materiam occupatos; sed de humore peccante foris eliminando non cogitare.*

XX.

(a) Vid. ejus Commentar. in Coacas prædict. p. 27.

X X.

Verum præter hæc lenia evacuantia, in eundem scopum simul quoque *lubricantia* varia apte adhiberi atque illis interponi ac subjungi possunt: ut scilicet sunt *potus feri lactis*, decoct. C. C. cum pomo citri paratum, decocta ex hordeo cum pomo citri & saccharo, vel ex uena cum passulis confecta; decocta prunorum dulcium aut pomorum fragrantium saccharo grata reddita; emuliones ex amygdalis & pineis, aut semin. 4. frigid. si scientia sunt, quæ omnia etiam roborandi vi pollent; nmo & oleum amygdal. dulc. quoque in iis, qui oleo non averfantur, haud inepte ad acrimoniam in priis viis corrigendam & vias lubricandas subinde interponitur. Infusi herbæ Theæ & decocti Coffeæ potus tepidus, vel quod HIPPOCRATES jam commendavit, *ordei tost.*, ad modum Coffeæ paratum (quod eundem fere saporem & virtutem habet) itemque *potiunculae* diluentes ex aquis temperatis, & syrupo paratæ, quæ acidulæ redditæ, ad corrigendam materiam acrem, atridam, alcalicam commode etiam porriguntur. Pulveres ex absorbentibus terreis, cum nitro & cinnabari quoque cum fructu inter cetera iis quandoque dari possunt, si pulveres non averfantur; verum non ob scopum diaoreticum, & sine regimine sudorifero, sed tantum ad bibendam & temperandam materiam vitiatam acrem, motus spasmodicos ac dolores hoc ipso mitigandos.

X X I.

Quod si laudata lenia evacuantia & lubricantia ad Clysteres mores noxios extrudendos forte non sufficiant, atque per de magnis præcordiorum angustiis, doloribus ventriculi & hypochondriorum conqueratur, clysteres quoque mul lubricantes & demulcentes, qualia sunt decoct. enæ cum oleo olivar. vel lini, vel decoct. fl. chamem. in lacte, cum oleo, melle aut saccharo, quod regium simul est antispasmodicum & anodynum, in am adhuc sunt vocandi, ut iis non solum exitus corporum promoveatur, verum etiam acris materia imperetur, ac spastici motus in intestinis & ventriculo mulceantur: quibus hisce in malis sæpe multum boni incitur. Si qui vero penitus a clysteribus abhorrent, sal anglicanum, sicut N. XIX. dictum est, apte dari

potest, quod raro spem nostram destituet, quodque eo magis laudandum est, quia æstus febrilem simul temperat, & intra breve tempus plerumque alvum solvit, ægroque sic cito solatium præbet. Clysteres tamen omnium promptissimum & innoxium maxime remedium constituunt, semel, bis, terve in die reiterandi, quoties gravia mala & cumprimis anxietates aut dolores hypochondriorum id urgeant. Verum non sint nimis acres, sed ut dictum, emollientes potissimum ac demulcentes.

XXII.

Quando materia morbi caput petit. Quando impetus humorum vitiosorum versus caput ferri videtur, id quod ex capitis dolore, rubore faciei, mentisque alienatione, &c. intelligitur, pedes calidis fovendi, superiores vero partes frigidiores & parum tectæ servandæ sunt, atque ab omnibus calefacientibus ac sudoriferis abstinendum. Riverius tunc quoque industria sæpe mutare jubet; (a) quod vero vix suaderem. Vesicatoria præterea suris, & rubefacientia, ut fermentum cum sale & sinapi contuso, atque aceto plantis pedum calide imponantur, ut sic vehementius a capite revellant. Quem in scopum etiam, præsertim quia vesicatoria tardius agunt, clysmatibus quoque ex decoct. prunor. cum foliis fennæ, nitro imprægnatis revulsio a capite procurari debet, eaque ratione sæpe quidam, qui jam desperati videntur, præter spem adhuc restituuntur.

XXIII.

Quid in singultu facientium. Eadem fere ratione est procedendum, si singultus incidat; aut si his non cedat, sal anglicanum Epsamen est propinandum, vel sicut Duretus & Baglivius sæpius cum successu fecerunt, Hiera picra. Potus Coffeæ etiam in singultu sanando singulari pollet virtute, eumque hic jam pro secreto commendavit BAGLIVIVS. Quando singultus ab inflammatione ventriculi, camphoræ gr. ij. vel tria pulveribus antispasmodicis misceri, & Spirit. V. camphor. ventriculo extus imponi, cum fructu potest.

XXIV.

X X I V.

Sanguinis missio, quam SYDENHAMUS fere pro- *Quid de*
iscue in febribus commendat, apud nos raro & non- *V.S. sen-*
si in valde plethoricis, aut qui vini copiosioris potui *tiendi*
editi sunt, prodest, & quidem tantum in principio :
 quando vero rationes eam instituendi adsunt, prius clyf-
mate leni alvus evacuetur, & si ab hoc dolores hypo-
condriorum & præcordiorum anxietates mitigantur, ab
 illa abstineri potest; quando autem illa mala redeunt,
clysmata quoque, quoties id accidit, *iterandum (a)*.
 Sed si ab adhibito clysmate non mitigantur, ad averten-
 dam inflammationem mox in principio sanguis e venis
evacatur. Si enim hoc demum tertio aut quarto die fit
 erumque magis nocet, quam prodest.

X X V.

Quando natura ipsa in his febribus alvi fluxum facit, *Quid*
 nec & ab evacuantibus internis & clysteribus abstinere *facien-*
 tum, atque solis fere aqueis tepidis, diluentibus ac lu- *dum ubi*
 cantibus supra indicatis, ac potionibus satis largiter *diar-*
 rhuicis, ea juvanda est. His terrea, nitro adjecto, in- *rhœa*.
 terponenda, ad acrimoniam noxiorum humorum imbi-
 ndam & infringendam, atque inflammationes simul
 ecavendas. Interea tamen Tincturæ rhabarbari quan-
 que etiam cum fructu cochleare j. interponitur.

X X V I.

Quod si vero natura fluxus alvi nimis vehementes & *Si alvi*
 aliquatim concitat, ita ut vires ægri valde proster- *fluxus*
 ntur, extrema frigida reddantur, aliaque prava sym- *nimius.*
 mata inde subsequantur, ægro diascordii ℥j. ex aqua
 amomi sine vino vel cydoniatæ ℥i℥. exhibenda,
 od vires non solum roborat & fluxum moderatur,
 & simul blandum somnum conciliat. Sed si alvus
 e nondum conquiescat, iterata vice post aliquod tem-
 exhibitum raro spem Medici destituet, quemad-
 dum præter nostram experientiam, & SYDENHAM
 BURCHARDUS. p. 29. sancte etiam id confir-
 nt.

a) Hoc notabili exemplo illustrat & comprobat laud.
 richard. in Diff. cit. p. 26.

X X V I I.

Ubi anxietates & ventriculi dolores. In *anxietatibus præcordiorum & doloribus ventriculi* atque *hypochondriorum* evacuantiâ, præsertim *rhabarbarina* §. XIX. laudata dari, atque *Clysteres* leniter evacuantes §. XXI. sæpius injici debent: ut sic *materia noxia* a superioribus evocetur & per inferiora educatur.

X X V I I I.

Viæ ratio. *Viæ ratio* in his febribus, quia non sunt summe acutæ, non sit nimis tenuis, præsertim postquam jam aliquot dies præterierunt. Nam quia ad secundam, tertiam, quartam aut quintam etiam hebdomadem sæpius extenduntur & nonnumquam in *lentas tabificas terminantur*, in tempore *sufficienter cibis idoneis levibus sunt reficiendi*, præsertim si cibi fastidium abest, ut ad finem usque morbi perdurare possint. Interea tamen in principio multum cibi non requirunt, sed fracto aliqua ratione impetu, quando scilicet cibos non amplius averfantur; nam *invitis cibus non est obtrudendus*; at tamen tunc, quando fastidium præteriit, offerendus isque non sit adstringens aut difficilis digestionis, sed levis atque mollis. Et quamprimum solida etiam alimenta rursus appetunt & assumunt, in pastu quoque *haustulus vini generosi ipsis non est denegandus*; sed potius pro digestionem juvanda ægrisque rursus roborandis commendandus.

X X I X.

Alius curandi modus per emeticam. Superest denique ut & *aliud adhuc modum humores noxios & malignos ejusmodi in febribus & imprimis in petechialibus & congeneribus evacuandi*, adhuc proponamus, quem haud pridem doctissimus D. WAGNERUS, Helmstadiensis, discipulus quondam noster per multos annos diligentissimus, nunc amicus carissimus atque *Medicus Lubecensis celeberrimus*, quique ob usum Rad. scillæ in asthmaticis morbis, aliaque scripta egregia jam satis clarus est: qui *consistit in matura, ea que subinde repetita*, ubi opus est, *vomitibus excitatione*, & quidem non antimoniatibus, sed *radice hyepococanne*: quam methodum etiam ad malignas atque *exanthematicas alias*, cujuscunque generis, ne ipsa quidem *puerperarum & puerilis ætatis purpura* cum febris mali moris excepta, summo cum successu & quam frequen-

uentissime feliciter se adhibuisse, in litteris haud pri-
em ad me datis, asseverat, ita ut nulla alia hos mor-
os curandi via adhuc sit nota, quæ cum hac ipsa ra-
ione felicitis successus possit comparari; qui tamen mo-
us hucusque a multis contemptus, immo valde no-
ius proclamatus est.

X X X.

Meminit quidem *Riverium*, *Ettmullerum*, *Scretam*, *A qui-*
pinum, *Spiesiumque* nostrum, immo & *Stablium* in *bus jam*
assert. de febris petechiali & congeneribus, aliosque vo- *lauda-*
pitoria subinde commendasse; verum ea tam angustis li- *tus.*
nitibus inclusisse & tot cautionibus ac limitationibus
estrinxisse, ut vix Medici jam satis experti, multo
minus juniores aut tyrones certi inde esse potuerint,
ubi vel iis utendum, vel ubi ab iis abstinendum, præ-
sertim cum ea vitanda plerumque docuerint, ubi quam
maxime utilia ac salutaria hæc ipsa deprehenderit.

X X X I.

Ego quoque *emetica semper in febribus acutis usus* *Ego diu*
sum ab eo tempore, quo ut Medicus castra fœ- *jam e-*
eratorum in Belgio Anno 1707. & sequentibus secu- *metica*
us sum, eaque non solum & postea, ubi vomitum in- *adhibui.*
dicantia aderant signa, *etiam in ipsis puerperis* adhibui,
etque illa quoque adhibenda esse his in casibus in præ-
lectionibus meis practicis auditoribus meis semper sua-
vi. Interea tamen hoc in argumento ulterius progres-
sus est prælaudatus meus *Wagnerus*, qui summa jam
laude ac gloria per plures annos medicinam Lu-
becensis facit.

X X X I I.

Modus vero ejus malignas febres curandi primum, *Ubi ma-*
præsertim cum Lubecæ militum ultra centum fere si- *gis cul-*
cul febre & petechiali & petechizante correpti de- *tus est*
umberent, consistebat potissimum in *matura vomito-* *hic mo-*
hi sufficientis portione exhibenda, nec non interdum a- *modus.*
ud *plethoricos venæ sectionem* instituendo, administra-
o deinceps regimine antiphlogistico ac diapnoico
per pulveres absorbentes nitrosos & similia reme-
dia; qua ratione plerique ægri curati sunt; postea
vero his inductus exemplis alium eumque adhuc me-
iorem modum excogitavit, qui in sequentibus consistit.

Ni-

Nimirum sumpsit Rad. Hypecacoannæ pro ægrorum diversitate ℞. vel ℥ss. cum arcano duplicato probe trita, eique addidit aquæ cujusdam destillatæ, v. g. Card. bened. aut similis ℥iij. vel iv. Hujus mixturæ, quavis hora dimidia vel integra cochleare unum alterumve (interponendo subinde mixturam temperantem) donec effectus hypecacoannæ sequatur, exhibet; postea mixtura quadam temperante diapnoico diuretica continuat. Sed si posthac intra horas circiter XII mala graviora, ut vertigo, lipothymia & faucium mala, non valde remiserint, atque pulsus ac respiratio non sint liberiores, cum primis vero respiratio (utpote cujus difficultas merito in petechialibus & congeneribus pro pathognomico signo præcipuo mali moris jure habetur) prædictam potiunculam emeticam repetit, eamque toties pro re nata, exhibet, donec mox laudata indicia in melius conversum morbum demonstrent, neque prius ab usu hypecacoannæ, aliquot minimum grana mixturis morbo congruis addendo, abstinet, donec signa malignitatis (nam egregium simul est alexipharmacum) omnino sint sublata, & morbus mali moris in benignum conversus; id quod sæpe, si modo non nimis tarde Medicus advocatus fuerit, intra biduum obtineri solet. Immo si etiam quarto die & quandoque tardius advocatus fuerit, atque res jam quasi conclamata visa est, tamen hac curandi via quamplurimos, ut retulit, adhuc servavit, qui antea neque Stahlianæ, neque Hoffmannianæ methodo; (quæ optimæ tamen hodie habentur) summa licet cura adhibitis, servari potuerunt.

X X X I I I.

In exanthemata Atque sic quoque egit, sive pauca sive multa exanthemata adsuerint: quia conversio morbi maligni per hanc eodẽ methodum in benignum, caput rei est, ubi istiusmodi symptomata nos a recto hoc tramite abducere non debent. Interea tamen, pro re nata, interdum etiam Venæ sectionem; laxantia, clysmata & vesicatoria simul adhibet; quibus vero, si ab initio ista per hypecacoannam curandi ratio rite in usum vocatur, raro, ut asseverat, opus esset, atque sic hoc modo ab eo tempore fere omnes servavit.

Febres denique etiam *exanthematicas*, *purpuram*, *pe-*
chiales & congeneres *pro morbis mesentericis* sive *sto-*
machicis WAGNERUS noster habet, in quibus sanan- *Exan-*
themati-
cos mor-
bos me-
senteri-
cos esse.
 s, præsertim si graviores, frustra laborari existimat,
 si ipsarum causa in primis viis hærens atque veloci-
 ter sæpius sese per sanguinem & totum corpus exten-
 dens, mature auferatur, ac prædicta ratione e corpo-
 re eliminetur: id quod peculiari libro uberius expone-
 atque evincere fidem mihi dedit, quod, cum eru-
 tio, diligentia & vis judicandi ejus mihi bene sint
 perspecta, magnæ generis humani utilitati cessurum es-
 certus confido.

C A P U T V I.

De Febris lentis, & hecticis.

I.

Febres lentas continuas eas esse febres, quæ calore
 naturali majore & pulsu celeriore per plures heb- *Quid*
sint.
 domades, menses, immo annos perdurant, supra Cap.
 N. VI. diximus, atque græco vocabulo *chronicæ*,
 sæpius tamen quoque lentæ aut *hecticæ* appellantur;
 præsertim si labes visceris cujusdam, & cum primis ul-
 ceris aut scirrhus in pulmone, hepate, liene, mesente-
 ro aliove viscere simul adsunt.

I I.

Signa diagnostica ex definitione patent; quibus ad- *Diagno-*
sis.
 ic illud, præsertim in ita dictis hecticis accedit, quod
 gri aliquot horas post pastum prædicta symptomata
 nullo vehementius & nova quasi accessione sentiant,
 in rubore genarum, sanis sanguineis fere simili, cum
 ante pastum pallidi esse soleant; & corpus simul sen-
 tia contabescat, viresque valde minuantur.

I I I.

Causæ febrium lentarum & hæcticarum sunt variæ, *Causæ*
proximæ.
 in remotæ, quam proximæ. Hæ ut plurimum sunt i.
 obstructions quorundam viscerum, ut pulmonis, hepa-
 tis,

tis, lienis, pancreatis, glandularum, mesenterii, &c. vel 2. *abscessus* cum in partibus externis, tum internis; vel 3. *exulcerationes* quorundam viscerum aut partium, & imprimis pulmonum vel pleuræ, ut in phthisi & empyemate, vel in renibus, vesica, utero, &c. 4. *peculiaris acrimonia sanguinis* fervida, febriculam perpetuam lentam, & corpus depascentem efficiens.

I V.

Remotæ. *Causæ antecedentes & remotæ* sunt sæpius febres tam continuæ quam intermittentes, & cumprimis male curatæ, præsertim per adstringentia, materia morbi nondum satis digesta, correctæ, aut evacuata, quibus fit, ut humores viscosi, crassi, pituitosi, serosi hinc inde cogantur, quiescant, hæreant, atque sic *obstructiones* partium, præsertim nobiliorum, febrium harum causas præcipuas, unde cor, dum reliquus sanguis libere has partes transire nequit, ad frequentiores contractiones sive motus concitatur, producant. 2. In aliis eisque magis sanguineis stases hæ humorum sive sanguinis ad *abscessum* vergunt, dum in putredinem & pus fatiscunt, atque huius irritatione febriculas ejusmodi faciunt. 3. Quotiescumque *ulcera* sunt in visceribus, ex similibus fere causis, febres lentæ & hecticæ inducuntur. 4. Quando autem ab *acrimonia peculiari, fervida, irritante*, ac *depascente* proveniunt, hæc hominibus quandoque a parentibus aut nutricibus impuris, hecticisve connata est, quandoque tamen a *prava diæta*, potu, cumprimis vini, spiritus vini, aliorumque calidiorum potionum, aut ciborum, præsertim aromaticorum aut salforum largiori & frequentiori usu, ortum trahit, vel etiam a *nimia libidine* & excessu in venere, quo sanguis vehementius incalcescit, nimisque acris & fervidus redditur, quo febricula continua lenta excitatur, & corpus consumitur, cumprimis si illi homines simul, ut sæpe fit, prædictos errores in cibo & potione simul committunt, aut etiam medicamentis calefacientibus & venerem exstimulantibus abutuntur, aut forte etiam *iracundiæ* dediti sunt, quibus tanta acrimonia in corpore produci potest, ut hecticas sive lentas ejusmodi febres sæpius inducat, quas ultimas, (quando nimirum a venere nimia proveniunt) nonnullis ta-

in dorsalem appellare solent; quia in dorso sive lumbis simul dolores & insignem debilitatem sentiunt.

V.

Omnes febres lentæ & hecticæ non sunt sine periculo, Prognosis. præsertim si jam diu durarunt, corpus & vires ægri in nimis consumserunt, sudores colliquativos, alias jam gravia mala induxerunt; præ omnibus tamen magnum sovent periculum, quæ scirrhum vel ulcus quoddam grave in viscere quodam nobiliori, præsertim in pulmonibus, conjunctum habent. Si vero adhuc sunt recentes, aut alias adhuc levioribus malis cotatæ, si vires adhuc satis constantes, viscera satis facta & integra, vel saltem non nimium corrupta, de eorum curatione non est desperandum, si Medicus & æger simul bene suum faciunt officium. In hæmorrhoidis adstringentia, præsertim præmature adhibita, vitanda, aut si necessitas ea exigat, caute & cum potius copioso aquoso sunt exhibenda, alias facile hecticam producant. Juniores homines hecticæ febres citius gulant, quam seniores.

V I.

In curatione ad causas semper probe est respiciendum, & secundum has curatio prudenter est instituenda. Curatio si ab obstructione. Adeoque si congestiones sive obstructiones sunt in visceribus aut glandulis, (N. III.) hæc, quia a viscido oriuntur, diluentibus, incidentibus ac blandis diaphoreticis sunt digerendæ ac resolvendæ, ut infusis vegetabilium e radicibus vel herbis, vel utrisque simul, ut chinae, schorzonerae, cichorei, taraxaci; herb. tussilaginis, scabiosæ, veronicæ, pulmonariæ, chærophyllicæ &c. ad modum Theæ, bis terve in die ad viij. x. vel usurpatis, itemque, essentia quadam diaphoretica, majori, ut cort. aurant. scordii, helenii, card. bened. pimellæ, bis terve in die, ex vehiculo tali aqueo præsertim calido exhibita; vel & loco essentiarum, liquore terræ atæ tartari, qui egregie hic prodest, ex simili vehiculo, perpositis circa vesperam bis pulvere quodam temperante incidente, ex lap. cancror. vel conchis acido citri vel toto vini aut destillato probe imprægnatis, ac tartaro violato, quibus, ubi æstus major, aliquid nitri commode additur: & subiinde pilulæ balsamicæ amaræ apte inter-

interponuntur. Multis ex his etiam prudens usus *aquarum medicatarum* cum apto regimine egregie prodest, de quibus §. X. plura.

V I I.

Regimen.

His adjungenda *frequens corporis exercitatio*, & imprimis *equitatio*, *potus sufficiens tenuis*, *aquosus*: ut præter infusa illa e vegetabilibus digerentibus, radicibus vel herbis parata, aqua simplex vel ptisana apta, *viscus tenuis*, facilis digestionis, modice nutriens: ut omninis generis bona juscula, gelatinæ, emulsiones, fructus horæi cocti, pulres tenues, aliæve lacticia tenuia; vitando crassa, viscida, tenacia, difficulter digerenda, interponendo subinde roborandi causa *haustum vini* generosi, vel dulcis, præsertim si calor p. n. notabilis abest. Sed si calor p. n. & sitis vehemens adsunt, Tinctura flor. papaver. vel rosarum vel alia hujus generis, vel phlegma vitrioli potui commode instillari possunt.

V I I I.

Si post intermittentes febres.

Quod si obstructions hæ post febres intermittentes, & saburra viscida non rite evacuata & subacta sint ortæ, prædictis adhuc penetrantiora amara, resolventia atque blande evacuantia sunt subjungenda, aut interponenda, ut pilulæ ex extract. absinth. card. bened. centaur. min. gentianæ, gumm. ammoniac. galban. myrrha & aloe, vel Becherianæ, aliæve his similes, quarum gr. xv. vel xx. semel aut bis in die exhibendæ, quibus ipsis febris male suppressa sæpe revocatur, quæ postea digerentibus amaris, salinis aliisque idoneis febrifugis rite curanda, ac denique stomachicis, roborantibus sive tonicis, martialibus, immo ipsis aquis medicatis martialibus, legitime usurpatis, noxii humores reliqui sunt corrigendi & evacuandi, ac tonus viscerum restituendus.

Iisdem in casibus si principio indicia saburræ biliosa in primis viis adsint, egregie conducit lenis vomitus, vel saltem lenia purgantia; sed si plethora, aut consuetæ sanguinis excretiones suppressæ adsint, detractio sanguinis; si utrumque peccat, utraque etiam medela est adhibenda; venæ sectio tamen, si utroque opus, emetico est præmittenda.

I X.

Si *abscessus*, præsertim externi, in caussa sunt, standum, ut hi, simulac fieri potest, aperiuntur, purgantur & rursus glutinentur, alias remedia interna non proficiunt; interea tamen, donec abscessus aptus datur ad aperiendum, temperantia aliquod levamen te queunt. Sed si *exulcerationes viscerum* febrem lentam & hefticam continuant, tunc, ut ulcus pulmonis & phthisis, de qua infra, curari debent, & solum monemus, quod vomitoria & purgantia hic sint vitanda, aut lenissima saltem, si forte iis opus, extimatis, rhabarbaro, vel manna porrigenda.

X.

Sed si *acrimonia sanguinis in culpa*, hæc temperantia, diluenda, ac demulcenda, pulveribus illis temperantibus, supra N. VI. laudatis, & infusis aut decoctionibus vegetabilium, acrimonia carentium, §. VII. ad eam similitudinem, vel per se, vel pauculo lacte adjecto, itemque *emulsionibus*, gelatinis fero lactis, vel lacte butyrato, & quam maxime etiam aquis medicatis *evensibus*, cum vel sine lacte, & cum primis caprillo asinino temperatis, quibus plures, immo & ipsos annos sex, septem, octo, decem annorum ex Orci si faucibus eripui. (a) Nonnulli *curatione* sive *dieta lactea* curantur, quando nimirum per aliquot hebdomades non nisi lacte, pauculo saccharo adjecto, ventur, aut lacte, loco cibi & potus, utuntur, vel paul, si lubet, pauculo pane triticeo, vel pultibus ex orylo, oryza, vel amygdalis paratis. Huc etiam referri potest decantata *cura avenacea* Lorry, quando decoctum paratur ex avena, radice cichorei cum pauculo nitri, & quotidie certa copia cum apta diætâ bibitur, de qua uberius legi meretur Frid. Hoffmanni de *Cura avenacea*. Quandoque, imprimis si *alvus cructa*, aliave sunt indicantia, *lenia laxantia*, ut rhabarbarum, vel tamarindi, cum foliis sennæ & manna bibenda, atque *dieta* eadem servetur, quæ modo commendata est.

XI.

(a) Conf. Fr. Hoffmanni Dissert. de aquarum felleum usu cum lacte.

X I.

Quando caussa venerea. Quando febris hectica a nimia venere aut gonorrhoea ortum traxit, præter modo dicta, aut quando hæc parum sunt, aquæ felterenses cum lacte, vel ipsa cura lactea, quam vocant, purgatis prius primis viis, egregie profunt. Quando autem post salivationem male institutam orta sit, decocta radicum & lignorum antivenereorum cum Tinctura antimonii, ad reliquias venereas penitus extirpandas, egregie conveniunt: quibus vero aptissime lac admisceri potest, si ægri ab eo non abhorrent. His quoque parca mercurii dulcis dosis magno cum fructu subinde & potissimum vesperi interponitur. Quod si vero reliquæ illæ ablatae & extinctæ sunt, aquæ felterenses aliæve temperatiores cum lacte vel etiam ipsa lactea cura & dieta (N. X.) ad vires & carnes ægris restituendas quam maxime valent.

X I I.

Si a scabie repulsa.

Si a scabie retropulsa per unguenta quæcumque in tempestive adhibita, materia acris vitiosa per decocta radicum herbarum & lignorum diaphoreticorum, scabiei & morbis venereis alias dicatorum, una cum Eosentiis diaphoreticis, præsertim fumarie, helenii aut lignorum, interpositis pulveribus ex antimon. diaphor. adjecto pauculo sulphure & mercurio dulci, accedente regimine diaphoretico, partim expellenda, partim corrigenda; postea ea sunt facienda, quæ §. X. & XI diximus.

X I I I.

Si ab ira vel mœrore.

Febris lenta aut hectica si ab ira producta est, præmissis salibus digerentibus, vomitus ad bilem noxiarum evacuandam, præsertim ubi sapore amaro in ore se prædicat, optime prodest, aut saltem hujus loco, si quis forte vomitum vetet, evacuans aptum ex rhabarbaro postea temperantes pulveres, infusa vegetabilium aperientium, liquor terræ foliatæ tartari, cura feri lactis vel lactis ebutyrati, immo & ipsæ aquæ felterenses optime conveniunt.

Si a mœrore ac tristitia ortum ducat; eadem, omisso saltem emetico, optime conveniunt: in utroque tamen casu cortex peruvianus quoque magnas exerit vires, prudenter adhibetur.

X I V.

Quandoque hæ febres etiam ab *inebriantium* & cum- *Si ab*
 rimis ex vini & spiritus vini *abusu* generantur; rur- *inebria-*
 s feri lactis & ebutyrati usus est egregius, si satis *tibus.*
 u & cum legitima victus ratione continuetur. Ita
aquæ medicatæ blandiores, præsertim *felterenſes*, cum
 el sine lacte tenui, per aliquot hebdomades haustæ,
 c præstantissimæ sunt. *Ptisane* & *decoctum avenæ*,
 um nitro paratum (cura vulgo *avenacea dicta*) ma-
 næ quoque hic utilitatis.

X V.

Quod si a *sanguinis fluxibus naturalibus* aut saltem *Si a sup-*
 ularibus *suppressis oriuntur*, potus tenuis, attenuans, *pressis*
 medicamenta temperantia diapnoica conveniunt; *hæmor-*
 næ vero si non sufficiant, *venæ sectiones* justo tempo- *rhagiis.*
 & loco sunt adhibendæ, & fluxus illi propriis suis
 mediis sunt restituendi: ubi quoque *aquæ medicatæ*
 præsertim *martiales*, multum boni præstant. Ita &
venæ sectio in ejusmodi casibus præservando valde pro-
 fit, si per intervalla idonea instituitur.

X V I.

Variolæ male curatæ, vel & eæ, quæ per se fuerunt *Si post*
 aviores, etiam sæpe febres ejusmodi post se relin- *vario-*
 unt: quo in casu, lenia, sed sæpius *repetita laxan-* *las.*
 , ex mercurio dulci præsertim præparata, una cum
 a *feri lactis*, necessaria sunt ad reliquias earum val-
 acres & rodentes sensim evacuandas & corrigendas:
 ibus vero interponenda temperantia, diaphoretica
 aria, & inprimis quoque infusa pectoralia cum essen-
 s similibus, aut *aquæ felterenſes*, vel etiam his omni-
 s frustra adhibitis, in his aliisve variis febribus he-
 cis *corticem peruvianum* mature aliquoties in die ex-
 pui, eoque paucorum quandoque dierum intervallo
 res has fugavi, ciborum desiderio & viribus brevi
 titutis.

X V I I.

Postquam in omnibus hisce casibus ad eum redierunt *Si am-*
 um, ut *ambulare aut foras prodire rursus queant*, *bulare*
 cedentibus *addenda roborantia*, ut vina dulcia in *rursus*
 alu modice sumta, nisi calor vehementior id prohi- *possunt.*
 at, victus blande nutrens & facilis digestionis, sed

parcus aut modicus, Ess. cort. aurant. citri, corticis cascarillæ, Mixtura tonica, immo & usus frequens lactis ebutyrati, si æger illud non averfatur, cum blando, sed *frequenti motu* aut exercitatione corporis, cum primis *equitatione* aut iterata sæpius *vectione* in rheda sive curru.

X V I I I.

Symptomatum medela.

Si *tussis* in his febris vehementius ægros affligit, præter infusa pectoralia & Elixir. pectorale VVedelii cum parte octava Laud. liquid. Sydenh. remixtum, linctusque ex oleo amygdalarum dulcium & syrupo papaver. conducit; sed noctu cum pulveribus temperantibus, mp. de cynoglossa, vel quam præstantiorem adhuc deprehendi, mp. de Styrace gr. j. ad ij. iij. danda.

Æstus nimius sub exacerbatione temperatur succo citri, phlegmate vitrioli, vel clyffo antimonii potui instillatis, itemque feri lactis vel lactis ebutyrati potu. ut & absorbentibus citratis cum nitro ante accessionem datis.

Sudores nimii, quos *colliquativos* hic vocare solent, non vi suppressendi; sed frigore moderato, terra sigillata, coralliis rubris, spec. de hyacinth. cum paucis nitro, cascarilla & opii granulo, interposito usu sereno lactis vel lactis ebutyrati, moderandi: quibus ipsis etiam, itemque *emulsionibus*, & gummi arabico, *Diarrhœa* ipsorum, quæ sæpe periculosa, ut & lacte chalybeato, pultibus, & conservis rosarum, prudenter est refrænanda: cui scopo etiam diascordii zj. ex aqua menthæ vel cinamomi sine vino, vel cinamomi cydoniata, egregio haud raro satisfacit.

Appetitus prostratus excitatur hic amaris, ut Essentia cortic. aurantium, cardui benedicti, vel absinthii cum parte ess. cascarillæ vel corticis peruviani mixturæ; vel *Extractis amaris* in aqua stomachica vel vino malvat. solutis, & aliquoties in die exhibitis: quibus & spiritus salis, vel nitri vel vitrioli dulcis pars fere quarta commode addi potest ad cibi desiderium tanto melius excitandum.

CAPUT VII.

De inflammationibus.

I.

Quibus febres continuæ, acutæ, cognitæ sunt, ii Trans-
 facile etiam in inflammationum cognitionem at- tus ad
 que curationem pervenire possunt; quoniam in amba- inflam-
 us motus acceleratus cordis, pulsus, & sanguinis una matio-
 tum calore p. n. percipitur; præsertim in inflammatio- nes.
 nibus gravioribus, sive majoribus: ubi semper pulsus
 celer, calor præter naturam, aliaque varia febris acu-
 tæ symptomata adeste solent; vulgare enim est dictum:
 quod febris est in toto, at inflammatio in certa quadam
 parte; febresque acutæ sunt fere inflammationes uni-
 versales.

I I.

Idea vero inflammationis consistit in congestione, Inflam-
 atque majori minorive stagnatione sanguinis in certa matio,
 quadam parte; qua fit, ut sanguis, dum per multa quid.
 vasa sanguifera obstructa transire nequit, & in motu
 impeditur, reliquus per vasa libera vi & pressio-
 ne cordis irritati, tanto celerius fluere cogatur: quo
 modo, (exemplo machinarum hydraulicarum) motus
 sanguinis necessario acceleratur, atque æstus ceteraque
 symptomata inducuntur. A sanguine vero in parte af-
 fecta congesto & stagnante fit, ut in omni notabili &
 sui exposita inflammatione in loco læso tumor, ru-
 bor, dolor, calor, & plerumque etiam splendor, tam-
 quam signa inflammationum pathognomica observentur;
 quæ vero phænomena ex prædictis facile intelligi pos-
 sunt, maxime si ad illud attendatur, quod in inflam-
 mationibus plus affluat per arterias, quam per venas
 fluere possit, sicuti etiam in chirurgiæ nostr. Institut.
 docuimus.

I I I.

Varia admodum dantur inflammationum differentia: Differē-
 tæ generatim dividuntur in externas & internas, qua- tia ex-
 K 2 rum ternarū.

rum quælibet pro diversitate partis affectæ & gradus alia atque alia producant symptomata. Inter externas *Erysipelas* dicitur, quando inflammatio insignis adest in cute, late se extendens, quæ pro partis varietate erysipelas faciei, colli, dorfi, manus, brachii, scapulæ, tibiæ, aut pedis appellari solet. *Phlegmone*, si inflammatio major partes cuti subjectas, præsertim pinguedinem simul occupat, estque gradus major inflammationis, quam erysipelas. *Furunculi* dicuntur inflammationes minores in cute & in pinguedine substrata, quorum minimi sunt *vari faciei*, quibus *gutta rosacea* in facie valde affinis est.

Ex his jam facile, quid sint inflammationes sive tumores inflammatorii *tonsillarum*, *uvulæ*, *parotidum*, *mammarum*, *glandularum axillarum* & *inguinalium*, (qui *bubones* dici solent,) *testium*, aliarumque partium externarum intelligi potest. Ita *ophthalmia* dicitur, si oculus; *odontalgia*, si dentis radices; *otalgia*, si meatus auditorius inflammatione laborant.

I V.

Internarum.

INFLAMMATIONUM INTERNARUM ea, quæ cerebrum ejusve meninges occupat, *Phrenitis* appellatur; a qua vehemens dolor capitis, febris vehemens, rubor plerumque ingens faciei & oculorum, ac tandem delirium inducuntur. In *Angina* fauces & potissimum larynx inflammatus est, unde respiratio difficilis; suffocatoria, cum deglutitionis impedimento producit. *Pleuritis* in pleuræ & plerumque simul partis vicinæ pulmonis inflammatione consistit, conjunctumque habet *dolorem vehementem lateris punctorium*, pulsum durum, respirationem difficilem ac dolorificam, & tussim molestissimam, sæpe sanguinolentam. Si pulmo totus vel magnus ejus lobus inflammatione laborat, malum *Peripneumonia* nuncupatur: in qua respiratio valde anxiosa, pulsus mollis & celer. Si renes, *Nephritis*; si hepar, *Hepatitis*; si diaphragma, *Paraphrenitis*; si aliæ partes internæ, ut *ventriculus*, *lien*, *intestina*, *vesica urinaria*, *uterus*, aut *cor inflammata sunt*, inflammatio nomen a parte affecta adipiscitur; ut *inflammatio ventriculi*, *lien*, *intestinorum* &c. hæque omnes ex ardore & dolo-

re,

te, majore minorive, in regione partis affectæ, febrique acuta præfente cognosci & distingui solent ac debent.

V.

Causa proxima inflammationum est stagnatio sanguinis in certa quadam corporis parte; hujus vero *causæ* *antecedens* est vel abundantia sanguinis, sive *plethoræ*, vel *sanguis nimis viscidus*, vel utrumque simul. *Causæ* vero *procathartice* sive *occasionales* sunt, vel externæ vel internæ; ut contusiones, luxationes, fracturæ, vulnera, ligaturæ fortiores, potus frigidus vel aliud frigus, præsertim calente corpore admissum, excessus in vino, spiritu vini aliisque potibus spirituosus, exercitatio corporis sive motus nimius aut nimis vehemens, aliique diætæ errores.

V I.

Quælibet inflammatio quadruplici modo finiri potest: nam stagnatio 1. vel *resolvitur*, & pars affecta *Prognosis* *restituitur*; & hinc *resolutio* est omnium optimus finis & optima ejus curatio; vel 2. si non resolvitur aut resolvi nequit, in *suppurationem* sive *abscessum* abit; quo in statu stagnans materia corrumpitur ac putrescit, una cum vasculis, quibus hæret, hisque vicinis, quæ ambo in materiam putridam plus minusve acrem aut foetidam abeunt, *eam pus appellant*: vel 3. in *Gangrenam*, quando dolor & ardor fit vehementissimus, color, si pars affecta sui exposita est, rubicundissimus, intermixtis striis vescentibus aut nigricantibus, & vesiculis in parte affecta, cuticula a cute recedente oriundis, sero sive chore repletis; quæ signa summum inflammationis, facile in corruptionem sive putredinem aut sphacelum mutantur, gradum indicant; ita, ut *gangræna sit summus inflammationis gradus*. Quando vero, prægressis gangrænæ symptomatibus, dolor & ardor in parte affecta subito remittunt, sive prorsus cessant, eaque pallida, livida, vel nigra, frigida, insensibilis, foetida, cadaverosa, flaccida & mollis evadit, cuticula a cute recedente, vel etiam nigra, sicca sive arida quandoque, tunc *sphacelus* appellatur, quo perfectam partis corruptionem, putredinem, sive mortuum Medici intelligunt, quæ sine ablatione corrupti

non curatur. Vel 4. pars inflammata, præsertim glandulosa, ut mammæ, glandulæ, salivales, parotides, tonsillæ, axillares, inguinales &c. in *Scirrhum* sive tumorem durum & indolentem abit: qui tamen sæpe, præsertim in mammis, successu temporis malignam putredinem concipit, & morborum fere pessimum, *cancrum* sive rectius *carcinoma* producit.

V I I.

Conti-
nuitio
progno-
sis.

Cæterum quo vehementiores initio sunt inflammationes, eo difficilius resolvuntur, & hinc eo periculosiores; quia facile vel in suppurationem vel in gangrænam & sphacelum abeunt; *suppurationes* vero & quidem externæ, in partibus pinguibus & carnosis contingentes, corpore ceteroquin sano, ac pure bono, curatu utplurimum sunt facillimæ; in glandulosis vero partibus, aut corporibus mali habitus, aut senibus, longe difficilior sanantur, ac longe maiorem diligentiam & curam requirunt. *Inflammationes internarum partium omnes quidem sunt periculosæ*; differunt tamen secundum vehementiam inflammationis, & partis affectæ diversitatem sive nobilitatem: *renum enim fere securissima, & pulmonis quoque adhuc sæpe curantur*; reliquæ sunt periculosiores, hepatis vero periculosissima haberi solet.

Generatim tamen sciendum, *omnes inflammationes internas, nisi resolutione curentur, periculi plenissimas esse atque, utplurimum, mortem post se trahere*: nam si in suppurationem abeunt, pus commode evacuari, ulcusque recte purgari aut curari nequit, quia manibus accessus denegatur; hinc in tabem aut hæcticam sive phthisin aut consumptionem corporis desinunt. Si in gangrænam & sphacelum abeunt, pars corrupta auferri nequit: hinc putrescendo mortem brevi inducit. Si in *scirrhum* transmutantur, hæctica aut cachexiæ & *hydropes*, utplurimum insanabiles sequuntur, vel omnino in carcinoma sive *cancrum* abeunt.

V I I I.

Curatio
genera-
lis.

In curatione omnium inflammationum, quia ab obstructione vasorum & impedito motu sanguinis oriuntur, eo præcipue annitendum est, *ut resolutio sanguinis hærentis obtineatur*, ejus motus restituatur, atque
in

ordinem rursus redigatur: quod obtinetur optime, eodem regimine iisdemque remediis diluentibus, temperantibus, resolventibus, ac diaphoreticis, quæ in febriumutarum curatione, capite tertio, N. X. ad XII. commendavimus, non neglecta in malo graviore camphora vel in pulvere, vel in potiunculis. 2. *Sanguinis missione*, primis præsertim diebus, in loco convenienti & præcipue in parte opposita instituta; quæ ubi plethora vel æstus urget, *subinde semel iterumque reitenda*, satisque larga semper sanguinis copia, pro vium & plethoræ ratione, educenda, ut sic sanguinis impetus & affluxus copiosior in partem affectam avortatur, amplior congestio prohibeatur, & jam facta imminuatur: quæ *sanguinis missio*, præsertim in vehementioribus, & internis inflammationibus, consentientibus optimis Medicis, tuto aut *salva conscientia omitti non potest*. In *Erysipelate* tamen minore aliisque levioribus inflammationibus, iisque præsertim externis, ea sæpe usus non est.

I X.

In inflammationibus externis præter hæc, medicamen- *Externa-*
quoque resolventia adhibenda sunt externa: ubi in *rum re-*
requentissimo mihi est usu aqua calcis vivæ cum spi- *solutio*.
ritus vini camphorati parte quarta roborata, addito
binde pauculo sale ammoniaco, vel lapide medicamen-
to Crollii, calide cum spleniis crassis sæpe imposita;
vel & spiritus vini solus, aut sale ammoniaco & pau-
ciculo camphora imprægnatus; vel radic. bryon. irid. flor.
gill. Salomon. herba abúinth. scord. abrotan. fabin. fer-
ul. organ. majoran. salviæ, flor. chamomill. melilot.
ambuci, sem. 4. carminat. &c. vel in pulvere sicco,
oculo incluso, vel in quibusdam inflammationibus,
vel *no vel aqua salsa decocta*, rursusque expressa, vel &
cum spleniis parti affectæ calide sæpe imponenda, quæ
potentissime omnis quoque generis inflammationes re-
solvunt. Plura externa in Institut. chirurgic. meis,
si lubet, videri possunt. In nonnullis externis inflam-
mationibus, præsertim in *furunculis, bubonibus, in-*
flammatione tonsillarum & mammarum, &c. Emplastr.
de sperm. ceti, diachylum simplex de meliloto, item-
que diaphoreticum Myns. addita præsertim camphora,

egregie quoque resolvunt. Speciatim vero in *erysipela-*
te farina quædam calida, vel per se, vel cum ceru-
 fa, creta, pulvere liquiritiæ paucaque camphora remix-
 ta, externeque calide applicata, valde profunt, vel
 pulvis contra erysipelas Mynsichti, eodem modo usur-
 patus, aut & ipsa aqua calcis vivæ cum spiritus vini
 camphorati parte quarta remixta, ante jam laudata,
 licet multi omnia humida hic promisce, sed male, re-
 jiciant, benefacit. Alia hic convenientia medicamenta
 in Chirurgicis nostris Institut. Lib. de Tumoribus cap.
 2. n. 14. videri possunt.

X.

*Suppu-
ratio.*

Si vero *resolutio tumoris inflammatorii obtineri nequit*,
 quod cognoscitur, quando inflammatio ultra quartum
 diem augetur, & dolor quotidie increscit, ut plurimum
suppuratio sequitur. Igitur a resolyentibus abstinendum,
 & suppuratio contra est promovenda: id quod præ-
 stant, 1. omnis generis *medicamenta emollientia*, mucil-
 aginosa & pingua. 2. Medicamenta, quæ præter par-
 ticulas emollientes etiam *stimulantes* possident: quibus
 fit, ut acri eorum stimulo impetus sanguinis ad locum
 affectum invitetur, vasa obstructa hoc ipso tanto citius
 rumpantur, & in pus convertantur: talia sunt, præter
 cataplasmata in chirurgia nostra his in malis commen-
 data, (a) vel vulgatissima, attamen quam efficacis-
 sima, domestica, vulgo dicta, remedia, nimirum *cepe*
sub cineribus assata, vel *mel cum farina*, in cataplasma
 redactum, aut *mica panis triticei* similem in formam
 cum lacte cocta, admixto pauco butyro & croco, si
 lubet, calide sæpius applicata. Interdum loco horum,
 præsertim in minoribus inflammationibus, emplastra
 commodius applicare possumus; quo scopo *emplastrum*
diachylum cum *gummis* sane præstantissimum est. Qui-
 bus medicamentis continuandum, donec maturatio fa-
 cta; quæ ex mollitie partis, ruboris remissione & ma-
 teriæ fluctuantis sub cute sensu, si digitis comprima-
 tur, optime cognoscitur; vel etiam quandoque ex ipso
 pure sub cute vel cuticula jam apparente & visui sese
 manifestante.

XI.

(a) Lib. de tumoribus cap. III. n. 6.

X I.

Maturatione igitur facta *abscessus* (nisi hoc sponte factum sit, ut sæpe contingit) vel scalpello chirurgico, vel caustico *mature aperiendus est*, ne dolor diutius ægros vexet, aut pus partes subjectas edat, aut corrumpat, & vel fistulam vel cariem producat.

Abscessus aperiendus.

Abscessus vero apertus melle vel unguento digerendumundandus, & postea vel hoc ipso, vel apto balneo quodam vulnerario, ut vulnus, sensim consolidandus.

X I I.

Quod si inflammatio neque resolvi, neque ad supurationem deduci queat, sed in *gangrænam*, immo *sphacelum* abeat, nulla ratione hæc mala melius cohiberi sunt, quam si interne *cortex peruvianus* frequenter magna satis copia, sicut in febribus intermittentibus obstinacibus, continuatis, simul laudatis externis, exhibeatur: hunc enim sicuti in his febribus, ita in *gangræna* & *sphacelo* sistendis, summum esse speculum, non solum Angli, qui hoc primum observavit, sed & ego, præter alios præstantissimos Medicos Chirurgos, aliquoties sum expertus: interea tamen non semper expectationi satisfacit. Quæ externe in hoc casu immo & in *sphacelo*, scalpello & medicamentis ut facienda, in Institut. chirurg. nostris, si lubet, fieri possunt. Si inflammatio in *scirrhum* abeat, quando malum sit curandum, infra, ubi de *scirrhis*, proponetur.

Quid in gangræna faciendum.

X I I I.

In inflammationibus vero internis summa ope niti debemus, ne in *suppurationem*, multo minus in *gangrænam* eant, quia utraque, sicuti supra jam dictum, utrimum lethifera est, sed resolutioni sive discussioni qua sola hi ægri rite curari possunt) unice studendum. Quæ vero (ut jam in externarum curatione docimus) optime obtinetur, 1. sanguinis missione sufficiente, mature instituta; & ubi symptomata existunt, non raro repetita. 2. potu largo aquosorum, diuturnorum, resolventium & refrigerantium, in curatione febrium continuarum supra Cap. III. §. X. & seq. indi-

Quomodo internæ curandæ inflammationes.

indicatorum, itemque 3. *medicamentis temperantibus* & diaphoreticis ex absorbentibus citratis, lapid. cancror. præsertim & conchis citratis, itemque antimonio diaphoretico & nitro, in forma pulveris, potiunculæ, essentia, infusi vel decocti. 4. *temperato regimine*, ut in iisdem & febribus indicatum est acutis. 5. *clysteribus* emollientibus, nitrosis, præsertim ubi alvus est obstructa.

X I V.

De Phrenitide.

*Speciatim
phreneticis.*

Speciatim vero in *phrenitide* his addenda sunt 1. *epithemata* fronti applicanda, & quidem primo ex *repellentibus*, ut, ex aceto rosaceo, vel lavendulæ in principio; deinde vero 2. *ex resolventibus*, ut ex spiritu vini camphorato crocato, calido in progressu; 3. *pulveres* camphorati nitrosi, Cap. III. §. 17. Postea etiam 4. ubi malum est vehemens, *hirundines* ad tempora & retro aures sunt adhibendæ; vel 5. *venæ sectio*, præsertim in vena jugulari est iteranda; *vesicatoria* suris & brachiis applicanda, fermentum panis cum aceto forti, pulvere seminis sinapi, sale nitro aliisque acris mixtum, plantis pedum calide impositum. Denique etiam irritatio interna narium ad hæmorrhagiam excitandam, vel ipsa *scarificatio narium* magnæ quoque interdum hic potest esse utilitatis. Vid. Stahlus de scarificatione narium Ægyptiaca.

X V.

De Ophthalmia.

*Ophthalmiæ
differentiæ,
& levioris
curatio.*

OPHTHALMIA sive oculorum inflammatio dividitur primo potest in *leviorem*, *vehementiorem* & *vehementissimam* (quam *Chemosis* vocant) eæque rursus in *siccam* & *humidam*. *Sicca*; *levior*, *recens*, sæpe aqua simplici frigida vel aqua rosarum sola, vel collyrio modice refrigerante, ex aquis opthalmicis v. gr. aqua rosarum, plantaginis, florum cyani, vel calcatrippæ, cum

in pauxillo sacchari Saturni, vel tutiæ vel lapidis calaminaris, si eis sæpe lavetur, curatur.

Sed humida curatu difficilior, immo sæpe difficillima est, præsertim inveterata, ut & in cachecticis, scorbuticis, contagio venereo, & glandulis induratis aut oophulis infectis, aut annosioribus, ubi sæpe cæcitas & speciatim maculas oculorum sive leucoma, erygium, vel unguem, caliginem, cataractam, aut leucoma, hypopyum, staphyloma aut exulcerationem destructionem totius oculi producit. *Ophthalmia* interna est vel externa tantum, vel quoque simul interna hæc cognoscitur, quando ægri difficillime vel prorsus non lucem aspicere possunt, & longe periculosior est externa.

X V I.

In curatione vero humide revulsionis gratia idonea Curatio
gentia primum sunt exhibenda, & subinde repetenda. *humide*
deinde in ægris calidioribus pulveres temperantes, *internæ.*
solventes, salini, nitrosi, *diluentia*, temperantia, &
deinde diaphoretica interna conducunt; in serosis vero
e *phlegmaticis* aut frigidis præcipue Eff. succin. li-
por. ligni sassafr. Tinctura antimonii tartarifata & si-
lia resolventia anticatarrhalia, cum *infusis calidis*
herbis vegetabilium resolventium, præsertim *herbæ eu-*
rasia & *veronica* cum ligno sassafras aut fœniculo,
anda sunt.

X V I I.

Externæ conducit collyrium ex aquis ophthalmicis *Exter-*
tis, ut ex aqua euphrasie, fœniculi, florum cyan. *na.*
antaginis, rosarum &c. quibus parum tutiæ PPTæ vel
lapidis calaminaris PPT. aut sacchari saturni, aut lapi-
dicamentosi Crollii, aut vitrioli albi admixtum
, quo oculi sæpe lavandi & abstergendi, atque gut-
ta una vel altera ei subinde instillanda, immo, &
penia eis imbuta, noctu præsertim, ipsi imponenda.
vel spiritus vini camphoratus simplex aut crocatus lin-
is complicatis & ad ignem leniter rursus exsiccatis,
culis inflammatis calide ac prudenter impositus, egre-
e sæpe conducit, qui & prædictis spleniis super im-
ni utiliter potest. *Lac croco largius imbutum*, si te-
de sæpe oculis instillatur, præsertim infantibus, vel
cum

cum spleniis calide sæpe imponitur, quoque est egregium. Ita & *trochisc. alb. Ribaf.* ʒʒ. in aquar. ophthalmicar. ʒiv. soluti, valde profunt, si, ut de ceteris collyriis supra dictum est, usurpentur. In sanguineis vel evacuationibus sanguinis naturalibus aut artificialibus consuetis, suppressis, etiam venæ sectio, præsertim in malo graviore, primo in brachio vel pede, deinde in jugulari vena instituta, vel & scarificationes, eæque si opus, repetitæ, valde profunt.

X V I I I.

*Curatio
vehementi-
ssima.*

In vehementissima ophthalmia, quam *Chemosis* vocant, ubi adnata inflammata corneam suo tumore superat, aut supra corneam se elevat, sanguinis missio eaque larga, immo repetita est instituenda, & denique sectio venæ jugularis, præsertim si aliæ sanguinis detractiones jam præcesserunt, summe necessaria & utilis est: immo & ipsa scarificatio Hippocratica, a VVoolhusio in usum rursus vocata, in palpebris & ipsa adnata subinde hic prodest. (a) At in serosis aut phlegmaticis præter purgantia, vesicatoria cervici, post aures, temporibus, pedibus, inter scapulas, aut quandoque ipsi vertici adhibita, præsertim si satis magnæ sunt, multum sæpe præstant; vel horum loco farina sinapi, vel seminis erucæ, sacculo inclusa, in vino cocta, & cervici calide adplicata revellendo quandoque conducit. Corticis peruviani usus in his malis haud raro multum quoque præstat, præsertim si febris simul adest.

X I X.

*Si oph-
thalmia
a causa
venerea.*

Quandoque virus venereum causa est ophthalmiæ perniciosa, id quod inde intelligimus, si vel morbus venereus præcessit, vel symptomata quædam venerea adhuc adsunt. Ita & si glandulæ colli induratae simul adsunt, (quæ ophthalmia scrophulosa dici solet) interna remedia antivenerea, ut decocta lignorum & mercurialia rite sunt adhibenda, immo & externe collyria ex aquis ophthalmicis & tutia vel lapide calaminari mercurii dulcis gr. j. vel alterum addendum, quo oculi

li

(a) De qua vid. Chirurgia nostra, Part. II. cap. 52.

sæpius fovendi. In iisdem casibus sequens nodulus mercurialis quoque multum valet.

R. mercur. præcip. rubr. ℥j. vel 3℥. ungu. rosat. ℥j. M. & includatur linteo tenui, ac fiat nodulus, qui in aqua rosarum aliave simili in vitro, loco temperato asservatus reponatur, eoque oculi ejusmodi sæpius detergantur.

X X.

Ad præcavendum hoc malum sæpius recurrens, extra roxysimum egregie conducunt *venæ sectio* circa æquidistia & *scarificationes* atque *purgationes* subinde institutæ, sæpius aut rarius, prout malum vehementius & frequentius esse solet. Nonnullis valde profunt *fonticuli* aut *setacea*. Quibus etiam ad humores corrigendos & congestiones præcavendas, anticatarrhalia, ut . C. C. succinatus, Essentia succinii, lignor. cumunctura antimonii tartarifata, ex infuso vel decocto phraf. & lign. sassafras, itemque pulveres diaphoretici resolventes, immo & *mercurialia* quandoque *intercedenda*. Ægri bonam servant *dietam*, vitent aspectum solis, ignis, nivis, aliorumque corporum splendentium; vitent lectionem multam, præsertim minorum characterum, maxime nocturno tempore; vitent quoque fumum, pulverem, aliasque res oculos irritantes, secundum scholæ Salernitanæ præceptum.

*Præservatio
sæpe recurren-
tis.*

X X I.

De Angina.

In *Angina*, (quæ N. IV. est congestio sanguinis & inflammatio sæpe vehementissima in faucibus, præsertim in pharynge & larynge, ut deglutitio & respiratio inde vehementer lædantur) *ante omnia revulsione* *Angina.*
Antia purgans, ex potiuncula potissimum purgante, emarindis, fenna & manna parata, exhibeatur, atque tertio die clyisma antiphlogisticum injiciatur, deinde prægressa purgatione, *largiter e vena brachii vel pedis evacuetur sanguis*; & si post aliquot horas malum non remittat, vel adhuc augeatur, *venæ sectio* semel iterumque *repe-*

repetenda, & præsertim *in vena quoque jugulari* altera vel tertia vice instituat, quæ hic magnæ est utilitatis, atque in malo graviori, quod prioribus non cedit tandem etiam *ranina* sub lingua incidantur: immo *cucurbitula scarificata* parti femorum *internæ*, dorso collique lateribus impositæ, magnarum sunt virium. (a) Interea quantum fieri potest frequenter medicamenta diaphoretica temperantia & nitrosa; ut pulveris temperans vel diaphoreticus noster exhibeantur, *potusque tenuis acidulatus, & nitratus*, largus ægris commendetur, quamdiu deglutire possunt. Quando vero non amplius aut vix deglutire possunt, *externa remedia* quam solertissime sunt adhibenda: & quidem prima quotidie semel aut bis alvus lotionibus temperantibus nitratis est ducenda.

Gargarismata præterea, fomenta & *emplastra* colliganda imponenda, valde hic sunt necessaria: inter hæc *emplastrum de melioto camphoratum* est præcipuum; in hujus loco, præsertim ubi magnus in faucibus ardor est, spiritus vini camphoratus, & præcipue crocatus calide cum linteis sub mento laryngi adplicatus, egregie prodest. *Gargarisma* vero ex decocto radic. bistortæ, tormentillæ, irid. Flor. caryophyllat. helen. herb. hyssopi, prunell. fl. malv. rosar. papaver. asper. fungis sambuci &c. fieri potest, cum syrup. dianthi vel diamori: cui parum aluminis & nitri vel salis ammoniaci addatur, quod etiam, si lubet, ope syringæ in fauces injici potest. *Pediluvia* tepida, *sinapismi frictiones pedum* hic quoque valde conducunt, & in summo malo, ubi suffocationis metus, aspera arteria est aperienda, sive *Tracheotomia* est instituenda, de qua videri possunt Institutiones nostræ chirurgicæ: non quod credamus, hujus ope anginam curari, sed ut tempus lucremur, quo diutius ægro respirationem conservemus, atque sic medicamenta resolventia continuare valeamus, donec æger liberius respiret, & a morbo liberari queat.

(a) Has maxime etiam laudat Dekkerus in Exercitio pract. p. 244.

X X I I.

De tonsillarum & uvulæ inflammatione.

In tonsillarum & uvulæ inflammationibus eadem *Tonsil-*
 curandi methodus, nisi quod venæ sectio in levio- *larum*
 malo non adeo sit necessaria; quæ tamen nihilo- *& uvu-*
 nus ad suppurationem aliaque graviora mala aver- *læ tu-*
 da sæpe utilis, ubi æger vel plethoricus, vel in- *mores.*
 mmatio admodum vehemens. *Alvum vero ducere,*
 præsertim potione purgante ex tamarindis, foliis fen-
 & manna, in leviori malo præstat; quæ tamen
 am in graviori malo utiliter adhibetur. At si quar-
 vel quinto die prædictis remediis aliqualis imminu-
 mali nondum facta, & tumor persistat, tunc reso-
 tio rarius obtinetur; hinc emollientibus gargarisma-
 us vel emplastris, præsertim diachylo cum gummis,
 to applicatis, aut cataplasmatibus quoque emollien-
 us suppuratio potius promovenda, iisque continuan-
 n, donec abscessus vel sponte rumpatur, vel scal-
 lo aperiatur; quo facto gargarisma fiat ex infuso
 decocto herbæ cujusdam vulnerariæ, vel etiam in-
 o simplici Theæ, cum melle rosarum, cui parum
 i addatur; quod æger calide sæpius fauces colluat,
 nec restitutus est. Interea tamen sciendum, me-
 ius vidisse, ejusmodi tumores post plures dies sub
 o suppurantium usu adhuc resolutos fuisse, ideoque
 eorum resolutione non semper mox desperandum
 licet ea quandoque lente & tarde fiat.

X X I I I.

Quia vero molestissimum hoc malum in nonnullis *Præfer-*
 e redit, *præservatio optima est*, præter moderatam *vatio*
 tam, venæ sectio circa æquinoctia, vel in brachio, *horum*
 etiam in pede instituta. Alios vero etiam *sacrifi-* *malorū.*
 ones subinde repetitæ, alios utrumque; alios vero
 iculi in brachio aut pede ab his malis immunes
 dunt: iis vero neglectis, facile redeunt.

X X I V.

De Pleuritide .

Pleuritis & peripneumonia .

IN PLEURITIDE , PERIPNEUMONIA ET PARAPHRENITIDE , præter generalia N. VIII commendata , lateri sive loco dolenti spiritus viri camphoratus linteis complicatis calide imponatur , aut *vesica lacte calido* , in quo flores chamomillæ vel sambucci cocti sunt , repleta ; vel etiam sacculi ficci et vegetabilibus resolventibus cum camphora , vel ex farina aut farina calida , si priora forte ferre non posset utiliter applicantur ; quæ *camphora etiam interne* huiusmodi efficacissima est , præsertim in malo graviori . In pleuritide spuria sive notha , externas partes magis occupante , in qua vehemens ad tactum dolor adest , *Lanciscius* jubet , prægressa venæ sectione larga in brachio & incisa prius cute supra partem dolentem , *duas cucurbitulas* , loco dolenti applicare , affirmatque hoc ipso , incantamenti instar , sæpe totum hunc morbum tolli , immo & in vera sive interna , modo pulmonum non simul sint affecti , egregium esse auxilium asseverat . (a)

X X V.

Quando in abscessum abeunt .

Quando pleuritis aut peripneumonia non resolvitur sed in abscessum abit , & pus per asperam arteriam evacuat , expectoratio est promovenda , & postea ulcus glutinandum . Prius fit i. speciebus pectoralibus lubricantibus ex rad. malv. liquirit. ficibus , dactylis passulis & herbis pectoralibus compositis ; quibus superinde olei amygdalarum dulcium , vel lini cochlear. vel ij. interponatur ; vel linctus pectoralis ex modo laudatis oleis cum spermate ceti & syrupo violarum paratus . His per aliquot dies continuatis , donec purulenta materia maximam partem est rejecta . Consolidatio est procuranda infuso ex herbis traumaticis & pectoralibus parato , aliquoties in die haustum cum

(a) Vid. Morgagni Advers. Anatom. V. p. 83.

in quo Mixturæ tonicæ, ex spiritu CC. & Tinctura tartari compositæ, gutt. xxx. ad xxxx. in primo hau-
alo sunt sumendæ; vel etiam Elixirii pectoralis We-
lii eadem quantitas, vel etiam balsami pectoralis
leibomii vel vulnerarii Locatelli apta dosis, donec
tus rursus clausum sit. Si *febris lenta* aut *hectica* ac-
dat, curatio hujus vid. Cap. VI.

X X V I.

In VENTRICULI, INTESTINORUM, HE-
PATIS, LIENIS, RENUM, VESICÆ & UTERI
INFLAMMATIONIBUS, externe loco dolenti vel
sica lacte calido repleta, modo §. 24. laudata, in-
mis si chamomilla in eo prius cocta est, impona-
t; vel spiritus vini camphoratus crocatus, cum lin-
s complicatis, calide sæpius applicetur; cui adhuc
culi ex herbis resolventibus majoris efficacix causa
perimponi possunt. Præterea & clysmata emollientia
paregorica ex chamomilla præsertim, vel veronica
lacte aut jusculo cocta, & semel, bis aut sæpius in-
applicata, egregiam his in abdominis malis opem
unt. In *nephritide*, *vesicæ aut uteri inflammatione*
eviori, præter hætenus laudata, etiam *hirundines*
o applicatæ, egregie sæpius profunt, præsertim si
morrhoides suppressæ in culpa, vel molimina hæmor-
oidalia percipiuntur, ad sanguinem inde derivandum.
terne eadem sunt adhibenda, quæ §. VIII. genera-
a commendata sunt, speciatim vero *in ventriculi in-*
flammatione camphora pulveribus digerentibus admixta
entissima est.

Reliquæ
inflam-
matio-
nes in-
terne.

Monita practica.

t. *Venæ sectio*, uti in plerisque inflammationibus,
de utilis est, si in principio instituitur; ita e contra-
noxia plerumque deprehenditur, si nimis tarde,
ægro jam valde debili, administratur. Si vero æ-
plethoricus, vires satis adhuc constantes, magnus
æstus adsit, & malum laudatis remediis, ut sæ-
s vidi, non cedat, etiam paulo tardius administra-
his adhuc sæpe prodest.

t. In *levioribus inflammationibus* & subjectis non ple-
ricis sanguinis missio non semper est necessaria; in

malignis vero plerumque noxia deprehenditur, adeoque ab ea abstinendum.

3. In quacumque inflammatione *frigida extus aut intus applicata ut plurimum nocent*: quia sanguinem spiritum ac stagnantem magis coagulant & vasa obstruunt fortius constringunt, atque sic inflammationem peiorem reddunt. In *ophthalmia* tamen, & præsertim ejus principio, aqua simplex vel collyria frigida recte ac sine noxa adhibentur, nam experientia docuit, *ocula frigida plerumque magis esse amica, quam calida*; in statu vero fatus resolventes calidi vel potius tepidi ex decocto hyssopi, veronicæ, euphrasæ, fœniculi & similium ophthalmicorum aut digerentium remediorum melius usurpantur.

4. *Medicamenta spirituosâ calefacientia, & volatilia in inflammationibus interne nocent*; quia motum sanguinis & æstum augent; externe vero spirituosâ, & cum primis spiritus vini camphoratus, egregiam vim resolvendi & refrigerandi obtinent.

5. Tumores inflammatorios externos *non nimis mature aperiendos esse censeo*; quia immaturi majores dolores aliaque varia sæpe symptomata concitant. Attamen etiam, ut §. XI. dictum est, non nimis tarde incidendi. Verum simulac ex aliquali tumoris molli aliquid puris inesse percipimus, tuto & optime aperi possunt, immo debent, licet totus tumor nondum molli aut suppuratus sit: ne fistulæ excitentur, aut ossa pure vitientur, & ut æger citius a febre, anorexia & vehementibus doloribus, quos hi tumores sæpe excitant, liberentur.

CAPUT VIII.

De hamorrhagiis, sive fluxibus sanguinis.

I.

Hæmor-
rhagiæ
quotu-
plices &
causæ.

Hæmorrhagiæ dividuntur in spontaneas, violentas & artificiales; at de prioribus nobis hic potissimum sermo erit: quæ Stahlianis actiones videntur an-
ma

æ, magna prudentia susceptæ, quibus sanguinem quantitate, & non raro quoque qualitate peccantem, ad mala illa, quæ a plethora potissimum, vel prava quantitate oriri solent, avertenda, expelleret: nobilis vero non ab anima, sed a causis physicis; a sanguine scilicet vel quantitate vel qualitate peccante; vasaque ex rationibus mechanicis fortuito rumpente, sine animæ scientia, concursu aut directione graves ob rationes provehere videntur.

I I I.

Harum SPECIES præcipuæ sunt hæmorrhagia nasalis, hæmoptysis, hæmorrhoides, vomitus cruentus, & præcipue in mulieribus, mensium atque lochiorum fluxus; itemque hæmorrhagia uteri in gravidis & aliis. In mulieribus etiam accenseri potest fluxus varicum in cruribus, qui quandoque in quibusdam, sed longe rarius, servatur.

Species.

I I.

Ratione ætatis notandum; quod in junioribus maximum hæmorrhagiæ; in media ætate, hæmoptysis & vomitus cruentus; at in proVectioribus, hæmorrhoides & miæctus cruentus sæpius observentur: quæ si a tempora servant, periodice, sin minus, vagæ vel irregulares nuncupantur.

Ætas.

I V.

SUBJECTA hæmorrhagiis obnoxia sunt maxime cholici, præsertim juniores; sanæ plerumque ceteræ & floridæ constitutionis; atque ingenii ut plurimum excitati; ut sunt cholericæ sanguinei, & sanguine melancholici; deinde & ii, qui diætâ lauta, præcipue calfaciente, aromatica & cumprimis vinosâ nutriuntur; maxime vero omnium ii, qui ad iracundiam prædispositi sunt proclives.

Subjecta.

V.

CAUSSA hæmorrhagarum proxima ut plurimum est plethora; quæ vero raro per se, (nisi in mensibus floridis & lochiis) sed tunc demum hæmorrhagias excitat, quando vehementius a spirituosissimis, aromaticis, volatilibus, calfacientibus; æstus ac motus fortiores sanguini inducentibus, exagitur; ut ab aere calidiore, aut corporis, aut ira vehementiore, abusu vini alio-

Causæ.

rumque inebriantium, vel & Venere nimia : quo fit, ut vasa sanguifera, ubi natura sunt debiliora, aut nimium dilatat, ut sanguinem transmittant, aut disrumpat; quod tanto facilius contingit, si sanguis simul acri, biliosa, aut scorbutica alcalina intemperie sive dyscrasia laborat.

V. I.

*Stahl*ii *Stahl*iani quidem animam rationalem hæmorrhagiarum harum, ut jam diximus, *causam esse volunt*, quæ cum nimium sanguinis copiam, aut pravam qualitatem, corpori noxiam, cognosceret, *prudenter consilio deliberatione*, atque instituto *supervacuum aut noxium sanguinis partem*, dilatato vel rupto quodam vase sanguifero, aut pluribus simul, ex corpore expelleret, illudque sic a nimia copia vel vitioso etiam sanguine noxisque inde metuendis liberaret.

V I I.

In dubium Sed præterquam quod anima ægri cognitionis hujus, consilii, & actionis prorsus ignara sit, si a prudentia animæ hoc dependeret negotium, evacuatione illæ sanguinis *semper*, vel *saltem ut plurimum*, in locum *refertur*, *tuto*, & *seculo*, ut in naribus vel intestino recto, atque in mulieribus in utero contingerent. Verum cum sæpe in pulmonibus, ventriculo, vesica vel renibus fiant, atque inde ægri haud raro brevi tempore, immo paucis horis aliquando pereant, vel saltem inde in vitæ periculum, aliunde morbum periculosissimum, ut ulcera pulmonis aut renum, ac phthisis conjiciantur, ego prius existimo, sanguinem copia & acrimonia peccantem, & *vi cordis*, (quæ nobis *hæc natura est*) pressum, vasa valde distendere, expandere atque tandem ob rationes mechanicas casu illo fortuito perrumpere vel erodere, ubi in hoc vel illo corpore forte debiliora sunt, minusque resistunt; hinc in hunc per nares, in illis per pulmones, in aliis per ventriculum, renes, vesicam, vel hæmorrhoidalia vasa sanguinem effundi. *Si enim hæc res ab animæ arbitrio, prudentia, atque directione dependeret*, anima hominum sapientium *semper per loca secura*, & ubi sanguinis fluxus minimum vel nullum incommodum produceret, sanguinem abundantem vel noxium expelleret. Verum e contra

tra-

ario videmus, in hominibus etiam sapientissimis, im-
 o in ipsis Medicis prudentibus, qui, quid noxium,
 is didicerunt & intelligunt, sæpe hæmorrhagias con-
 animæ ipsorum voluntatem, & quidem in locis
 ud raro periculosis contingere, ubi anima ipso-
 m vellet, optaret, ac desideraret, *ut per nares vel*
estinum rectum sanguis excerneretur, qui tamen relu-
 ante & invita anima per pulmones, ventriculum,
 nes aut vesicam sæpius expellitur. Verum anima o-
 nibus suis viribus & conatibus, quantopere etiam ve-
 , hæmorrhagias periculosas, in loca minus periculo-
 dirigere aut relegare nequit; hinc verisimilius est,
 in machina nostra corporea etiam ex causis mere
 ysicis & mechanicis contingere, vimque cordis for-
 to perrumpere vasa, sicuti torrens oras vel aggres-
 os debiliores, quæ in hoc vel illo homine natura si-
 forte fortuna debiliora sunt. CELSUS enim jam
 dum dixit, & experientia quotidie id confirmavit,
illum esse hominem, qui non partem aliquam præ cere-
beat debiliorem. Stultissima enim esset anima,
 æ, dum posset, sanguinem non per loca tuta ex-
 leret, & consulto loca periculosa, immo periculo-
 ima eligeret.

V I I I.

Quæ per pulmones, ventriculum, renes aut vesicam
 attingunt hæmorrhagiæ, *periculosæ sunt*, sicut &
 morrhagiæ uteri gravidarum; reliquæ vero modera-
 contingentes, sive per nares, hæmorrhoides vel
 erum fiant, nullam noxam, sed egregium ut plu-
 um corpori emolumentum afferunt: morbos enim
 ultos a plethora alias oriundos, revera præcavent,
 ultosque jam factos minuunt ac tollunt, adeoque
 quiete & moderato victus regimine sibi relin-
 endæ, & non, nisi insignis debilitas id exigat,
 mediis sunt cohibendæ. Immo quamvis etiam
 inde largæ admodum sint, atque imperitis ma-
 um injiciant terrorem; tamen non mox, hoc est,
 te notabilem debilitatem cohibendæ: quia haud fa-
 e vitæ periculum inde metuendum, dum paucissi-
 inde moriuntur, & copia satis imminuta, sponte
 rumque tandem constrictis denuo vasis rursus cessant.

Prognosis.

Contra, quando præmature sistuntur, gravissima sæpe mala, & cumprimis hæmorrhagias in aliis locis, vel inflammationes, hæcticam, phthisin, cachexiam, hydropes &c. inducunt. Quo magis hæmorrhagiæ benignæ & certis periodis redeunt, eo minus periculi inde metuendum.

I X.

Curatio In curatione *duplex tempus est respiciendum*, vel *extra paroxysmum*, quo recrudescentes sanguinis noxios aut enormes fluxus præcavere sive avertere studemus; *pro copia vel ipsius paroxysmi*, in quo præsentis sanguinis nimiam vel noxiæ profusiones moderandæ & cohibendæ sunt.

da. Proponemus primo curam, quam præservandi fine *extra paroxysmum* adhibere convenit; ubi, quia sanguinem *quantitate peccantem* ut plurimum corpus gravare cognoscimus, convenienti modo imminuendus erit. Hinc huic indicationi satisfaciendum 1. *per hæmorrhagias sive sanguinis detractiones artificiales*, & præcipue *per sanguinis missiones*: extra paroxysmum, maxime circa æquinoctia, aut ubi res in majori plethora, aut sæpius recurrente hæmorrhagia, ita postulat, sæpius ac larga satis quantitate institutas, &, ut in plethora dictum est, loco conveniente administrandas; vel in quibusdam etiam, qui venæ sectionem adeo frequentem forte averfantur, per interpositas *scarificationes* vel *hirudines*. 2. *per frugalem sive parcam ac refrigerantem victus rationem*: in qua non solum nimia alimentorum quantitas, sed & acria & potissimum aromatica, nimius carniū usus, vini abusus, spirituosæ atque calefacientia sunt vitanda. 3. *per motum corporis moderatum*, sed frequentem extra paroxysmum institutum: ubi ambulatio, *vectio in curru*, & *equitatio* moderata commendanda. & 4. *per lene purgans quoadmodum usurpatum*; ubi præcipue potiuncula ex tamarindis, foliis fennæ, rhabarbaro, cremore tartari & marina conducit; vel sal amarum purgans, in aqua vel simplici vel minerali, apta copia sumptum.

X.

2. *Pro* Ratione qualitatis sanguinis biliosi, acris, alcali & volatilis corrigendi, *absorbentia*, ut lapides cancerum conch. ppt. mater perlarum, &c. præsertim succi citri.

tri imprægnata, itemque his juncta salia media ac
 trofa, aut pulvis meus temperans, vel similis alius,
 circa dosi, sed sæpius, quando orgasmus sanguinis id
 igit, ex aquis temperantibus vel simplici exhibeantur.
conducit & lenium acidorum, ut Succu citri, ribesio-
 rum, berberum, mororum, cerasorum acidorum, gra-
 torum, &c. eorumque syrapi, itemque aceti, cappa-
 rum, citreorum, limonum, acetosæ, & similium,
 in cibis, quam in medicamentis *modicus usus*;
 & aquis illis vel decoctis hordei commode immi-
 eri possunt.

His subinde, ut jam antea diximus, *blanda laxan-*
 §. IX. *laudata interponenda*, vitando acria, alcali-
 , spiritiosa, sulphurea, resinosa, aloetica, myrrha-
 , crocata & similia; *potus vero diluens, aquosus, suf-*
zens, cum vel sine blando acido admixto, assumen-
 s. Huic denique intentioni etiam egregie inserviunt
quæ medicatæ, præsertim leniores, ut Selterenses, Em-
 nses, VVildungenes, Spadanæ, & similes, legitime
 purpatæ, cum primis *sanguinis detractione præmissa*,
 etiam loco harum *seri lactis usus* bis in die ad li-
 i. vel duas aliquandiu continuatus.

X I.

In ipsius hæmorrhagiæ paroxysmo, eæ, quæ per inno-
 a loca moderate contingunt, nulla prorsus indigent cu-
 ratione; sed tantum quietem & abstinentiam a cale-
 cientibus & acribus requirunt. Eas vero, quæ largio-
 , non conducit adstringentibus mox suppressere: quia
 rtim vasa & glandulæ in primis viis, mesenterio,
 mone aliisque partibus ab his constringuntur, ob-
 uuntur, atque hæctica, phthisis, cachexia, hydrops
 iaque mala facile inducuntur, partim a sanguine hoc
 tento, cohibito aut represso omnis generis morbi fa-
 le proveniunt; verum præstat potius *initio orgasmum*
sanguinis fere semper hic præsentem, potu aquæ sim-
 icis, vel succo citri imprægnatæ, vel seri lactis &
 te laudatis §. X. temperantibus, nitrosis, absorben-
 bus citratis, & cinnabarinis pulveribus, sæpe pro ne-
 ssitate abhibitis, compescere, & singulis vel alternis
 oris, aut etiam sæpius, si res exigit, ℞j. vel ℞ss. ex

*Curatio
 in paro-
 xysmo
 levioris.*

aqua simplici vel aquis refrigerantibus idoneis exhibere, & haustum frigidæ superingerere.

Interponi his etiam cum fructu possunt *emulsiones* ex amygdalis, sem. 4. frigid. & papav. albi paratæ, & nisi hæmorrhagia valde urgeat, solis hisce temperantibus frequenter adhibitis continuandum, & ad fortiora adstringentia ob prædictas rationes non accedendum, nisi magna id exigat necessitas.

X I I.

Vehe- *Quod si vero hæmorrhagia sit vehementior, & his*
mentio- non cedat, ægerque inde *valde debilis evadat*, tunc
ris. demum blanda *adstringentia & opiata*, modica copia prædictis temperantibus jungenda: quæ cum primis optimum effectum edere solent, si versus noctem potissimum exhibeantur, quamvis & interdium dari queant.

Inter *moderata vero & securiora adstringentia*, præcipua hic sunt vel *Mixtura tonica*, ex *Tinctura tartari & spir. C. C.* vel *pulveres ex corialis rubris*, vel *lapid. hæmatite*, aut *specieb. de hyacintho*, quæ dimidia circiter portione modo §. XI. laudatis pulveribus temperantibus miscentur, & cuivis dosi extr. papav. rh. vel mp. de cynoglossa gr. j., vel quod perinde est laudani opii pars grani quarta, aut in robustioribus gr. ℥. additur, quibus etiam *Tinctura flor. papav. verosar. rubrar. potui aquoso istillata*, vel *Tinctura coralliorum*, vel *Tinctura terræ japonicæ*, vel *martis Ludovici*, aut *lapidis hæmatit. in graviori malo cum vehiculo aquoso data*, quandoque interponenda.

Huc etiam referri meretur *celebris pulvis stypticus Heurnii*, (a) ex *adstringentibus & anodynis* constans quem multi jam magno cum successu in omnis generis hæmorrhagiis, præsertim *hæmoptysi*, *uterique nimis fluxibus*, adhibuerunt, qui ita se habet.

℞. Sem. hyoscyami albi, sem. papav. albi ā ʒj. lap. hæmatit. ppt. corall. rubr. ā ʒ℥. camphoræ ʒss. M detur subinde ad ʒj. vel ʒ℥. ex aqua simplici vel de stillata, aut julepo acidulo.

XIII.

(a) In Comment. in Aphor. Hippocrat. Descript.

Si tamen ingens ægri debilitas , animi defectio , & tiffimæ.
 hæmorrhagiæ continuatio fortiora adhuc requirat, tunc
 præter remedia externa, potiuncula adstringens, ad ce-
 lebris Sylvii modum parata, valentissima est, ut:

℞. Aq. burs. pastoris ℥ iij.

equiset.

plantagin. ā ℥ j.

cinam. cydon. ℥. j.

aceti destill. ℥ss. ad ℥. j.

corall. rubr. ppt.

lap. hæmatit. ā ℥ j.

syrup. granator. ℥. j. (vel myrt.
 vel corall.)

laud. opiat. gr. j. aut in fortior.

gr. ij. M.

e qua potiuncula quavis dimidia hora , donec hæ-
 morrhagia remittat , cochlearia duo vel tria exhibean-
 tur , continuato simul potu aquoso , acidulo . *Simulac-*
ro fluxus sanguinis remittit , ab ea aliisve adstringen-
 tibus rursus abstinendum , ne nimia adstrictio noxam
 ducat , & supra laudatis temperantibus & potu aquo-
 frigido negotium absolvendum est .

HELVETIUS cum MYNSICHTO *usum aluminis*
 l simplicis vel cum modica sanguinis draconis por-
 tione mixti , sæpius repetitum ad ℥j. vel ℥ss. tan-
 quam præstantissimum his in morbis desperatissimis
 specificum , una cum potu largo aquoso & cumprimis
cocti seminis lini , in peculiari de hæmorrhagiis libel-
 gallico , valde commendat , atque stupendos fere
 us effectus recenset . (a) Interea tamen cum hoc
 quam forti adstringente interne cautissime proceden-
 dum esse judico , ne graves noxæ inde subsequan-
 tur .

*Quid co-
hibita
hæmor-
rhagia
facien-
dum.*

Postquam hæmorrhagia fortior cohibita est, ægerque inde valde debilitatus, primo ab adstringentibus desistendum, atque iste roborantibus (vulgo cordialibus) sive analepticis temperatis refocillandus est : ut aquis in julepis cordialibus temperatis, emulsionibus gratis, ex amygdalis, pineis, pistaceis; vel lacte cum aqua rosarum mixto; vel jusculis carniū, præsertim pullo- rum aut gallinarum, succo citri vel limonum, vel aurantium acidorum, imprægnatis, itemque jusculis ex avena, hordeo & oryza paratis, ut & gelatinis ex pedibus vitulinis, C. C. aut ebore confectis; cerevisia item tenui tepida, cum vitello ovi in ea soluto, & similibus, quæ etiam aliquo modo noxas ab adstringentibus forte inductas, & acre atque austerum ipso- rum rursus corrigunt. His subinde haustulus vini, præsertim rubri, tenuioris, adstringentis, vel meri, vel aqua probe diluti, interponi potest, si æger illud desideraverit.

X V.

*Medica-
menta
externa.*

INTER EXTERNA REMEDIA (quæ adstringentibus internis, præsertim fortioribus, fere præmittenda, & si sufficiunt, quia in visceribus nihil mali concitant, præferenda sunt) conducunt 1. ligaturæ paullo fortiores, carpis & malleolis applicatæ. 2. lapis hæmatites magnus aut jaspis manibus vel sub axillis detentus. 3. frustum radic. iridis palustris vulgaris sub lingua detentum. 4. buso exsiccatus sub axillis aliquamdiu comprehensus. 5. pulvis sympatheticus Dighæi, cuius ℥j. vel ij. in ℥j. vel ij. aquæ calidæ solvuntur. sanguinis ægri aliquot guttulæ immittuntur, & super leni igne bacillo ligneo aliquamdiu agitantur.

X V I.

De Narium Hæmorrhagia.

*In na-
rium hæ-
morrha-
gia.*

Speciatim vero in Narium hæmorrhagia nimia, præter modo laudata egregium adhuc est remedium spiritus vini rectificatissimus, vel spiritus vini camphoratus naribus fortiter attractus; item solutio aluminis & vitrioli

rioli, vel seorsim vel commixti, in aqua, aut *pulve-*
is sympathetici in aqua plantaginis aut phlegmate vi-
rioli, simili modo usurpata, & cum turundis ex lina-
 mentis naribus immissa, vel & per siphonem injecta.
 Ita quoque *cucurbitulæ* fortiter trahentes, cruribus &
 femoribus sæpius admotæ, brevi sæpe revellendo, præ-
 sertim in sexu fœminino, sistunt has hæmorrhagias;
 atque in provectioribus *hirundines*, ano appositæ, præ-
 sertim si ægri jam antea hæmorrhoidibus laborarunt,
 vel re ipsa tunc congestiones circa intestinum rectum
 sentiunt, utilissimæ sunt.

Numus major argenteus, uncialis aut similis, frigide
 fronti alligatus, itemque *lintea*, *aqua frigida* vel *aceto*
imbuta cervici, vel etiam in viris *scroto* aliquoties *ap-*
plicata, cito quoque sæpius eas compescunt. Alii ejus-
 modi frigida cervici & quidem ægro incio atque ex
 improviso, affundunt.

Quidam vero *stercus suillum* recens naribus aliquam-
 tu admotum vehementer laudant; id quod vulgo con-
 cedi potest.

X V I I.

Præservationis gratia, ut jam supra N. IX. genera *Præser-*
 vatio dictum est, *Venæ sectio circa æquinoctia*, aut sæ-
 vatio
 vus in anno, præsertim in pede aut brachio, summe *hæmor-*
 hæmor-
 rhagia-
 rum.
 est necessaria. Deinde *dieta* utantur parca, & refrige-
 ante; vitando calefacientia, vinosa, spirituosæ, &
 quandoque bis terve in hebdomade ad fervorem san-
 guinis, si adest, temperandum, pulvis absorbens, ci-
 tratus, nitrosus, sive temperans noster, detur, pedilu-
 ium temperatum, tepidum subinde adhibeatur, &
 motus corporis frequens, sed *moderatus*, non omittatur.
 Nonnullis singulis mensibus idoneum *purgans* ex tem-
 perantibus §. IX. conducit. Verno vel æstivo tempore,
usus feri lactis vel *aquarum medicatarum temperata-*
rum, si per aliquot hebdomades cum idoneo regimine
 continuetur, quoque est egregius, præsertim si ventri-
 culus id commode ferre potest.

X V I I I.

In *hæmoptysi* moderata sufficiunt sæpe orgasmum *Hæmo-*
 temperantia: ut nitrum cum absorbente quodam ci-
 ptysis.
 trato & cinnabari, vel pulvis temperans noster, aut
 simi-

similis, quavis hora vel bihorio, donec cesset, exhibita, servata simul quiete & victu refrigerante. In *vehementiori* vero non solum sæpius hæc exhibenda, sed eis etiam *lene opiatum*, ut laudanum opiatum, vel mp. de cynoglossa, vel extractum papaver. errat. admisceatur; ubi & sem. hyoscyami albi, his cum fructu addi, vel pulvis stypticus *Heurnii* cum largo vehiculo aquoso exhiberi potest; æl & mr. tonica ad gutt. 30. vel 40. In *vehementissima* vero *potio Sylviæ adstringens*, §. XIII. itemque species de hyacintho cum laudatis modo opiatis mixtæ sæpius adhibendæ, donec remittat; ubi & *pulvis sympatheticus Digbæi*, modo §. XV. descripto, externe adhibitus, præsentaneam subinde opem fert. Ita & *Venæ sectio* in malo graviore revellendi fine utilissima est, præsertim in pede; vel hujus loco *cucurbitulæ furis*, & femoribus adhibita, præsertim in sexu feminino, aut hæmorrhoidibus obstructis laborantibus. *Alvus interea*, nisi sponte sit aperta, *victu emolliente* ex prunis, cerasis & pomis una cum passulis coctis, vel *clysteribus emollientibus* & refrigerantibus, vel & lenibus laxantibus *semper aperta servetur*. Simulac vero hæmoptysis remittat, ab adstringentibus & opiatis quoque desistendum, atque temperantibus & emulsionibus, immo & *potu lactis puri*, aut aqua remixti, vel *aquæ frigida sirupo acido*, v. gr. granatorum imprægnatæ, vel *decocti seminis lini* §. XIII. continuandum, donec omnino cesset. Sed *postquam omnino remisit*, *partes læsæ* in pulmonibus *rursus sunt* consolidandæ, ne facile ulcus pulmonum sive phthisis subsequatur. Quem in finem bis in die *Essentia traumatica VVedelii*, vel mr. ex spiritu C. C. & tinctura tartari, una cum infusis herbarum & radicum pectoralium ac traumaticarum, quales sunt *species nostræ pectorales*, aut similes interpositis temperantibus conducunt.

X I X.

Præservatio hæmoptysis.

Præservatio eadem hic est, quæ in præcedenti §. IX & VII. proposita fuit, imprimis *sanguinis frequentis detractio* est instituenda, & deinde quoque, præsertim ubi hæmorrhoides jam adfuerunt, aut molimina eorum adsunt, *hirundines* ano subinde applicatæ sunt

uti-

utilissimæ . Ita & usus *seri lactis* , vel *lactis ebutyrati* , vel *aquar. felterensium* cum lacte hic est egregius . *Balsamica* vero vulgo hic adhiberi solita , ut *terebinthina* , *balsam. sulphuris* , *Peruvianus* , *Copaivæ* , & ex his parata , aliive similes , & præsertim *aloetica ac myrrhata* , atque hinc etiam ipsæ *pilulæ balsamicæ* *Beccheri* , *Stahlii* , aliæque similes , hic vitanda esse censeo ; quia sanguinem commovent , cujus motus potius emperandus . *Corticem peruvianum* cum pulvere absorbente *Vvedelii* , partibus æqualibus remixtum , in hoc morbo , tam curandi , quam præservandi gratia , valentissimum ac certissimum suæque experientia sæpius confirmatum esse remedium , hoc ipso , quo hæc scripto , die , per litteras me certiore fecit doctiss. D. VAGNERUS , Lubecensis .

X X.

De Vomitu & Mictu cruento .

Vomitus cruentus eandem fere curandi rationem requirit : inprimis vero MICHELOTUS (a) , omni-
us frustra exhibitis , potum largum aquæ frigidaë ,
acco granatorum imprægnatæ , utilissimum depre-
endit . Post paroxysmum vero mox lene laxans ex-
nabarbaro & præsertim ejus decocto vel essentia exhi-
eatur , ad effusum in ventriculo sanguinem evacuan-
um : quod post unum alterumve diem repeten-
um . Deinde *herbæ millefolii* aut *arnicæ* usus hic
egregius est , sive in essentia sive in infuso tenui
emperato , loco theæ , sive utroque modo adhibeatur :
qui tamen non sit nimis frequens aut nimis diu con-
tinuatus .

*Vomitus
& mi-
ctus
cruen-
tus .*

XXI.

(a) In Act. Acad. Nat. Curiosor.

X X I.

De Mictu cruento.

Mictus cruentus eadem fere ratione & curatur & præservatur, sicut generatim §. IX. & seqq. docuimus. *venæ sectio* vero hic semper in brachio, *revulsioni* gratia, est instituenda.

X X I I.

De Hæmorrhoidibus, Lochiis & Mensibus nimis.

Hæmorrhoides *Hæmorrhoides nimie*, *mensēs & lochia nimia* eodem modo tractanda, ut §. XI. XII. XIII. & XVIII. dictum: ubi & cum primis *usus moderatus infusi millefolii* præstantissimus est. Speciatim vero *in mensibus nimis*, cucurbitula magna sub mammis applicata a HIPPOCRATE *revulsioni* causa haud sine ratione commendatur; sed verecundiores hoc non facile admittunt. Si vero hæc profluvia moderate fluunt, ita ut vel non, vel solum parum debilitent, non indigent medicamento, sed solum diæta temperata & quiete ita a multis morbis præservant & liberant. Sed quando a Medico hic aliquid agendum requiritur, præsertim si paullo fortius fluant, præter orgasmum temperantia interdum usurpata, versus noctem quandoque *leone opiatum* simul exhibeatur. Stahliani dosin pilularum polychrestarum Beccheri aut Stahliani, aliarumve similium, per aliquot dies quotidie assumendam, donec remittat, valde commendant. Quæ vero, quia expelluntur lentibus, hic valde suspectis, ut supra §. X. dictum est, constant; exhibere hætenus nolui, quia sistentia non pellentia satis idonea & tuta prostant, quam plurima, quæ propterea, tanquam magis secunda illis præferenda esse censeo.

Monita Practica.

1. Ubicumque hi ægri jam nimis debiles, ab opia-
um largiori usu est abstinendum, & potius roboran-
bus temperatis, emulsionibus, gelatinis, lacte ebuty-
to, ac similibus utendum: alias debiliores fiunt, in
eliria & mortem prolabuntur.

2. Lintea, quæ a nonnullis ad hæmorrhagias, præ-
sertim narium, sistendas, aqua frigida vel aceto imbuta
capiti imponuntur, summe noxia sunt deprehensa: nam
tamvis ob frigus fluxus hos sæpe compescant; tamen
eandem causam facile hepatis inflammationem, ob-
structionem vel scirrhum producunt, vel ipsam etiam
dropem.

3. Hæmoptysi vel vomitu cruento laborantibus, nisi
aliquid urgeat, emetica non sunt exhibenda.

4. Adstringentibus, præsertim in hæmorrhoidum, men-
strui & lochiorum nimio fluxu, numquam vel certe
non facile abutendum: nam observatum est, etiam
millefolii aliorumque mitiorum adstringentium largio-
nem usum facile illos fluxus, magno cum periculo
iri sæpe penitus suppressere, quos moderari tantum
convenit.

5. In declinatione hæmorrhagiæ cujuscunque nimie
medicamenta roborantia & lenissime adstringentia, ut
mixtura roborans ex spiritu C.C. & Tinctura tartari,
vel Tinctura antimonii tartarifata, bis terve in die ad
℥. XXX. ad XL. ordinanda; vel Tinctura martis cy-
natiata, aut Tinctura vitrioli martis Zvvoelferi, ad
num partium debiliū rursus roborandum egregia
sunt: ubi & infusa herbarum traumaticarum, ut vero-
ræ, bellidis, agrimonix, alchimillæ, millefolii, vir-
gauræ, faniculæ, pyrolæ, pilosellæ, plantaginis,
&c. ad modum Theæ modice usurpata, subinde inter-
mittenda. Deinde postquam ægri rursus paulo robustiores
facti, lene laxans, ut potio laxans temperata; vel pul-
vis rhabarbari, cum paucis nitro, vel cremore tartari;
vel decoct. rhabarbari; vel Sal catharticum Anglic.
vel Seidllicense, apta quantitate ex aqua simplici aut
lactis vel ex aqua medicata idonea exhibendum.

6. Qui

6. *Qui nimis hæmorrhagiis valde debilitati sunt, lectione multa diu abstineant, & a luce splendida sibi caveant; quia alias visus inde vehementer læditur, & facile quoque vertigo concitatur.*

7. *Sanguinis missiones extra paroxysmum ad præcavendam sanguinis profluvia spontanea, certis temporibus institutæ, plus præstant, quam in paroxysmo, ad eas curandas, celebratæ: adeoque statò tempore, bis, tertio, quaterve in anno, pro ægri diversitate, præservandæ sine valentissimæ sunt.*

8. *Qui hæmorrhagiis obnoxii, vitent calefacientia vinum, spiritum vini, aromata, aloen, myrrha, & ex his parata; iram, venerem nimiam, saltationes & motus quoscumque vehementiores; sed temperantiæ & moderationi studeant in omnibus suis actionibus, ita immunes ab his malis se reddere possunt.*

C A P U T I X.

De Hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis suppressis.

I.

Causæ. **L**icet hæmorrhagiæ multa sæpe incommoda & periculosa inferant; plura tamen eaque longe graviora, immo & frequentiora inferre solent eadem suppressæ, sive suppressio hæc fiat sponte, a causâ quadam interna, ut a nimia spissitudine sanguinis; sive ab adstringentium, in curatione hæmorrhagiarum adhibitorum, perverso usu, sive a refrigeratione, potu frigido, victu crasso, vel obstipante, animi affectibus aliave ex causâ.

I I.

Symptomata. Inter hæmorrhagias vero, quas hic suppressas vocamus, considerari merentur hæmorrhagiæ narium, mensuræ, lochiorum & hæmorrhoidum suppressio: unde minimis generis gravissima symptomata ac morbi oriri solent. Et quidem speciatim ab hæmorrhagia narium suppressa, gravia mala vel in capite oriuntur, ut dolor capiti-

capitis, morbi oculorum, aurium, dentium, inflammationes faucium, tonsillarum, uvulae, erysipelas faciei, catarrhis externi, Phrenitis, &c. vel in thorace, ut palpitationis cordis, anxietates praecordiorum, respiratio difficilis, haemoptysis, pleuritis, peripneumonia, pthisis, & febres intermitteutes variae. A suppressione mensium, spasmi & dolores in ventre, atque speciatim in ventriculo, intestinis, hepate, liene, item dolores capitis, spasmi, pressio & angustia praecordiorum, respiratio difficilis, nausea, vomitus simplex & cruentus, haemoptysis, haemorrhagia nasalis, gravitas artuum, lassitudo, cachexia, chlorosis, oedemata, hydrops, affectus spasmodici & convulsivi, hysterois ita dicta hysterica, sive uterina, epilepsia uterina, animi deliquia hysterica, ulcera pedum, articulorum dolores & morbi arthritici, haemorrhoides, mictus cruentus, morbi que alii. A lochiorum suppressione angustiae praecordiorum, capitis dolores, fastidium ciborum, vigiliae, febres acutae praesertim purpuratae aut miliares, delirium, convulsiones, inflammatio pleurae, uteri, aliarumque partium. Haemorrhoidum suppressionem sequuntur omnia ea symptomata, quae a mensium suppressione prius modo diximus, & speciatim quoque saepe inter alia praesertim niger, apoplexia, malum hypocondriacum, melancholia, mania, vomitus cruentus, arthritidis, podagra, ischiaticum malum, nephritis, mictus cruentus, renum exulceratio, calculus, & omnium frequentissime asthma, oedema atque hydrops. Reliquae haemorrhagiae suppressae eadem fere symptomata producant.

III.

Quo diutius haec suppressiones durarunt, eo pejora eruntque inducunt symptomata, atque eo difficilior erit esse curatio: praesertim si aliae sanguinis idoneae evacuationes, sive naturales, sive artificiales, non subducantur. Facilius tamen fluxus mensium suppressus, quam reliqui, restituitur. Ab omnibus vero his fluxibus suppressis praeter jam §. 2. indicata mala, haud raro mors subitanea producit.

Prognosis.

IV.

In CURATIONE, pro diversitate fluxus suppressi, alia ratione procedendum est: interea tamen in qua suppressa haemorrhagia respiciendum ad qualitatem, se generalis.

Curatio haemorrhagiae

suppressae generalis.

crasin five dispositionem sanguinis : qui, *si nimis sero-*
sus, pituitosus vel frigidus, conducit per octiduum cir-
 citer aut diutius quotidie alvum blande movere, vel
 pilulis aloeticis, Francofurtensibus, Immanuelis, Bec-
 cherianis, Stahlianis, aliisve similibus balsamicis; ve
 vino medicato, & simul bis in die circa meridiem &
 circa vesperam Essentia quadam attenuante ac robo-
 rante, ut gentianæ, trifolii fibrini, corticis aurantio-
 rum, rad. pimpinellæ, lignorum, vel alexipharmacæ
 Stahlii, aut diaphoretica nostra, aliave simili ad gut-
 tas XXXX. ad LX. uti.

V.

Si a Si suppressio a *sanguine nimis spisso* oriatur, prædi-
spisso ctis modo medicamentis infusa aquea ex herbis ape-
sangu- rientibus atque attenuantibus optimo cum fructu a-
ne. modum Theæ interponuntur : ut *infusum rosmarini*, sal-
 viæ, capilli veneris, melissæ, veronicæ, betonicæ
 theæ, cum cortic. citri vel aurantiorum, &c. quibus
 jungendus *motus frequens* sufficiens, ipsa *saltatio*, *ve-*
num ad hilaritatem usque, sed non ad ebrietatem, po-
 tum, & diætâ conveniens modica atque attenuans.

V I.

Si calor Sin vero cum suppressione adsit simul sanguinis motus
p.n.jun- nimius ac calor p. n. sive *orgasmus*, post evacuatione
ctus. alvi lenes, hic nitrosis & absorbentibus citratis sæpè
 laudatis est temperandus, & postea eo mitigato mixtu-
 ra ex spiritu C. C. & Tinctura tartari subjungenda
 atque simul diætâ moderata, temperans, cum motu
 frequenti, observanda.

V I I.

De hæmorrhagia narium suppressa.

Externe nares herba mari Syriaci, vel millefolii a
 hæmorrhagiam stimulantæ; vel in ipsis naribus, a
 morem Ægyptiorum, scarificatione sanguis proliciendus
 Atque vel eadem etiam methodus adhibenda in eis
 qui quidem nunquam vel raro hæmorrhagia narium l-
 borarunt, symptomata tamen antea recensita, quæ a n-
 rium hæmorrhagia suppressa alias proveniunt, patiuntur
 oriuntur.

oriuntur enim hæc a congestionibus sanguinis circa caput, sive ab ita dictis moliminibus hæmorrhagiæ narium, sive ab impedita hac hæmorrhagia & plethora, quando abundans & circa caput congestus sanguis ob vasa nasi interna indurata, vel robustiora, vel quamcumque etiam aliam causam exitum invenire & vasa narium aperire aut perrumpere nequit.

V I I I.

At si prædicta ratione suppressa narium hæmorrhagia revocari non potuit, & antea nominata mala non emittunt, vel saltem valde minuuntur, vel etiam illis remediis tam diu immorari nolumus, quia sæpe periculum in mora est, *promptiorem plerumque opem fert* *Sanguinis detrahtio per venas; quæ vero deinde ad mala inde metuenda verno minimum & autumnali tempore repetenda est: immo in nonnullis valde plethoricis, quos symptomata supradicta §. 2. valde affligunt, etiam ter quaterve in anno iteranda, vel etiam scarificationes subinde interponendæ; alias vel varii graves capitis morbi supra nominati, vel & pectoris, & quidem speciatim facile hæmoptysis & phthisis vel pleuritis aliæque inde oriunda mala, sequuntur.*

X.

De Mensibus suppressis.

In mensium suppressione I. humores viscerati sunt attenuandi, *infusis* aqua calida paratis, ex aptis vegetabilibus, ut rad. cichorii, pimpinellæ albæ, aristolochiæ rotundæ, ari, vincetox. graminis. 5. radicum aperientium, caryophyllatæ, herb. rosmarin. capill. veneris, marrubii albi, fumar. chamæd. meliss. veronic. heder. terrestr. hyssopi aut similium cum quibus bis in die *essentia quædam attenuans*, sanguineinque ad uterum determinans, ut Essent. rosmarini, aristolochiæ rotundæ, succini, tinctura tartari, vel antimonii tartarificæ, iusta dosi exhibeatur: quibus attenuandi fine *pulveres ex salibus mediis, digestivis vulgo dictis, vesperi jungantur, ut ex tartaro vitriolato, arcano duplicato, nitro antimoniato, sale absinthii, &c.*

Mensium suppressio. curatio.

vel *pilule balsamicæ* Beccherianæ aut Stahlianæ, aut aliæ similes, ex gummatibus & balsamicis uterinis (qualia sunt ammoniacum, sagapenum, galbanum, gummi hederæ, myrrha, aloë, opobalsamum, balsamum Copaivæ, terebinthina) & succis inspissatis sive extractis plantarum amararum ac balsamicarum, ut gentianæ, cardui benedicti, absinthii, centaury minoris, fumariæ, cochlear &c. paratæ: hisque aliquamdiu continuandum, donec menstruum alias consuetum tempus fere appropinquet.

X.

Tunc II.) sex vel octo dies ante consuetum menstruum tempus talia adhibenda sunt, quæ paullo fortius attenuant, atque excretionem menstruum promonent: qualia sunt: 1. *balnea* sive infusus, *pediluvia* ac *frictiones pedum* quotidie aut alternis tunc diebus usurpanda. 2. *Vina medicata* per epicrasin purgantia, ex supra §. IX. indicatis radicibus & herbis, additis foliis sennæ, radic. rhabarb. & fibris hellebori nigri, cum sale tartari, vel tartaro vitriolato, mane usurpata: quibus humores pituitosi attenuantur, sanguisque ad uterum determinatur. 3. *Emmenagoga* sive specifica ita dicta menses pellentia: qualia sunt infusa ex fortioribus moventibus, ut ex pulegio, roremarino, sabina, adhatoda; florum rosmarini, cheiri, calendulæ &c. aqua, aut in frigidioribus vel pituitosis, *vino parata*, semelque aut bis in die usurpata. Præterea omnia ex myrrha, aloë, borace, succino, sabina & croco confecta: ut myrrha vel succinum in pulvere, sine, vel quod valentius, cum borace, apta dosi quotidie vino, præsertim calido, vel aqua pulegii, cheiri, liliorum convall. melissæ, aut cinamomi assumpta; troch. de myrrha, item Essent. myrrhæ, vel per se, vel cum Essentia succini, vel sabinæ, vel spiritu salis ammoniaci mixta; ita & Elixirium proprietatis vel per se, vel cum spiritu salis ammoniaci, Essent. croci, *pilule bæ balsamicæ* antea laudatæ, & ultimis diebus paullo largiori dosi exhibitæ. Nonnulli *olea destillata* pellentia, quæ vehementia immo fortissima sunt, commendant: ut oleum destillatum succini, sabinæ, rosmarini, cinamomi, &c. quia vero hæc nimis vehement-

menter exagitant & commovent sanguinem, præsertim majori dosi exhibita, hæc aliaque vehementiora pellentia vel non, vel saltem cautissime, parca dosi, & non antequam venæ sectio fuerit præmissa, atque aqueis sanguis probe dilutus, exhibeantur; alias ob nimiam vehementiam, calorem, inflammationes, hæmoptysin, vomitum aut mictum cruentum aliave mala inducunt.

X I.

Si vero tempus menstruorum incertum est, tunc medicamenti prioris classis, attenuantibus scilicet & leniter pellentibus §. IX. tam diu continuandum, donec prægræ dolores in abdomine, lumbis, & circa pubis vel uteri regionem percipiant, quo tempore medicamenta posterioris classis sive fortius pellentia, §. X. adhibenda. Sed si ejusmodi tormina, uti haud raro contingit, non sentiantur, in junioribus emmenagoga versus novilunium, in annosioribus versus plenilunium danda, juxta versiculum:

Luna vetus vetulas purgat; nova luna puellas.

Quando vero gravia symptomata, vel in capite, vel in thorace, vel abdomine, & inde metuenda pericula urgent, & que prædictis nihil effectum est, tunc etiam ad maxima mala, hæmoptysin verbi gratia, vomitum cruentum, & similia præcavenda, *Vena in pede secanda*; id modo ultimo triduo ante tempus menstruum consuevit, aut si hoc ignoratur, in annosioribus, luna descendente sive post plenilunium, in junioribus vero, post novilunium, sive luna crescente commodissime fit solet. Cavendum tamen, ne in puellis de graviditate suspectis, aliisque, ubi symptomata non valde urgent, præsertim etiam in puellis, junioribus, nimis cito aut facile administretur; quia sæpe deinde idem auxilium cum molestia earum repetere coguntur.

X I I.

In valde plethoricis tamen, aut ubi gravia quædam symptomata urgent, initium curationis fieri apte potest Venæ sectione, subjunctis postea prioris & posterioris ordinis medicamentis emmenagogis: qua quidem methodo plerumque citius curantur, verum facile potest nova obstructio repetitionem venæ sectionis exigere.

Interea tamen etiam sciendum, quod facta sanguinis missione, *solis sæpe pilulis Becherianis vel Stahlianis* aut similibus aloeticis ac myrrhatis scopus obtineri possit, si ultima hebdomade ante tempus menstruum vespere quotidie adhibeantur: quæ tanto certiorum effectum edunt, si una cum *pediluviiis* vel infusibus, infuso quodam emmenagogo, similique Essentia idonea ex §. IX. supra laudatis usurpantur: & si forte prima vice effectum quæsitum non præstant, subsequentibus mensibus, postquam semper per XIV. circiter dies a medicamentis abstinerunt, eodem tempore, eodemque modo repetantur, non neglecto motus corporis frequenti, pedum fricationibus, ac diætâ conveniente.

X I I I.

Menses nimis parce fluentes. Atque hac ipsa etiam methodo *menses nimis parce fluentes*, ut largius fluant, tractandi sunt, itemque *ea puellæ, in quibus juxta ætate menses nondum fluxere*, at tamen omnis generis molestias aut prava inde symptomata patiuntur; quibus etiam in casibus *aquæ medicatæ & cumprimis martiales*, ut pyrmontanæ, Egranæ, Sualbacenses, Spadanæ & similes egregium plerumque effectum præstant.

X I V.

Mala ex mensibus per ætatem cessantibus. Quibus mulieribus menses per ætatem cessant, & incommoda inde oriuntur, quæ alias a mensibus obstructis oriri solent, tunc minime pellentia eis sunt adhibenda; sed potius detractione sanguinis artificiali opus est: & si tales mulieres antea valde fuerint plethoricæ, & otiosæ sint, venæ sectio verno & autumnali tempore postea est instituenda; aut pro malorum vehementia sæpius, eaque deinde, ad seram usque senectutem, præsertim in pede reiteranda, *phlogosesque vagæ* sive ebullitiones sanguinis, quæ has mulieres ut plurimum vehementer afficere solent, usu frequentium pulverum temperantium, vel absorbentium, citratorum, nitri ac cinnabaris temperandæ sunt: in quem finem pulvis temperans noster egregius est; itemque *aquæ medicatæ*, præmissa sanguinis missione, legitimè usurpatæ.

In diætâ vitentur omnia, quæ difficulter digeruntur, cruda, crassa, farinacea, flatulenta, leguminosa, acida; adstringentia, obstipantia, & acida; *potus sit* & sufficiens, alvusque semper victu lubricante potu sufficiente, vel si hi non sufficiant, leni laxante, ut sale quodam amaro cathartico, aperta fertur. *Motus vero corporis frequens* in curatione omnium horum morborum, a suppressione mensium ortorum, maxime utilis est atque necessarius, moeror vero, tristitia ac terror vitandi.

X V I.

De Lochiis suppressis.

In SUPPRESSIONE LOCHIORUM potissimum *Suppressione lochiorum* conservandum est, utrum omnino suppressa, an solum diminuta sint. Si *tantum imminuta*, & febris non adsit, pellentia lenia, ut Essent. myrrhæ, succini, croci, scordii, vel seorsim, vel inter se mixta, parca dosi cum infuso Theæ, vel aliis similibus oleis calidis aliquoties in die exhibita profunt: vel deco horum Elixir. proprietatis Paracelsi; aut quæ ad hæc præstantiores a plerisque habentur, pilulæ balsamicæ Beccherianæ vel Stahlianæ, vesperi, ad grana xx. quotidie usurpatæ. *Sed si febris jam adest*, medicamenta temperantia, huic contraria, danda sunt. Si vero lochia penitus suppressa sunt; & quidem jam per aliquot dies, fere semper febris adest, adeoque non modo pellentia, præsertim fortiora, adhibentur: quia præterea periculosa vel producant, vel jam præsentem augmentant atque omnia deteriora reddunt, verum præstant tunc ad febrim potissimum respicere, & orgasnum sanguinis, præmissa venæ sectione in pede, præsertim plethoricis ac junioribus, pulveribus temperantibus, sorbentibus, citratis, nitrosis, & potiunculis diaforeticis, potuque aqueo, ut in febribus acutis, temperare, iisque, observato regimine diaphoretico, continuare, donec ægræ melius se habeant: ubi si luxus subinde redit, subinde vero non redit, &

ægræ tamen sæpius convalescunt; sed si venæ sectio in principio non est instituta, plerumque non amplius prodest. *Victus* insuper *puerperis hic conveniens*, sit tenuis & parcus; vitentur animi affectus, præsertim mœror, tristitia, terror, ira, temperatumque aeris regimen probe observetur: ubi vero notandum, quod moderatus vini generosi haustus subinde datus, præsertim in assuetis, si illud appetant, & calor non nimis vehemens sit, hic non noceat, sed sæpe multum ad fluxus hujus restitutionem faciat: qui ubi rediit, quiete, tenui victu, moderamine animi, leni pellente, & apto regimine conservandus.

X V I I.

De Hemorrhoidibus suppressis.

Hæmorrhoidum suppressio.

HÆMORRHOIDUM SUPPRESSIO requirit primo sanguinis imminutionem *per Venæ sectionem* in pede, soluta prius alvo, si obstructa est, vel per clysterem ex decocto veronicæ aut chamomillæ in lacte, vel leni quodam laxante. Deinde, facta Venæ sectione sanguinis qualitas vitiosa est corrigenda: & quidem si orgasmus sive æstus percipitur in ægro, absorbentia citrata, nitrosa cum cinnabarinis mixta, inprimis pulvis temperans noster, & lenia acidula ipsi opponantur. Sin vero ob sanguinem viscidum suppressæ, eadem, quæ in mensibus suppressis N. IX. hujus capitis ad sanguinem digerendum atque attenuandum commendata sunt, hic quoque usurpanda. Denique vero, *postquam humores correcti sunt*, opera danda, ut lenibus stimulantibus sive pellentibus fluxus revocetur; ubi primo interne omnia eadem profunt, quæ ad menses pellendos supra §. 8. & 9. laudavimus: & speciatim omnia medicamenta ex aloe, myrrha, croco, & helleboro nigro parata, ut Essentiæ eorum, Elixir. proprietatis, Essentia succini, pilulæ Francosurtenses, Immanuelis, Beccherianæ & Strahljanæ & similes; item succinum cum borace, & vina medicata laxantia; quibus vero, si æstus percipiatur, temperantia subinde, præsertim vesperi, sunt interponenda.

X V I I I.

Externe conducunt *suppositoria* ex aloe & myrrha, *Externe*
& enemata acriora, fricationes ani frequentes pan- *quid fa-*
s asperis, vel foliis ficus; pediluvia & infessus sæpe *ciendum.*
hibiti, ac denique, his omnibus irritis, aut ubi pe-
culum in mora, *hirundines* ano applicatæ, utpote hic
am efficacissimæ.

Motus corporis, præsertim equitatio, aut vectio in
rru, *vinum* etiam generosum paulo largius subinde
tantum, ad hunc fluxum restituendum magnæ quo-
e sunt virtutis. E contrario ab *abuso pellentium*
tiorum internorum, præsertim ubi obstructio ab ad-
ngentibus orta est, sedulo cavendum, ne sangui-
m nimis commovendo graviora mala excitent: quem-
modum in mensium obstructione quoque jam indica-
nus.

Fluxu autem restituto, sibi que aliquamdiu relicto,
libenda sunt lenia roborantia, ut tincturæ martia-
variæ, cydoniata, scilicet pomata, Ludovici,
voelferi, &c. vel Mixtura roborans ex spiritu C.C.
tinctura tartari, vel Essent. millefolii, ejusque in-
im modice postea aliquamdiu usurpata egregie con-
unt.

X I X.

in illis, ubi *hæmorrhoides* numquam fluxerunt & ta- *Si hæ-*
symptomata adsunt *hæmorrhoidum* metuendarum, si *morrhoi-*
molimina, ut vocant *hæmorrhoidum*, ut *hæmorrhoi-* *des nū-*
ccæ, dolores ani & circa os sacrum, eæ, meo quam
lem judicio, non facile promovendæ aut excitan- *fluxerūt.*
, ut multi volunt, nisi graves forte causæ id exi-
t: quia postea, præter morbi spurcitiam & mo-
am, ab earum fortuita obstructione, innumera
e mala oriuntur. Quapropter in leviori adhuc
præstat agro prius, præmissa Venæ sectione in
bio, laboriosum frequentemque *corporis motum* cum
a parca, tenui, ac refrigerante, sedulo commenda-
ita sæpe illa symptomata transeunt. Vel si his uti
, aut ob vitæ genus non possit, aut etiam hæc
sufficere videantur, vel malum jam sit gravius,
o frequens *usus pulverum temperantium*, ac deinde
uinis missio adhibenda: quæ deinceps subinde; præ-
fer-

fertim circa æquinoctia, aut si opus est, sæpius, præsertim in brachio est iteranda; vel etiam in quibusdam scarificationes illarum loco substituendæ aut interponendæ sunt; ita enim, plethora atque ebullitione sanguinis imminutis, & hæmorrhoides præcaveri, & symptomata inde oriunda minori molestia ac periculo curari possunt, cum primis si moderatam & convenientem victus rationem æger simul probe observet.

Monita Practica.

1. In omnibus hæmorrhagiis obstructis, præsertim mensibus ac hæmorrhoidibus, prudenti Medico, ad fortissima pellentia non facile progrediendum, & inprimis: majori ipsorum dosi abstinendum: quia ob vehementiam, quæ insigni acrimonia & calore consistere videtur, facile nimium sanguinis motum, æstum, inflammationes, hæmoptyses, vomitum aut mictum cruentum inducunt, immo subinde ipsam apoplexiam.

2. Hinc si fluxus moderatis pellentibus restitui non possunt, præstat sæpius, præsertim in tenerioribus, a curatione abstinere, & naturam sibi aliquamdiu, præsertim si nihil urgeat, relinquere, quam intempestivæ pellentium fortiorum abusu ægris noxam inferre. Observandum enim est salutare illud axioma medicum:

Si prodesse non possis, cave, ne noceas.

3. Si in lochiis suppressis fortiora pellentia adhibentur febres periculosissimas acutas, & inprimis miliarem fixam purpuratam, puerperis sæpe ac facile concitare solent unde pleræque pereunt.

4. Sanguinis tamen detractiones in hæmorrhagiis quibuscumque suppressis, præsertim pertinacioribus, aut ubi periculum inde metuendum, præstantissima & sæpe maxime necessaria sunt remedia, fortioribusque pellentibus longe præferenda: atque si malum non omnino tollunt, levius tamen ac tolerabilius illud ut plurimum reddunt, ut postea aliis idoneis remediis tanto facilius curentur.

CAPUT X.

De Congestionibus, & Doloribus.

I.

I Orbi, qui congestiones dicuntur, sunt morbi, in quibus sanguis, vel serum in certis partibus *conge-*
arum imbecillitatem, vel ob humorum in corpore *stiones*
dantiam, vel ob ejus crassitudinem, vel propter va-
has causas simul, copiosius, quam par est, sensim
 eritur sive accumulatur, dum minus refluit, quam
 it: ut inde molestiæ, tensiones, spasmi, tumores
 dolores in his partibus concitentur, eique sæpe ve-
 entissimi, qui pro varietate partium varios morbos
 ucunt. Quando vero partium tonus sive earum
 motrix nondum nimis destructus est, a congestis
 oribus irritantur, ob fabricam suam elasticam ar-
 osissimam renituntur, spasmodice constringuntur,
 e hoc mirabili artificio eos propellere vel ejicere
 ntur, idque vel per sanguineam vel serosam quan-
 excretionem. Quod ubi a natura obtinetur, ma-
 plerumque cessat, vel saltem minuitur; sed si ob
 cumque impedimenta hæc ejiciendi molimina non
 edunt, fibræ partium nervæ nimis tensæ, dolores,
 mos, ita dictos catarrhos, sæpe etiam tumores, &
 is generis affectus dolorificos, arthriticosque pro-
 ant; qui vero sæpius tandem in partium debilita-
 & quandoque nervorum resolutiones sive paralyti-
 affectus desinunt, nisi in tempore curentur (a).

I I.

Differunt vero congestiones vel i. *ratione loci*; mo- *Differen-*
 enim fiunt *in capite*, unde dolores & gravitates ca- *tiæ.*
 pitis,

a) *Stahliani* hæc omnia prudenti animæ directioni
 tribunt; quam vero probare nequeunt; melius au-
 ex mechanicis rationibus explicari potest.

pititis, dolores & inflammationes oculorum, aurium dentium, faucium, vertigo, morbi soporosi & apoplectici, &c. proveniunt; modo in *thorace*, unde angustia præcordiorum, difficilis respiratio, palpitatio cordis, hæmoptysis; modo in *collo*; modo in *abdomine* ut in hepate, liene, (unde congestiones, inflammationes & abscessus in his partibus, itemque malum hypochondriacum & hystericum) renibus, vasis venæ portæ, & præcipue vasis hæmorrhoidalibus, unde hæmorrhoides cæcæ & dolentes, dolores lumborum, malum ischiaticum, & in mulieribus malum hystericum; modo in *artubus*, unde arthritici dolores, rheumatismi, podagra, chiragra & gonagra, atque œdemata pedum &c. proveniunt.

Vel 2. differunt *ratione ætatis*: in junioribus enim, experientia teste, congestiones ut plurimum contingunt in *capite*, ubi sanguis noxius ob agilitatem partiumque vigorem superiora petit per nares exitum querere & hæmorrhagiam narium intendere videtur: unde facile in his oriuntur *cephalalgia*, *coryza*, *ophthalmia*, *odontalgia*, *otalgia*, aliaque aurium vitia, ut & faucium tumores, nisi fluxus sanguinis per nares eos ab his malis præservet. In *ætate media* pectus præcipue afficiunt, & evacuationem sanguinis in pulmonibus querunt; qui si ob causam quamcumque exitum non invenit, *tussim*, *dyspnœam*, *asthamata*, *pleuritidem*, *vomicam*, aut *phthisin* producit; in *senioribus* vero congestiones in *abdomine* & *articulis* maxime contingunt, ubi sanguis nimius exitum per intestinum rectum vel vias urinæ affectat, & hæmorrhoidum fluxum vel mictum cruentum molitur, unde affectus catarrhales, vulgo *catarrhi frigidi dicti in lumbis* & *coxis*, *podagra*, *arthritidis*, *rheumatismus*, *lumbago*, *ischiaticum*, *hypochondriacum*, *hæmorrhoidale*, & in *feminino sexu hystericum malum*, &c. ortum sæpe ducunt.

I I I.

Causa. Causa earum ut plurimum est *abundantia sanguinis aut feri*, sive *plethora*, hujusque causæ omnes, ut *dieta lauta*, *vita otiosa*, evacuationes naturales sanguinis suppressæ, aut artificiales neglectæ, refrigeratio & trans-

transpiratio suppressa, itemque animi affectus vehementiores, & cumprimis quoque partis læsæ debilitas.

V I.

Congestionibus sæpe succedunt obstructions, perfectæ stagnationes, dolores, inflammationes, suppuratio- *Prognosis.*
nes, abscessus, œdemata, corruptionesque plurimæ, unde pro partis varietate varia & quamplurima in quavis parte mala proveniunt, & quando inveteratæ sunt, ob tonum partium a digestionē diuturna læsum, difficulter sæpe curantur, aut tamen levi de causa revertuntur. Si regimine & medicamentis calidioribus, aut opiatis sive narcoticis, præsertim præmarare, tractantur, periculosissimos sæpe morbos induunt. *Congestiones pectoris & capitis* reliquis ut plurimum *sunt periculosiores*: quia illæ facile hæmoptyn, peripneumoniam, vomitam, phthisin, inflammationem, asthina, catarrhum suffocativum, aut suffocationem; hæ autem haud raro apoplexiam & paralyfin insuumque morbos inferunt. Sic & eæ, quæ ætate congrua contingunt, perquam mali quoque solent es-
moris.

V.

Quod ad curationem attinet, distinguendum erit *tem- Curatio*
poris *paroxysmi*, sive quando ægri ipsis his morbis corre- *genera-*
ti sunt, & tempus, quo ab his morbis liberi sunt, at- *lis.*
que de præservatione eorum cogitant, quia ob partes debilitatas facile eisdem morbis rursus corripiuntur, atque sic sæpe inde ægrotant. Igitur in *paroxysmo* horum morborum generatim conducunt ea, quæ congestum se-
rum & sanguinem partim a loco affecto abducunt & evellunt, partim resolvunt atque in naturalem motum redigunt: qualia sunt, i. in plethoricis & calidioribus sanguinis missio: quæ vero in frigidioribus aut rosis in paroxysmo sæpe plus nocet, quam prodest. quæ alvum leniter ducunt, quemadmodum *blanda laxantia*: sicuti sunt pilulæ tartaræ, pilulæ franco-
rtenfes, balsamicæ, Beccheri, Stahlî, aliæve si-
miles, vel de succino Cratonis: quæ in robustiori-
bus aliquot granis resinæ jalapæ, diagrydii, aut extr.
ellebori nigri, acui possunt; aut potiunculæ vel
pulveres laxantes, &c. vel horum loco quandoque
cly-

clysteres emollientes substitui possunt. 3. *pulveres diaphoretici*, ex absorbentibus citratis, salibus mediis cinabarinis, nitrosis & antimoniatiss, sæpius per dies exhibiti; quibus *ubi dolores sunt vehementiores*, aut persistentiores, & prædicta non sufficiunt, nocturno tempore, anodyna, moderata dosi, ut laudanum opiatum vel mp. de styrace vel de cynoglossio itemque emulsionem anodynæ jungenda sunt.

4. *Essentiæ diaphoreticæ*, ut scordii, succini, pimpinellæ albæ, lignorum, helen. aristoloch. rot. Mixt. simplic. tinctura bezoard. matutino præsertim tempore lecto, cum infusis aqueis calidis, expectato deinde blando sudore, ac postea servato temperato victus regimine, interponendæ; nimis volatilia vero & calidiora fugienda.

V I.

Præservatio generalis.

Extra paroxysmum præservationis gratia *Venæ sectiones* circa æquinoctia, vel sæpius adhuc in valde sanguineis institutæ & postea constanter repetitæ, itemque in nonnullis *scarificationes* certis temporibus interjectæ, maximi sunt usus, quibus vero *laxantia* leniora vel præmittantur, vel subjungantur: ut sunt vina medicata, aut infusa laxantia, aut pilulæ leniores quæcumque modo §. V. & alias jam sæpius indicatæ, vel & salia amara cathartica, aut aquæ medicatæ leniores purgantes. In paroxysmo vero, ut supra jam dictum est, sanguinis missiones, nisi in valde sanguineis & calidis, aut ubi alia peculiaris ratio eas urgeat, hæc facile adhibendæ.

Victus denique ratio in his morbis *magnæ est utilitatis*, potissimum vero opus est, ut ægri hi *parce edant*, a nimia satietate sibi caveant, impigri sint ad motum, affectus animi moderentur, & sufficienti potui tantum utantur; a crasso vero ac spirituosissimo & præsertim nimia ejus copia sibi caveant. Vitent quoque *medicamenta calidiora* & volatilia, regimenque nimis calidum aut valde coactum; corpus tamen contra frigus probe semper muniant; & in statu temperato conservent, ne transpiratio facile lædatur; nam frigus eis plurimum est noxium.

Fricationes corporis, præsertim pedum, itemque perfrictio

dilu-

Pediluvia temperata subinde adhibita, in his affectibus magnæ quoque sunt utilitatis. Ita vero *tristitia*, *mæror*, *intemperantia* in victu ac venere, *desidia*, *nimiæ curæ* ac *solicitudines*, itemque *studia nimia*, præsertim *severiora*, aut diutius *protracta* fugiantur.

V I I.

De Capitis dolore.

Speciatim vero jam considerabimus, quid in præcipuis congestionum ac dolorum speciebus, præter methodum generalem, agendum sit, incipiendo a capite, ubi **CEPHALALGIA** primum occurrit, utpotè quæ sæpissime a congestione sanguinis in cerebro oritur, & sæpe cum tinnitu aurium vel gravitatis sensu, quandoque cum vertigine aliisque malis conjuncta est.

Cephalalgia.

V I I I.

In curatione ejus præ omnibus alvus, si adstricta sit, conveniente evacuante, quale ex N. V. vel VI. peti potest, solvatur: postea laudati pulveres, essentia & infusa diaphoretica ac resolventia N. V. proposita eodem methodo adhibeantur. Externe spiritus vini camphoratus, crocatus fronti calide applicatus, vel temporibus & vertici largiter illitus, hosce dolores brevi subinde, maxime si interna præmissa sunt, digerit & discutit.

Ejus curationis.

I X.

In aliis, præsertim qui *calidioris sunt temperamenti*, egregie sæpe prodest unguentum alabastrinum temporibus illitum. *Pediluvia* quoque temperata & frictiones pedum revellendi & resolvendi fine hic egregia sunt. *Menstrues*, vel *hæmorrhoides*, suppressi, convenientibus mediis capite præcedenti indicatis, revocandi erunt, ubi *Venæ Sectio* in pede ut plurimum valde egregia. *Parca dieta* & *frequens corporis motus* magis hic proficiunt tam præservandi quam curandi scopo, quam in aliis, quibus est magna medicamentorum farrago. *Salia volatilia*, spirituosissima suaveolentia sive fragrantia, & balsama cernua sive apopletica vulgo dicta, quæ naribus hic ad-

ad-

admoventi & a multis valde commendari solent, multum adversa sunt, caputque turbando sæpe plus nocent quam profunt, præsertim frequentius aut immoderatiùs adhibita. Idem de oleis destillatis, præsertim succini & similibus intelligendum. In plethoricis aut in iis, in quibus hæmorrhagiæ consuetæ suppressæ, si prædicta medicamenta parum sunt, sanguis mittatur, isque in lava ga satis copia, ac præsertim in pede; in junioribus vero sanguinis missio rarius est necessaria, neque etiam in his nimis cito instituenda; nisi magna eam requirat necessitas. Si cephalalgia ab hæmorrhoidibus suppressis oriatur, præter modo dicta, hirudines ano applicatæ, utilissimæ sunt.

X.

De Otalgia.

Otalgia
atque
aurium
affectus.

Otalgia, tinnitus aurium, & auditus difficilis eandem agnoscunt causam: (nisi forte ab externa læsione orta sint) hinc in Otalgia, quæ sæpe inflammationem habet comitem, interne eadem conveniunt evacuantiæ diaphoretica resolventia, diluentia, quæ in cephalalgia N. VIII. laudata sunt. Externe Spiritus vini camphoratus, præsertim crocatus, calide ad aliquot guttas cum gossypio auri imponatur, & post aures etiam illinatur qui in otalgia potentissime resolvit, atque sic metuendam suppurationem & ulcus auris sæpissime impedit. Vel Oleum amygdalarum amararum cum pauca camphora gossypio vel linteo carpto eodem modo adhibendum, super imposito in usu utriusque sacculo calido cum herbis resolventibus, ut rad. irid. Florent. herb. saviæ, pulegii, serpilli, origani, flor. chamomillæ, feniculi, carvi, fœniculi, cum camphora. In sanguineis etiam missio sanguinis ut plurimum necessaria est. Quando vero his congestio aut inflammatio resolvi nequit, & ad suppurationem spectat, cataplasma leniens & emolliens ex mica panis cum lacte & croco coctum, vel cepæ cineribus assatæ, aliave similia calide sæpius admoventur, donec sponte rumpatur; vel si abscessus oculis patet, scalpello aperiri queat. Pediluvia quoque & frictio-

ationes pedum hic etiam valde profunt. *Præservandi*
sine eadem, quæ in cephalalgia aliave quacumque con-
 gessione præservanda N. VI. hujus capitis laudavimus,
 hic quoque conducunt.

X I.

De Tinnitu & susurro aurium.

In Tinnitu & susurro aurium revellendi scopo primo
 alvus ducenda, deinde pulveres temperantes diaphore-
 tici, & Essentiæ resolventes, vulgo *anticatarrhales* di-
 ctæ, ut succini, lignor. rosmarini, diaphoretica, alexi-
 pharmaca, &c. aliquoties in die exhibeantur, eisque
 infusum Theæ, veronicæ vel betonicæ cum flor. rosma-
 rini, salviæ aut lavendulæ & lign. sassifr. interpona-
 tur: & quidem ita, ut matutino tempore & circa me-
 diem Essentiæ, circa vesperam vero & noctu pulve-
 res laudati interne usurpentur.

Tinni-
 tus au-
 rium.

EXTERNE Essent. succin. vel sola vel cum castor.
 um paucis guttis olei succini vel chamomillæ remix-
 ta, ad guttas j. vel ij. tepide cum gossypio mane &
 vesperi auri immittatur. Vel *ambra* & *moschus* vel
astoreum ad gr. j. vel ij. in gossypio, vel etiam solum
 balsamum Peruvianum; vel olea carminativa, ut ani-
 si, fœniculi, carvi aut chamomillæ, eodem modo usur-
 tata, multis egregie profunt: non neglectis *pediluviiis*
 & *fricationibus pedum ac capitis* frequentibus. Vapor
recocti florum lavendulæ vel rosmarini cum vino facti,
 auri per infundibulum admissus, multis etiam optime
 profuit. Quo pertinacior vero aut magis invetera-
 tus est hic affectus, eo magis ac potissimum in ple-
 thoricis V. S. præsertim in pede, interpositæ *scarifica-*
ones & repetita *purgantia* ad revellendum & utilia &
 necessaria sunt.

X I I.

De Auditu difficili.

In auditu difficili eadem fere curandi ratio optima
 est: speciatim vero, præter modo recensita valde hic
 N con-
 tus dif-
 ficilis.

conducit ℞. Sal vol. CC. ℥j. medull. castor. optim. gr. vi. ol. succin. gutt. ij. M. F. massa, de qua lentis aut pisi magnitudo cum gossypio mane & vesperi auri applicetur. Vel

℞. Ess. succin. ʒj.

castor. ℥j.

ol. dis. chamomill. ℥ss.

succin. gutt. j. M. & cum gossypio

tepede bis vel ter quotidie adhibeatur.

Si a mensium fluxu suppresso, sicuti apud mulieres aut puellas sæpe contingit, hæc mala oriantur, debitis remediis ac diætâ hic restituendus & in ordine conservandus. Si ab hæmorrhoidibus suppressis, hæc revocandæ, vel hirundines ano applicandæ; vel Venæ sectiones ac scarificationes in horum locum substituendæ. Quando ab *obstructione meatus auditorii*, ea quæ obstruunt, idoneis instrumentis sunt auferenda (*a*). In *senibus*, quibus sæpe ob virium debilitatem auditus læditur, itemque in malo valde inveterato, vel con nato aut hæreditario, aut ubi externa læsio, ut tympanum ruptum morbum inducit, medicamentis ut plurimum nihil efficitur; interea tamen senibus ac debilibus roborantia, cephalica & ambrata pro capite & viribus roborandis hic sæpe conveniunt. Interdum tamen post multos annos auditum amissum sponte sine medicamentis & ex improvise nonnullis rediisse aliquoties expertus sum: adeoque non mox desperandum. *Sanguinis missiones, scarificationes & purgantia* subinde usurpata; atque ordinata ac moderata diætâ, vitando abusu vini aliorumque inebriantium, cum motu frequentati, itemque *aque medicatæ* æstivo tempore legitime haustæ, tam *ad præcavenda, quam ad sananda hæc aurium vitia* quam plurimum, immo sæpe plus conferunt, quam omnia quævis alia medicamenta, ut in me ipso sæpe edoctus sum, qui ultra viginti annos per intervalla his malis conflictatus fui.

X I I I.

Odontalgia .

ODONTALGIA vel post dentis erosionem , per quam acria ex alimentis vel aer in cavum dentis irruunt, ejusque membranam internam & nervum afficiunt ; vel a congestione sanguinis circa dentium etiam sanorum radices & alveolos oritur. Illa vix constanter tollitur, nisi dens erosus sive vitiosus manu chirurgica, si tuto id fieri possit, evellatur, vel acidis mineralibus erodatur. Sopitur tamen quoque sæpe vel applicata provide guttula una vel altera aquæ fortis aut spiritus vitrioli in cavum dentis erosi, vel olei piperis, caryophyllorum, aut lini quaiaci, vel per se ope penicilli immissi, vel cum opio & camphora in forma pilulæ denti cavo intrusi, & subinde, si dolor non cedit, repetiti. Quandoque egregie prodest Essentia succini vel ligni quaiaci, vel nitri portiuncula denti immissa, præsertim si interna mox laudanda simul adhibeantur ; vel si hæc parum proficiant, tollitur sæpe apto ferro candente, denti cavo admoto : & ne malum facile redeat, cavum dentis cera, mastiche, plumbo vel turo, si fieri possit, apte repleatur, quo ingressus peregrinorum avertatur.

X I V.

Ubi vero dens non erosus, ibi ad sanguinis congestionem, tanquam causam primariam, resolvendam & orasum temperandum, pulveres temperantes, diaphoretici, antispasmodici, ex tartaro vitriolato, nitro & cinabari, ex aquis diaphoreticis, singula hora vel bihoro, exhibeantur, corpus ab aere & frigore præservetur, atque infusum Theæ cum ligno sassafras vel quacumque sæpius sorbilletur, sic intra aliquot horas hos dolores sæpe superavi. Interea tamen simul decoctum florem chamomill. cum lacte paratum calide subinde in ore detineatur, & sacculi ex herbis solventibus, præsertim chamomilla, cum vel sine camphora, genis imponantur. In valde plethoricis, aut ubi consuetæ sanguinis evacuationes neglectæ vel suppressæ, sanguinis

missio egregie prodest. Præter antea laudata, *sal anglicanum* vel *catharticum amarum* in ore detentum & sensim liquefactum congestiones has sæpe solvere & dolores hos quoque haud raro sedare solet. Nonnullos ab hoc dolore liberat, si dentes *ligni frustulo*, *fulmine tacti*, vel *e cœmiterio deprompti aliquamdiu fricent*, & cumprimis donec gingivæ aliquid sanguinis fundunt, &c. Si his non cedat, id quod tamen plerumque fieri solet, versus noctem lenia opiata prædictis pulveribus antispasmodicis admisceantur: mane vero, revulsionis gratia, *idoneum purgans* exhibeatur, & postea *Essentia succini* cum *Essentia pimpinellæ* remixta, pulveribus illis interponatur. *Genæ doleanti exterius* & *spiritus vini camphoratus* cum fructu tepide applicatur, præsertim si deinde prædictus sacculus ex floribus chamomillæ, vel ex farina & camphora calide superimponatur. *Ustia antitrangi auris*, sæpius, ut varii auctores testantur, pertinaciorē odontalgiam subito sustulit, id quod tamen non semper præstat; itemque *Vesicatorium* vel ex cantharidibus vel rasura radicis armoraciæ flexuræ cubiti in latere affecto applicatum. *Alvus* in hoc morbo semper aperta, quantum fieri potest, servetur, & non facile dens integer, ob varia inde metuenda mala evellatur. In declinatione parum tincturæ odontalgicæ *Mynsichti*, *VVedelii*, *Laccæ* vel *Essent. ligni quaiaci* ore subinde detentum egregie prodest dissipando, gingivamque laxam roborando, ne tam facile redeat.

X V.

De Vertigine.

Vertigo. VERTIGO sæpe a congestionē sanguinis in capite apud plethoricos oritur, vel apud eos, qui evacuationē sanguinis artificiales consuetas omiserunt, vel in quibus consuetæ sanguinis evacuationes spontaneæ substitunt, vel & in eis, qui multis studiis caput valde debilitarunt, haud raro tamen etiam a cruditatibus, a pravis humoribus, præsertim biliosis, ab ira prægressa aliave de causâ in ventriculo hærentibus. Si a priorē causâ, evacuantia, laxantia, Venæ sectio in pede

pedi-

pediluvia, pulvorefque resolventes, temperantes, cinnabarini, nitrosi, una cum infuso herbæ Theæ vel Betonicæ, curationem ut plurimum absolvunt. Sed si *suppressiones fluxus consueti sanguinis* in causâ, hi, si fieri potest, modo in capite IX. §. 4. & seq. proposito, restituendi sunt. Sin vero hoc fieri non possit, missiones sanguinis in loco eorum substituendæ. *Externe* Spiritus vini camphoratus vel solus, vel cum spiritu cornu cervi mixtus, vertici & temporibus sæpe illinatur; naribus vero aqua Reginæ Hungariæ vel Anhaltina, vel spiritus lavendulæ, aliufve similis, cum vel sine sale volatili oleoso, aut spiritu C. C. subinde admoveatur. Idem faciendum externe, *si a nimis studiis malum ortum traxit*: ubi vero simul moderatio in studiis probe observanda, cum modica diætâ & motu frequenti; *haustulus quoque vini in pastu præsertim*, atque roborantia modice usurpata, optime conducunt. A nimis vero volatilibus & fragrantibus spiritibus, aut balsamis ita dictis cephalicis & apoplecticis externe adhibitis multi eruditorum magis læduntur; hinc caute hæc tentanda.

Si vertigo a cruditatibus ventriculi ortum ducat, hæc per digestiva sive falia media primum præparentur ac solvantur, & deinde vel per os vomitu, vel si quid vomitum vetat, per alvum evacuentur. Postea stomachica roborantia, cephalica, usus modicus vini generosus in pastu, pro ventriculo & cerebro roborandis, motus sive exercitatio corporis, & diætâ parca atque aromatica subjungantur. *Usus aquarum Pyrmontanarum* huiusmodi martialium hic quoque, egregie enefacit.

X V I.

De Phthisi.

PHTHISIS, sive ulcus pulmonis cum tabe, tussis, rejectione materiæ purulentæ & non raro sanguinolentæ, feбри hectica, spirandi difficultate, vel a præcessa hæmoptysi, vel a congestione & suppuratione sanguinis in pulmonibus oritur; quæ, si perfecta & in-

veterata, vix unquam; incipiens quidem interdum; attamen raro & difficulter curatur. Indicationes primariæ hic sunt: ulcus mundare & consolidare, congestiones resolvere & avellere, tussim & febrem moderari, & vires conservare.

Igitur *præmissis* & subinde repetitis *lenibus laxantibus*, præsertim ex tamarindis, foliis sennæ & manna paratis, vel magnesia alba aut rhabarbaro pro affluxu nimio a pectore revellendo, maxime conducunt, 1. *Infusa & decocta ex radicibus & herbis pectoralibus*, temperatis expectorantibus, solventibus atque traumaticis: ut radic. liquirit. malvæ, chinæ, cichorii, pimpinellæ, irid. Florent. helenii, herbis veronicæ, scabios. capilli veneris, hyssopi, pulmonariæ, tussilaginis, virgæ aureæ, solidaginis saracenicæ, &c. cum passulis, dactylis, jujubis & ficibus; vel spec. pectoral. dispensatorii Brandenburgici vel Augustanorum, cum herbis pectoralibus prædictis, vel species nostræ pectorales, bis aut ter in die, ut infusum Theæ, usurpata. 2. *Salina solventia*, abstergentia, & temperantia, ut tartarus vitriolatus, & lapides cancrorum vel conchæ succo limonum vel citri saturati, &c. cum paucis nitro ex aquis pectoralibus bis in die, & potissimum vespere assumpta. 3. *Blandissima balsamica* hic subjungantur: ut Elixir. pectorale Wedelii ad guttas xxx. vel xl., vel balsamum peruvianum, aut balsamum de Mechâ, aut opobalsamum in forma elæosacchari, sed parcissima copia, ne febrem augeant; id quod etiam observandum in usu balsam. Locatelli vel Meimobii. Tutius vero 4. interponuntur *Gelatinae* ex C.C. & ebo-re paratæ, itemque *emulsiones temperantes & roborantes* ex amygdalis cum pistaceis, pineis & semine papaveris albi. 5. *Contra tussis vehementiam*, si emulsio non sufficit, *lene opiatum* circa vesperam cum lapidibus cancrorum citratis, aut pulvere temperante quandoque exhibeatur, ut massa pilul. de styrace, vel de cynoglossa a gr. ij. iij. ad v. vel laudani opiatum gr. j. Quiddam cum STAHLIO hic valde laudant *extractum tabaci* longiori coctione paratum ad gr. iij. vel iv. mane in lecto assumptum. 6. *Pediluvia tepida* sæpe revellendi causa cum fructu adhiberi possunt. 7. Circa æquinoctia,

Stia, immo in nonnullis sapius, *larga Venæ sectio*, si vires permittunt, in pede instituatur. 8. *Usus chærofolii* in cibis sit frequens; *salita*, vero, *spirituosa*, nimis *calefacientia* & *acida*, præsertim ex *mineralibus* parata, nocent. 9. Ubi *phthisis* in *sexu muliebri* a *mensium suppressione* oritur, hi restituendi sunt, aut si in puel-
lis junioribus nondum apparuerunt, eorum proventus, modo supra Cap. IX. §. VIII. proposito, promovendus, quorum beneficio fit, ut plures feminæ a phthi-
& hæctica curentur quam viri. 10. *Quando ægri tales post usum ejusmodi remediorum melius se habent*, & ambulare rursus possunt, medicamentis continuo non sunt ob-
bruendi; sed sufficit tunc aliquandiu, *bona ac parca diæta* & *motus frequens*, sed moderatus ambulando, equitando, curru vehendo; quandoque tamen infusum quoddam pectorale loco Theæ cum aliquot guttulis Elixirii vel Essentiæ cujusdam pectoralis, verb. grat. ex extracto veronicæ, in aqua pectorali soluto, mane apte adhiberi potest; vesperi vero *pulveris temperantis* ℞. vel ʒss. cum vel sine china, præsertim quando forte calorem paullo auctiorem sentiant, donec forte nova mala, nova rursus remedia desiderent: sic prædicto regimine plus sæpe efficitur, quam continua aut ingenti medicamentorum farragine. Conducit etiam egregie al-
vum vel victu idoneo vel lenibus remediis semper ser-
vare laxam, nisi per se respondeat.

II. *Aquæ Emsenses* & *Selterenses*, præmissis laxanti-
bus, præsertim cum *tertia vel quarta parte lactis* quo-
tidie mane per aliquot hebdomades calide haustæ, multis in malo recenti vel saltem non adeo vehemen-
ti, egregie profuere, præsertim si ambulare adhuc pos-
sunt; aquæ martiales, ut *Pyrmontanæ*, *Egranæ*, *Suval-
bacenses*, *Spadanæ*, &c. phthificis huc usque quidem a
plerisque funestæ habitæ fuerunt; attamen observatio-
nes recentiores me aliosque docuerunt, quod in malo
recenti aut leviori iis tuto & cum fructu etiam uti
queant, si modo tepide & modice bibantur; frigidæ
vero, ob frigus pectori inimicum nocent. Cura deni-
que ita *dicta lactea*, præsertim lactis asinini, vel ca-
prilli, vel feri lactis, itemque lactis ebutyrati quando-
que valde etiam nonnullis conducit, si diu satis cum

bona diæta & corpore rite præparato, continuatur. Eadem fere methodus medendi, omiſſis balsamicis, optima quoque est in *hectica*, quæ sine ulcere pulmonis est, vel etiam cum ulcere renum conjuncta.

X V I I.

De Vomica, & Empyemate.

*Vomica
& em-
pyema.*

In VOMICA pulmonum eodem fere modo curatio quoque est instituenda; inprimis vero per infusa vel decocta expectorantia atque traumatica cetera remedia antea laudata, ulcus abstergendum, mundandum & consolidandum interpositis subinde *lenibus alvum ducentibus*, præsertim ex manna, vel ex magnesia alba, ad affluxum ad pectus avertendum, Venaque in plethoricis in pede idoneo tempore secanda. Reliquum per laudata decocta pectoralia, blanda balsamica, & bonam victus rationem perficitur, vel & per aquas medicatas §. XVI. cum lacte.

EMPYEMA sine matura incisione sive paracentesi thoracis curari non potest; (de qua vid. Institut. nostr. chirurgic.) interne iisdem adhibitis, quæ in phthiſi & vomica modo commendavimus.

X V I I I.

Malum Hypochondriacum.

*Malum
hypocon-
driacum.*

Malum Hypochondriacum plerumque consistit in congestionem sanguinis abundantis & spissioris in hypochondriis, sive in visceribus cum Vena portæ communicantibus: unde in eis stagnationes, distensiones, molestiæ, dolores, spasmi, flatus, obstructiones alvi, animi morositas, tristitia & ipsa sæpe melancholia, cum variis aliis miris atque inexplicabilibus subinde symptomatibus, oriuntur, ubi sanguis abundans in vasis venæ portæ & cumprimis hæmorrhoidalibus congestus, prædicta symptomata inducit, maxime si per vasa hæmorrhoidalia exitum invenire non potest.

X I X.

Quod ad *curationem* hujus morbi attinet, in *paroxysmo*, nisi alvus jam sit aperta, enemate aperiatur emolliente, vel leni purgante, præsertim salino, ex sale amaro cathartico, anglico vel bohemico, eodemque, quoties diutius, quam par est, obstructa est, aperta servetur. Deinde ad humores viscidos resolvendos, & symptomata minuenda salia media digerentia sive *digeriva* dicta, ut tartarus vitriolatus, tartarus tartarificatus, arcanum duplicatum, nitrum antimoniatum, vel sal absinthii cum cinnabari & lapidibus cancerorum acido tartari vel citri saturatis, vel pulvis temperans noster, quotidie ter quaterve ex aquis idoneis exhibeantur; vel etiam liquor terræ foliatæ tartari a guttis xl. ad lx. mane cum infuso Theæ aliove simili, propinetur, atque aliquamdiu cum parca diætâ, potu tenui, sufficiente, & exercitatione corporis continueatur. Quæ vero si non sufficiant, ad paroxysmum minuendum, *Essentia millefolii vel adianthi albi*, horumque *decoctum* sive *infusum* ad modum Theæ prudenter exhibeantur, ita brevi plerumque magnum ægri levamen percipiunt.

X X.

Extra vero paroxysmum, vel in malo graviori etiam in paroxysmo aut eo saltem aliquomodo remittente, 1. *Extra* Quantitas sanguinis crassi est imminuenda per Venæ *paroxys-* sectionem, præsertim in pede; quæ deinde circa æquidistantia, vel in valde sanguineis, sæpius repetenda. Vel utilissime etiam hic sanguinis quantitas, natura sæpe cum successu monstrante viam, imminuitur per *hirudines* ano applicatas, in primis quando æger jam antea aorte hæmorrhoidibus laboravit, vel dolores circa lumbos & os sacrum percipit. 2. *Sanguis viscidus & spissus est attenuandus*: quod optime fit primo idonea diætâ, ut cibo parciore, tenui & facilis digestionis, potu fluente sufficiente, & motu frequenti, sed moderato, quæ optima sunt *hypocondriacorum remedia*. Quibus tamen addi possunt *pulveres & infusa* ex vegetabilibus, præsertim radicibus & herbis incidentibus atque attenuantibus, ut radicibus iridis Florentinæ, cichorei, caryophyllatæ, taraxaci, pimpinell. alb. vincetoxic. apii, ari- &c.

&c. herb. fumarizæ, scolopendriæ, linguæ cervinæ, hepaticæ, capilli veneris, adianthi albi, card. bened. mellissæ, flor. millefolii, cum lenibus aromaticis, ut cinnamomo, cassia caryophyllata, cort. cuilaban, santalo citrin. schœnanth. aniso stellato, lign. sassafr. &c. Præterea cum his infusis assumi possunt tinct. tartari, tinct. antimonii tartarifata, liquor terræ foliatæ tartari, Essentia corticis aurantiorum, pimpinellæ, scordii, gentian. helen. absinth. & similibus, interpositis, præsertim vesperi, antea laudatis salibus digestivis; quibus vero subinde *lene laxans*, vel ex infuso rhabarb. & foliis fennæ, vel ex pilulis gummosis *Sylvii*, tartareis *Bontii* vel *Quercetani*, vel *Beccheri*, polychrestis nostris, aut Sal Anglicanum, vel amarum catharticum, apta dosi, quando res sic postulat, interponendum.

X X I.

Symptomatibus gravioribus sic debellatis, tandem, ad *roborum* partium denuo *roborandum*, lenia martialia, ut tinctura vitrioli martis, tinctura martis cydoniata, vel mixtura ex spiritu C.C. & tinctura tartari, vel etiam crocus martis, vel ipsa limatura martis subtilissima a gran. v. ad viii. aut cum elæosacchar. Æß. aut cum extractis amaris mane & circa vesperam exhibita, præ omnibus autem fere *aquæ martiales medicatæ*, ut Pyramontanæ aliæque similes, legitime usurpatæ, hic conducunt. Inimò etiam hæc martialia in malo graviori sæpe jam cum successu usurpantur, & apud Germanos valde celebres sunt, nomine *curationum martialium*, (*Stahlcurenn.*)

X X I I.

Præservatio *Præservatio optima* hujus mali consistit in parca diætâ, potu tenui sufficienti, aquoso, inprimis etiam feri lactis, (a) motu frequenti, temperantia in studiis præsertim lucubrationibus, & Venæ sectione circa æquinocetia; quæ, qui rite observat, non facile malo hypochondriaco rursus afficietur. In multis etiam *usus legitimus aquarum medicatarum*, æstivo præsertim tempore,

(a) Hoc etiam sua experientia confirmat cel. Frid. Hoffmann. Dissert. de feri lactis virtute aliisque multis in scriptis.

ore, multo cum fructu quandoque interponi, immo
pe præsentibus etiam symptomatibus usurpari potest.

X X I I I.

De Malo hysterico.

Malum hystericum sive *passio hystERICA* idem fere est *Passio*
a mulieribus, quod in viris malum hypochondriacum, *hysteri-*
ed illas, tanquam corpora teneriora, vehementius af- *ca.*
igit, & speciatim eis sæpe constrictionis pectoris &
affocationis sensum, (unde & *suffocatio uterina* sive
hystERICA dicitur) multos *spasmos*, motus convulsivos,
unde *epilepsia uterina*) *anxietates majores*, *nauseam*,
anatum vomendi, *vomitum* ipsum aliaque graviora sym-
tomata inducit.

X X I V.

Oritur quoque præcipue, ut mihi saltem videtur, a *Causæ:*
ongestione sanguinis in abdomine, & speciatim visce-
bus hujus cum vena portæ nexis, exitum per ute-
um vel vasa hæmorrhoidalia non invenientis: hinc
adem symptomata inducit, eademque fere ac mali
ypochondriaci & prognosis & curatio est. *Interdum*
emen quoque observatur mensibus rite se habentibus, &
anc forte ab humoribus acribus primarum viarum,
pasmos illos excitantibus, ortum trahere videtur.

X X V.

In paroxysmo, præsertim ubi sensus strangulationis *Curatio*
el suffocationis, vel motus convulsivi epileptici, vel *in paro-*
nimi deliquia adsunt, medicamenta fœtida & volati- *xyfmo.*
a, ut spiritus C. C. liquor. C. C. succinat. Essent.
astorei, vel ipsum Castoreum, pennæ perdicum, vel
rustum corii aut cornu accensum, ad eas excitandas
aribus admoveantur, & guttæ aliquot prædictorum
irituum fœtentium vel per se, vel cum liquido quo-
am aqueo ori infundantur: ubi & vellicationes pilo-
um, nasi, aurium, atque frictiones pedum ac ma-
uum cum pannis asperis, vel excutiis e setis porci-
is confectis, utiliter adhibentur, donec ad se re-
eant.

*Extra
paroxys-
mum.*

Extra paroxysmum eodem fere modo ut in malo hypochondriaco, §. XIX. & XX. procedendum; ita tamen ut Essentiis vel pulveribus salinis & cinnabarinis semper aliquid castorei addatur, nisi ægra id forte, ut subinde fit, aversetur. Deinde opera danda, ut mensium fluxus, si adhuc sunt in congrua ætate, restituantur. Sed si non amplius sint in ea ætate, qua menses restitui queant, aut si malum vehementius, Venæ sectio in pede instituatur, & postea Venæ sectiones æquinoctiales; & subinde adhibitas purgationes lenes, præsertim pilulis lenibus uterinis balsamicis, vel sale amaro cathartico præservandi fine non prætermittant, observata simul legitima victus ratione.

X X V I I.

Cautela.

Emetica his exhibere, aut purgantia fortiora, summe periculosum esse sæpius observatum est. *Calidiora* quoque medicamenta, Elixiria uterina, olea distillata ejusmodi, itemque salia volatilia oleosa valde etiam hic plerumque sunt noxia. *Absorbentia* sive *terrea* ac *cretacea* medicamenta, nullam quoque his in malis utilitatem afferunt: quia acidum hic vel non peccat vel saltem causa præcipua non existit; sic & *martialia* a quibusdam adeo decantata, forte ob vim stypticam & difficilem digestionem etiam hic sæpe vel nihil efficiunt vel omnino nocent, præsertim si non quam cautissime usurpentur; interea tamen quibusdam egregie profunt, adeoque caute tentanda. Verum *aquæ minerales*, *martiales*, præsertim si prius Venæ sectio in pede præmittitur, atque modicæ & non nimis frigide bibuntur, ac motus sufficiens subjungitur, optimos sæpe effectus præstant; *debilioribus* vero, præsertim si *frigide* ac nimia copia, aut neglecto motu hauriantur, sæpe nocent; sed hæc debiliores quoque optimo cum successu aquis medicatis temperatioribus quæ salia media blanda, sine martialibus & vitriolicis particulis, continent, ut sunt Emsenses aut Selzerenses, præsertim calide haustæ, uti possunt, qui egregie sanguinem diluunt, attenuant, resolvunt & fluidum reddunt. Ratione diætæ idem ipsis quoque observandum, quod in malo hypochondriaco propo-

imus . Denique sciendum hoc malum in quibus-
tam tam pertinax esse , ut omnium remedium vim
ere eludat , & vix nisi tempore & patientia vinci
ueat .

XXVII.

Obstructiones Hepatis & Lienis .

Obstructiones sive infarctus hepatis & lienis eandem *Obstru-*
a^ussam ac præcedentes duo morbi agnoscunt , ideoque *Etiones*
æc mala eodem etiam fere modo curanda , interpo- *hepatis*
endo simul sæpe modicam *mercurii dulcis* portionem ; & *lie-*
el & *saponis* veneti usum copiosum . In mulieribus *nis .*
ræcipue ad menses ; in viris vero ad hæmorrhoides
bstructas respiciendum , ut earum fluxus , si fieri
ossit , restituatur , vel si nondum adfuerit , exci-
etur . Sed si hoc fieri non possit , & symptomata
ergeant , Sanguis Venæ sectione , hirudinibus ano
applicatis , aliisque evacuationibus artificialibus eva-
uetur . Externe *emplastrum diasaponis* , vel de gum-
ni ammoniaco , de cicuta , diaphoret. Myns. vel
lachylon cum mercurio roboratum , calide lateri
gro sive dolenti applicandum , & quandoque oleo
apparum , vel unguento dialtheæ calide frican-
um . *Venæ sectio in pede* , *potus sufficiens tempera-*
us , *motus corporis frequens* , & *cumprimis equi-*
atio , ac diætâ moderata ac tenuis , itemque *aquæ*
medicatæ ac balnea temperata , præcipua horum
morborum , si curationem adhuc admittunt , sunt re-
media .

XXIX.

Scirrhus Hepatis & Lienis .

Scirrhus hepatis & lienis inveteratus nullam admit- *Scirrhus*
t medelam , hinc præstat eum intactum relinquere . *hepatis*
ecens vero , præmisso laxante idoneo & Venæ se- *& lie-*
ctione in pede , eodem regimine ac victus ratione , *nis .*
idemque remediis §. XXVIII. indicatis , subinde adhuc
cura-

curatur, resolventibus nimirum radicibus, herbis, sub forma infusi, salibus, digestivis, gummatibus, &c. interne & externe adhibitis, quibus & mercurius dulcis moderata dosi resolvendi fine utiliter vel admiscetur vel interponitur, vel & sapo venetus. Sæpius etiam *aquæ medicatæ*, si rite usurpantur, hic magnam quæque adhuc utilitatem afferunt, quia potenter sanguinem spissum resolvunt & obstructions aperiunt.

X X X.

De Atrophia.

Atrophia. *Atrophia* vi vocis quidem *quancunque* corporis *talem* significat: attamen hodie speciatim & proprie summi solet pro ea *tabis specie*, quæ ab obstructione glandularum in mesenterio oritur, atque ut plurimum a congestione sive ab infarctu glandularum ejusdem præcipue in infantibus sive pueris, provenit, ab humoribus viscidis ibi congestis ac quiescentibus; hinc eorum ventris plerumque multum tumere & inflatus esse solet.

In curatione igitur requiritur 1. Pro cruditatibus primarum viarum evacuandis, laxantia moderata, eaque in progressu curæ subinde repetita: quibus semper parum mercurii dulcis admisceatur. Infantibus junioribus pulvis jalapæ cum tartaro vitriolato vel mercurius dulcis, vel syrupus de cichor. cum rhabarbaro hunc in finem apte exhibetur; cui, si hic nimis debilis, pulveris jalapæ aliquot grana addantur. Adultioribus etiam Sal Anglicanum vel amarum catharticum Germanicum vel Bohemicum, vel pilulæ, eæque præsertim mercuriales, cum fructu dari possunt.

2. Attenuantia, digerentia sive resolventia eadem quæ in malo hypochondriaco §. XIX. & XX. vel modo §. XXIX. laudata sunt, infusa nimirum, pulveres & essentia: ubi etiam cum primis *specificum* sive *pulvis antatrophus* Scretæ, (a) aliisque similis egregius est. U

R. rad.

(a) Descriptio hujus pulveris vid. in *Lentilii Miscell. Med. pract. part. III. p. 59. Kænic, Select. Rec. med. pag. 67.*

R. rad. irid. flor. ʒʒ.

ari

tart. vitriolat.

fulig. splend.

lap. 69. ppt. a. ʒij.

sacchar. alb. ʒij. M.

de quo aliquoties in die dosis idonea exhibeatur. Si
infantes adhuc fugunt, nutricibus quoque talia remedia
simul sæpe exhibenda, bonaque diætā ab ipsis ser-
vanda.

Externe, quia abdomen eorum plerumque valde tu-
met & durum est, conducit emplastrum diasaponis,
vel de ammoniaco toti abdomini imponere, illudque
abinde oleo laurino calido probe fricare sive inunge-
re. Balnea quoque aquæ dulcis tepida, ex aqua plu-
viatili aut fluviatili, vel simplicia, vel cum herbis a-
romaticis parata, multa cum corporis & artuum frica-
tione, dum in balneo sedent, sæpe usurpata, itemque
requens motus in curru puerili aliave idonea machi-
na, his ægris egregie conducunt.

X X X I.

Si atrophia hæc, ut sæpe fit, simul a vermibus oria-
tur, hi anthelminticis amaris, & speciatim semine san-
tonici sive cinæ cum melle exhibito, aut vino Hispa-
nico infuso, vel myrrha, vel radic. filicis, summitati-
bus absinthii, floribus tenaceti cerevisiæ injectis, vel,
si hoc præstat, mercurio dulci, & laxantibus sensim
restituendi atque expellendi.

X X X I I.

De Rhachitide.

Rhachitis (quæ atrophia est cum spinæ & articulo-
rum deformitate) cum ex eadem causa, cui sæpe ali-
quid venerei admixtum est, oriri videatur, (a) iisdem
etiam

Rha-
chitis.

(a) Hunc morbum tam novum non esse, ut vulgo
creditur, alias in schediasmate docui, quo ostendi, in-
fantes olim pro a diabolo suppositis habitos, revera nihil
aliud, quam infantes rhachiticos fuisse, Anno 1725.

etiam remediis attenuantibus, resolventibus & aperientibus speciatim vero infusis vegetabilium laudatorum, tinct. antimonii tartarifat. tinct. vitrioli martis Ludovici, pulvere antatropho Scretæ, vel pulvere ex salibus digestivis, rad. ari & iridis Florent sicut §. XXX. commendavi, vel & ex illis & semine anisi, fœniculi, cinamomo & croco martis sulphurato parato, interpositis subinde lenibus laxantibus mercurialibus, curanda: quibus *externe* spiritus aut linimenta nervina pro spina dorsi inungenda, ex spiritu rosmarini, serpilli, matricali, aqua Anhaltina & similibus adjungantur, non omittis, ubi opus est, *idoneis machinis* pro spina dorsi & cruribus curvis emendandis. In *dieta* crassa, cruda, farinosa, legumina, & præ omnibus nimia repletio vitentur, curruque puerili, vel alia commoda ratione sæpius moveantur, non neglectis *balneis* frequentibus tepidis & fricationibus congruis, in atrophia antea laudatis: quam methodum etiam recens scriptor medicus (a) peculiari scripto de *Atrophia infantum* valde laudat: præsertim si frictiones in balneo semper fiant manu humida, farina triticea prius imbuta, pro sordibus & obstructionibus foraminulorum cutis abstergendis atque aperiendis.

X X X I I I.

De Calculo.

Calculus.

CALCULUS & *renum* & *vesicæ* ut plurimum quoque ortum suum trahere videtur ex congestionem & stagnationem sanguinis crassioris in renibus; unde tandem calculus, primo renum, deinde & vesicæ emergit, atque gravissima symptomata, ut dolores, nauseam, vomitum, obstructionem urinæ, convulsiones, inflammationes, &c. producit. Vesicæ tamen calculus etiam sæpe præsertim in pueris, oritur in vesica, salvis renibus quando particulæ terrestres & viscidæ sive glutinosæ ibidem hærent atque concresecunt.

XXXIV.

(a) *Chudenus*, scilicet celebris Medicus, olim in Marchia veteri, nunc in Ducatu Luneburgico.

X X X I V.

In *Curatione* primum semper respiciendum utrum *Curatio*
paroxysmus adsit, an a paroxysmo æger liber sit, at- *in p. ro-*
que propterea curatio varianda. In *paroxysmo calculi*, *xyfmo*.
sive renalis sive vesicæ, ante omnia alvus per clyste-
res ex decocto florum chamomillæ vel veronicæ cum
acte & melle vel saccharo paratos solvatur, iique per
aliquot dies, si malum non remisit, licet alvus non sit
obstructa, spasmos leniendi causa, quotidie repetan-
tur; ita dolores plerumque egregie demulcentur. Non-
nulli, præsertim in calculo renum, magnum levamen
entiunt, si mox in principio paroxysmi sol. sennæ ʒʒ.
vel cum aqua vel cum cerevisia tenui ℥ʒ. leniter &
per momentum decoquant addito paucō saccharo vel
mannæ, mane per unum alterumve diem ebibunt. A-
lias mox post clysterem vel etiam post operationem
purgationis finitam, exhibeantur *pulveres temperantes*
ut *antispasmodici*, ex tartaro vitriolato, nitro depu-
rato, lapidibus cancrorum, acido citri saturatis, & cin-
abari nativa, vel antimonii vel etiam ipsa vulgari,
parati; de quibus singulo bihorio ℥j. vel in robustio-
ribus ʒʒ. donec calculus expulsus, vel dolores remit-
tant, ex aqua vel decocto convenienti, ægro porriga-
tur. His *diluentia & lubricantia* calida, ut *infusum*
Theæ, virgæ aureæ, hederæ terrestris, Coffeæ, Rad.
ichorii, liquiritiæ, malvæ, althææ, pareiræ bravæ aut
seminis lini interponantur, (a) ut & *emulsiones dilu-*
e ex amygdalis dulcibus & semine papaveris albi;
quandoque lubricantia atque emollientia, ut olei amyg-
dalarum dulcium vel olei papaveris albi vel olei lini
abinde cochlear. j. ij. vel tria in robustioribus exhi-
beantur; item *decoctum nephriticum Foresti*, aut aliud
ex vegetabilibus pectoralibus & lubricantibus paratum,
quale nostrum est decoctum pectorale, egregie profunt:
e quibus quandoque haustum vel cyathum unum alte-
rum-

(a) *Infusum seminis lini* cum paucō saccharo ac la-
e mirabiles præstare effectus in doloribus leniendis,
severat quoque Sydenham. Cap. de Calc. & Middle-
n. lib. de Lithotom. pag. 5.

rumve assumant. In doloribus vehementissimis *anodyna* parva dosi, ut præter sem. papaveris albi in emulsionibus laud. opiat. aut mp. de cynoglossio laudatis pulveribus adjungantur. Vel liquor terræ foliatæ tartari cum quinta parte laud. liquid. *Syndehami* mixtus, & ad gutt. L. vel LX. subinde datus. Vel si *extract. flor. papav. rh.* vel sem. papaver. albi ʒj. in liquore terræ foliatæ tartari ʒss. vel ʒj. solvatur, & eadem ratione per intervalla exhibeatur, egregie his dolores leniuntur, & tamen calculi simul blande promoventur. Hoc papaveris extractum in frequentissimo usu loco opii et supra jam sæpius laudato D. *Wagnero*, Medico Lubecensi famigeratissimo, qui illud *opium Europæum* vocare, & egregios effectus in quamplurimis morbis præstare solet. Externe, balnea aquæ dulcis, aliæve emollientia, ut oleum lumbricorum terrestrium, vel *scorpionum*; aut facculi ex emollientibus herbis ac seminibus confecti, vel cepæ assatæ, regioni dolenti calide sæpius applicentur.

X X X V.

Calculorum exiguorum curatio. Si calculi exigui, tunc, his aliquamdiu præmissis lenientia pellentia subjungenda vel conjungenda: ut præter modo laudatum liquorem terræ foliatæ tartari, tincturæ tartari, vel tart. vitriol. vel sal ammon. ad ʒj. vel ʒss. subinde data, vel fructus alkekengi, cynosbatidis, baccæ juniperi, nuclei persicorum vel amygdalæ amaræ, VI. vel VIII. quotidie semel, bis aut ter comestæ, vel in emulsione dati; (a) aut semen lithospermæ sive milii solis & violarum, vel in pulvere vel in emulsione, una cum balneis tepidis emollientibus & regimine temperato, exhibeantur. In calculis vero magnis a pellentibus abstinendum, & solum lenientia adhibenda. Denique remittente paroxysmo, quia ventriculus in eo utplurimum debilitatur, stomachica temperata rursus sunt usurpanda.

XXXVI.

(a) Ut R. nucl. persic. N. XVIII. amygdal. dulc. N. VI. aquæ fragr. ʒj. F. Emulsio, add. sacch. perlar. q. s. ad grat. sapor. D. sæpius haustulus, quæ etiam egregie in urina suppressa prodest.

X X X V I.

Extra paroxysmum sanguinis quantitas imminuatur *Extra*
per Venæ sectiones tempore æquinoctii, aut in sangui- *paroxys-*
neis sæpius institutas, quæ valde hic egregiæ; & si for- *mum*.
e hæmorrhoides suppressæ, hæ restituantur, aut hirudi-
nes ano applicentur; sin vero in mulieribus menses ob-
structi, hi propriis suis remediis sunt curandi. Quovis
porro trimestri spatio aut pro rerum varietate sæpius,
infusum laxans ex foliis fennæ, rhabarb. manna ac tar-
aro solubili porrigatur. Quotidie pro sanguine viscido
diluyendo & attenuando bis utatur *potu Theæ, Coffeæ,*
Geronicæ, hederæ terrestris, virgæ aureæ, vel *consolidæ*
aracenicæ, cum quo subinde mane lig. terræ foliat.
artari gutt. L. assumantur. *Potus* reliquus sit cerevi-
a tenuis bene defæcata, vel *aqua* pauco vino mixta;
aut decoctum hordei cum liquirit. passulis & aniso vel
eniculo; cui moderatus vini tenuis usus, si habetur,
& æger ei assuetus est, interponatur. *Vitet* denique ni-
miam repletionem, & alimenta flatulenta, tenacia,
cruda, viscida, farinosa, nimis calefacientia, iram,
generemque nimiam. Singulis hebdomadibus semel bis
pro sanguine incidendo & temperando, circa vesperam
utatur pulvere temperante, in curatione jam indicato,
qui egregie præservat. Ita & *usus aquarum medicata-*
rum legitimus vere vel æstate in calculis minoribus
expellendis perquam est egregius. *Medicamenta* vero
calculum præsertim majorem *frangentia* nondum certe
cognita sunt, quamvis in Anglia nuper multum rumo-
ris remedium mulieris cujusdam, cui *Stevens* nomen,
pro calculo curando & frangendo concitaverit; (a)
tunc ubi calculus major in vesica hæret, medicamen-
tis vix & non nisi sectione; in renibus vero nulla forte
ratione tolli potest, nisi natura in dorso in renum re-
gione sponte suppurationem aut abscessum moveat,

O 2

per

(a) Conferri tamen meretur exemplum calculi ma-
gis in vesica fracti, quod in Act. Anglican. descripsi,
quo vim frangendi calculum in vesica non impossi-
bile esse cognovi; licet ille magis sponte aut vi na-
turæ, quam medicamenti fuerit comminutus.

per quem educi queat, qua de re vid. Instit. nostræ chirurgicæ.

X X X V I I.

De Hemorrhoidibus cæcis.

Hemor-
rhoides
cæcæ.

Hæmorrhoides cæcæ sunt congestiones & stagnationes sanguinis abundantis, in vasis laxi intestini recti, hæmorrhoidalibus dictis, ubi sanguis abundans congestus varia eaque gravia sæpe symptomata, cum primis vero dolores modo minores modo majores inducit. Duplici modo se exhibent: nam vel sub figura *tuberculi* aut *vesiculæ*, sanguine atro repletæ, varicum instar, circa anum se manifestant, & sæpe non adeo vehementer dolent, immo quandoque fere indolentes sunt. Interdum tamen satis insigniter dolent, & quoniam ad varicum naturam accedunt, *hæmorrhoides varicosæ* dici possunt; vel *durum inflammatorium tumorem*; ceu furunculum valde dolentem, profundius plerumque in ano sive in ipso intestino recto hærentem, constituunt, qui ægros misere sæpius & quandoque ad animi usque deliquium excruciat, atque facile in suppurationem & fistulam ani abit; hinc *hæmorrhoides inflammatoriæ cæcæ & dolentes* vocantur, a prioribus multum diversæ; cum illæ in suppurationem aut fistulam vix unquam abeant.

X X X V I I I.

Curatio
varico-
sarum.

In prioribus sive *varicosis* vesicula sive tuberculum vel digeritur vel sponte se aperit aut rumpitur, atque plus minusve sanguinis effundit, fiuntque sic ex hæmorrhoidibus cæcis fluentes; & vulnusculum vel sponte rursus glutinatur, vel curatio nil nisi spiritum vini balsamica eis superimposita requirit. Vel si non sponte rumpatur tuberculum, neque digeratur, sed ægre incommoda, præsertim in sæcibus deponendis creet, per scalpello vel hirudinibus sanguis in eis stagnans educendus; aut si in cristatam vel verrucosam, ut quandoque contingit, naturam mutantur, vel per ligaturam vel per idonea rodentia remedia, vel etiam per scalpellum aut forcem auferendæ, & per balsami-

deinceps curandæ sunt. Vid. Instit. chirurg. P. II. Cap. 67.

X X X I X.

In hæmorrhoidibus inflammatis, primis quatuor diebus resolutio omni modo est tentanda: id quod fit 1. Fennæ sectione in pede, vel etiam in brachio, eaque erga, præsertim, ubi manifesta adest plethora aut calor ac dolor magnus. 2. Potiuncula laxante ex tamandis, foliis fennæ, cremore tartari & manna; vel syltere emolliente; purgantia vero resinosa & aloetica aliave calidiora sunt vitanda. 3. *Pulveribus temperantibus*, resolventibus, nitrosis, cinnabarinis sæpius utis, ut in aliis inflammationibus. 4. *Potu diluente*, quoso, copioso, & emulsionibus, in aliis inflammationibus usitatis & laudatis: ubi etiam *infusum tenue milfolii* præ ceteris hoc in casu anodynum & resolvens specificum habetur præstantissimum.

Curatio
hæmorrhoidū
inflammat.

Externe spiritus vini, cum vel sine camphora, calide cum linteis complicatis adhibitus, aut aqua calcis vix cum spiritu vini camphorato eodem modo usurpata egregie resolvunt ac leniunt. Ita quoque hic concit celebre unguentum de linaria, vel oleum amygdalarum dulcium vel lini, vel verbasci, vel ovorum sæpius illitum, vel unguentum nutritum ex oleo solani vel sarum cum aceto litargyrifato paratum. *Globulus* quoque vel glans ex butyro non salito, tamquam suppositorium ano immissus, egregie etiam hic duras partes emollit & dolores lenit. VALENTINUS his in doloribus fumum sive suffitum *murium ita dictorum mariorum* ano exceptum valde commendat, (a) qui etiam sæpe non est contemnendus.

X L.

Si vero resolutio obtineri nequeat, vel tardius advocamus, *suppuratio cataplasmatibus emollientibus* late paratis est promovenda: quæ simulac aliquo modo facta, scalpello est aperienda, deinde locus late, ut alius abscessus, mundificandus & consolidandus, cavendumque, quantum fieri potest, ne nimis tarde aperiatur, ne pus profundius partes vicinas

Si in
suppurationem
abeunt.

(a) In Polychrest. Exoticis.

erodendo in fistulam ani mali moris degeneret, quæ tristissima sæpe symptomata, & mortem quandoque ipsam inducit: qua de re verò uberius legi potest Chirurgia nostra, ubi de fistula, & abscessibus ani agitur. Part. II. Cap. 168. 169.

X L I.

Præservatio. *Præservatio* sanguinis missionibus, præsertim circa æquinoctia, scarificationibus, aut hirudinum ad anum applicatione, usu prudenti pulverum, aliorumque remedium temperantium, ambulatione frequenti & convenienti, victusque ratione optime obtinetur, vitando abusum vini, aliarumque rerum calidiorum, itemque veneris & equitationis fortioris.

X L I I.

De Arthritide, Podagra & affinis.

Arthritis, Podagra, Chiragra. *Arthritis, Podagra, Chiragra, & Ischiaticum malum*, morbi valde affines, a sanguinis quoque abundantia, ejusque in certis locis congestionibus potissimum provenire solent, quando copiosius, quam par est, in locis dolentibus accumulatur. Nam videmus homines victu copioso & lauto utentes, & non satis sese exercitantes, insimul baccho & quandoque etiam veneri abutentes, eosque quibus hæmorrhoides vel suppressæ vel ubi rite succedere nolunt, præcipue hisce malis affligi. Natura enim abundantes & noxios humores per extrema & cutis spiracula expellere, seque ab onere hoc liberare videtur.

X L I I I.

Præservatio horum morborum. Adeoque *præservandi fine*, cui potissimum in his morbis studendum, simplicissima & pauca remedia primo victus moderatus, parcus, temperans ac diluens frequensque exercitatio, ambulatio, vectio atque equitatio, sunt necessaria. Deinceps subinde & præsertim circa æquinoctia sanguis est per Venas subtrahendus id quod etiam in valde sanguineis interjecto tempore vel eadem ratione, vel si lubet, per scarificationes & cucurbitulas variis in corporis partibus adhibitas, utiliter fieri potest, præmisso præsertim medicamento idoneo

neo

eo alvum blande ducente. Abstineant præterea abusu vini, Veneris, & ira, potuque utantur tenui, vel aquoso vel ex cerevisia tenui, & in æstate utantur per duas vel tres hebdomades *aquis medicatis*,

X L I V.

Ad curandos vero arthriticos morbos & speciatim AR- *Curatio*
THRITIDEM, facit quam maxime victus tenuis, *arthriti-*
potus aquæ, imprimis calidæ, ut Theæ, vel decocti *dis spe-*
radic. polypodii, chinæ, sarsaparillæ, liquiritiæ, alia *ciatim*.
rum radicum aut herbarum aperientium; Essent. ari-
stolochiæ, pulveres deinde temperantes, antispasmo-
dici, quies in lecto, corpore bene tecto, transpirationis
vel blandi sudoris expectatio, & speciatim partibus
dolentibus probe contra frigus munitis: vitando exter-
ne omnia frigida, pingua, unguenta, emplastra, præ-
sertim glutinosa. E contrario partes dolentes tantum
ulvinaribus involvantur, aut sacculis herbis resolven-
tibus, vel farina fabarum, tritici, lupini, orobi, alia-
rum simili repletis, calide circumduntur; cetera enim
peræque, quantopere etiam pro specificis a thrasonibus
& empiricis laudentur, plus plerumque nocent quam
prodesunt, noxiamque materiam repellunt.

X L V.

Atque hæc eadem prorsus etiam in PODAGRA cu- *In acces-*
canda sunt observanda & facienda; ea adhuc adhibita *sione po-*
tutela, ut quando ingruentem novum impetum sive *dagræ*
paroxysmum sentiant ægri, quod, ut sæpius observavi, *quid fa-*
ibi fastidium & insolita artuum lassitudo potissimum *ciendū*.
medicare solent, mox sordes sive cruditates e primis
aliments idoneo *emetico*, vel si quid vomitum vetat, *pur-*
ante ejiciantur, subjuncto altero die mane & post me-
diem sudorifero blando: ut essentia quadam diapho-
retica & imprimis Essentia aristolochiæ, cum largo a-
quæ vel decocti calidi potu, ac speciatim decocti ra-
dic. chinæ, atque abstinentia a cibis, minimum soli-
tis, aut difficulter digerendis; vesperi vero pulveris
temperantis vel antispasmodici ꝑss. ex aqua diaphore-
tica semel vel bis utantur, ita enim haud raro mor-
bus instans, sive paroxysmus in prima, ut ajunt, her-
a suffocatur, prævertitur, atque omnino extirpatur,
vel saltem valde minuitur.

In paro-
xyfmo.

In *paroxyfmo* vero rursus omnium optime conveniunt 1. *abſtinentia* aliquot dierum, vel ſaltem victus admodum tenuis & parvus; 2. *potus aqueus*, largus, ac præſertim calidus, cumprimis decoctum radic. chinæ sæpe jam laudatum, ac ſimul 3. præſertim matutino tempore, *Effentia ariftoſochiæ* vel longæ vel rotundæ, vel clematidis, pro malo per diaphoreſin aut blandum ſudorem expellendo; interpoſitis 4. ſubinde, præſertim ſi febricula urget, *pulveribus illis diaphoreticis* ac *temperantibus*, pro febre non prorſus ſupprimenda, ſed moderanda, obſervato ſemper & cumprimis matutino tempore, in lecto, regimine blando ſudorifero; vitatis 5. omnibus, *quæ materiam noxiam repellere poſſunt*, ut frigore, & remediis quibuſcumque externis, ſolis pulvinaribus & ſacculis laudatis exceptis, quæ diaphoreſin non impediunt, ſed promovent & conſervant.

X L V I I.

Podagræ
ab acri-
vel pe-
nuria or-
tæ cura-
tio.

Podagra tamen, quod probe obſervandum, non ſemper a ſanguinis abundantia, ut multi male docent, oritur, ſed haud raro quoque in emaciatis debilibus & haud plethoricis, verum quorum ſanguis acribus ac bilioſis ſalibus ſcatet, obſervatur, qui forte ſæpius vel vino aliisve potibus ſpirituofis ſe obruerunt, vel cibis ſalfis aut acribus nimis delectati, vel iræ nimis dediti fuerunt, vel nimia venere vires exhauſerunt, vel etiam hæreditate a parentibus acrem ejuſmodi ac vitioſum ſanguinem acquiſiverunt; ubi *alia longe ratione & præſervatio & curatio eſt inſtituenda: & quidem non per ſanguinis miſſiones*, aliave evacuantiæ fortiora aut fræquentiora, quæ humores minuunt, & quæ ad præcedentem podagræ ſpeciem avertendam facere ſolent, verum *per blandæ demulcentiæ*, acrimoniam humorum temperantiæ, corpus macilentum ac debile blande nutrientiæ & vires reſtituentiæ: inter quæ præter alimenta blanda, principem ſibi locum vindicat *conveniens lactis uſus*, ſive cura, ut vocatur, *lactea*, eique uſui præ ceteris & Hippocrates lib. de articul. & CELSUS lib. IV. Cap. 24. & GALENUS L. Alim. 7. meth. 6. & PLINIUS lib. 28. & Fr. HOFFMANNUS, diſſ. de lactis aſini.

i usu & diff. de Podagra præservanda, aliique lac asinum commendant, quod ter in die a libra una ad libras duas assument, quamvis & a vaccino egregios effectus in hoc malo notaverim.

XLVIII.

De Ischiatico malo.

Ischiaticum malum, quia a congestione sanguinis abundantis & visceris in vasis circa anum ortum trahit, eodem prorsus modo, ut §. XLVI. docuimus, optime curatur, & cum hoc in malo natura sanguinis circa intestinum rectum congesti exitum per vasa hæmorrhoidalium moliatur, præservandi gratia, aut ejus fluxus idoneis medicamentis, præsertim si alias & sæpius forte fluxerint hæmorrhoides, est instaurandus; vel hiadines ano applicandæ; vel si id fieri non possit, vel certas rationes Medico vel ægro hunc fluxum excipere haud opportunum videatur, sanguis abundans, vel venæ sectione vel cucurbitulis sæpe detrahi debet, ceteraque omnia ea sunt facienda, quæ ad quoscunque morbos, a plethora sive abundantia sanguinis oriundos, præcavendos sæpe jam proposuimus. Conf. possimum Cap. I. §. VIII. ad XII.

*Curatio
mali ischiatici.*

CAPUT XI.

De Cachexia & cachecticis affectibus.

I.

CACHEXIA sive cachectici affectus sanguinis prævam qualitatem, eamque maxime pituitosam sive viscidam ac viscidam, una sæpe cum nimia copia indigent, eorumque præcipui sunt cachexia ipsa, ædema, chlorosis virginum, hydrops, leucophlegmatia, anasarca, ascites, & hydropes articulares, capitis, pectoris, pericardii, scroti, ovarii, &c. gradu & loco diversi, & se invicem vel comitantur.

*Quid
affectus
cachectici
&
qui.*

mitantes, vel subsequentes: quibus vero cachecticis morbis jure adhuc addi possunt *icterus, scabies, scorbutus, morbi venerei, & fluor albus* in mulieribus; quia pravae sanguinis qualitati ortum debent.

I I.

*Subje-
cta.*

Obnoxii sunt his morbis cachecticis prioris ordinis proprie ita dictis, maxime phlegmatici & sanguinei, praesertim viri quibus haemorrhoides, & mulieres quibus menses vel suppressi, vel nimis fluxerunt; senes item praeter juvenibus, itemque in quibus febres intermittentes vel neglectae vel male curatae, aut incongrue cohibitae aut nimis tarde curatae sunt; aut etiam qui malam victus rationem in intermittentibus servarunt, ut & quibus *scabies incongruis remediis*, praesertim sulphureis, aut mercurialibus externis, corpore nondum satis purgato, curata, & sic quasi repulsa fuit.

I I I.

Caussa.

Caussa proxima cachexiae sunt humores phlegmatici, pituitosi, visceri, abundantes, partiumque solidarum relaxatio ac debilitas, quam multae aliae, tanquam *causae antecedentes & remotae*, praegredi possunt: ut refrigeratio nimia, quies nimia, prava & crassa dieta, aut nimis refrigerans; *potus nimis* quicumque vel aquosorum vel spirituosorum, imprimis spiritus vini, adeoque & *crapula frequens*; haemorrhagiae itidem quaecumque nimiae, obstructiones in hepate, pulmonibus, liene, utero, aut alio viscere, haemorrhoides & menses suppressi, phthisis, asthma, & alia.

I V.

Prognosis.

Quo peior caussa, eo periculosior atque difficilior est curatio, & hinc saepe affectus sunt valde contumaces aut prorsus insanabiles. Qui tamen a causis externis refrigeratione aut refrigerantium abusu, itemque a febribus intermittentibus, & potu in eis nimio ortum duxerunt, visceribus adhuc integris, itemque quando aegri adhuc sunt juvenes, facilius quam ceteri, curationem admittunt. *Quo majori in gradu* sunt haec mala & quo magis inveterata, eo difficilius curantur. Aegri quoque seniores, eo morbi hi curatu difficiliores. Si pedum oedema reliquum etiam corpus & praecipue interiora quoque afficiuntur, malum est, & ex *cachexia*

edropes, asthma, aliaque mala oriuntur. Ubi vero *viscera* adfunt *corrupta*, hoc est, vel scirrhus vel ulcere obfessa, eaque jam inveterata, plerumque nulla, vel saltem difficilis & rara, superest curatio.

V.

In *curatione* cachexiæ generatim *pituitosa* sive *visci- Curatio*
sanguinis & humorum qualitas attenuanda est & cor-cachexiæ
genda, partesque solidæ laxæ seu debiles roborandæ. *Curatio*
 Iud fit 1. per *salia alcalica fixa & media*, vulgo *digestiva* dicta, ut sunt sal absinthii, card. benedicti, &c. tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, tartarus tartarizatus, terra foliata tartari, nitrum antimoniatum, &c. in forma pulveris; vel arcanum tartari, aut tinctura aperitiva Mœbii, vel liquor terræ foliatæ tartari, in forma liquida, bis, terve in die apta dosi exhibita.

2. Per certa quædam corpora *gummosa*, ut gummi ammoniacum, galbanum, hederæ, itemque myrrhata, opoetica, & succinata, maxime in forma pilularum: sunt *pilulæ balsamicæ* Beccherianæ, Stahlianæ aliæque similes, noctu præsertim per aliquod tempus dare.

3. Per *herbas ac radices amaras & aromáticas*, ut herb. absinthii, card. benedicti, centaurii minoris, trifolii fibrini, fumariæ, rosmarini, salviæ, capilli veneris, itemque per herbas antiscorbuticas dictas, ut sunt cochlearia, nasturtia omnia, cardamine, acriviole sive cardamindum, lepidium sive piperitis, draco herba sive Draconia, sedum vermiculare acre, armoracia sive raphanus marinus; ut & radices attenuantes, pimpinellæ albæ, helenii, vincetoxici, gentianæ, chorii, barbadanæ, aristolochiæ, rhabbarbari, ari, quinque aperientes, sub forma infusorum, decoctorum, aut vini medicati.

4. Per *ligna ita dicta antivenerea* sive exsiccantia ut lignum quaiaci, sassafras, juniperi, santalum citrinum, mixta uni alterive e radicibus modo laudatis, sub infusi vel decocti forma.

5. *Aromática*, ut cinamomum, cardamomum, calamus aromaticus, caryophilli, schœnanthum, piper, ginger, zedoaria, galanga, macis, bacc. juniper. sem.

4. carminativa, dauci cretici, corticis citri. & aurantiorum, cascarillæ, chinæ, in infusis pulveribus, tragæis, item pulvis stomachal. Birkim. & cachectic. Quercetani, Tragea aromat. Augultanorum, species diacinamomi, diagalangæ, &c.

6. *Tincture atque Essentiæ attenuantes & resolventes*, ut tinctura tartari, tinctura antimonii tartarifata, Elixirium proprietatis, Essentia lignorum, ligni sassafras, succini, scordii, fumariæ, trifolii fibrini, pimpinellæ albæ, helenii, alexipharmaca, absinthii, cardamomi, corticis aurantiorum, rhabbarbari.

7. *Omnia extracta amara, roborantia & aromatica*, ut absinth. card. bened. cascarill. millefolii, gentianæ, cent. min. trifol. fibrin. galangæ, calam. aromatici; vel in forma electuarii, vel pilularum, præsertim cum aloe, myrrha aliisque gummatibus mixta; vel etiam in aquis idoneis stomachicis vel vino hispanico soluta, admodum Elix. visceralis celebr. Hoffmanni.

V I.

Evacuandum u-
fus. —

Postquam sic horum aliquamdiu continuato usu pituitosi humores attenuati sive correcti, supervacanea abundans & resoluta eorum pars *evacuanda*; vel per infusa aut vina laxantia, vel per pilulas varias sæpe jam & adhuc §. V. modo laudatas. Quæ vero in robustioribus resin. jalapæ vel scammonii vel diagrydii, elaterii, trochisc. alhand. aut gummi guttæ aliquot granis pro ægrorum diversitate acui possunt, & subinde corrigentibus medicamentis interponi. Huic etiam scopo egregie haud raro satisfaciunt *emetica*, ex observatione præstantissimi Sydenhami, Werlhofii, nostra aliorumque, præsertim in iis, qui facile vomunt: ubi imprimis *aqua benedicta Rulandi* ab ℥i℥. ℥℥. ad ℥iij. humores abundantes, tam sursum quam deorsum, optime expellit, maxime si alternis diebus, vel etiam pro virum ratione longioribus intervallis repetitur: cum primis si observamus malum a prioribus dosibus minui.

V I I.

His (§. V. & VI.) aliquamdiu usurpatis, si æger inde melius rursus se habet, ultimo *tonus partium debilitatus denuo roborandus* est, & quidem interne per blan-

planda martialia, aromatica, & amara, ut tincturam vitrioli martis Zyvelfieri, tincturam martis cydoniatam, maturam martis cum elæosaccharo vel extractis amarum; vel per Mixturam tonicam, & spiritu C.C. cum tinctura tartari remixto, vel ex Essentia absinthii composita cum Essentia chinæ aut cascarillæ, vel & vina medicata amara & roborantia, quibus itidem cort. peruv. admiscendus, aliaque similia. Ita & *usus aquarum mineralium*, præsertim martialium aut thermarum legitimus ac circumspectus, ubi viscera adhuc integra sunt, & æger se movere valet, sæpe perquam egregius est; *alias vero ubi viscera corrupta*, aut æger jam nimis debilis, potius omittenda, ne ægrum, quem servare non possumus, occidisse videamur.

V I I I.

Externe fricationes pedum sæpe instituantur, iique, indecore intumescunt, fasciis, expellentibus dictis, doneo modo involvantur, vel aptis machinis ex corio vel linteo ad modum tibialium constructis, de quibus vid. Institut. nostræ chirurgicæ, Tab. 36. Fig. II. coercentur.

Remedia externa & dieta.

Dieta sit parca, facilis digestionis & leniter calefaciens; vitentur cruda, crassa, frigida, fructus horæi, acida, & refrigeratio. Conducunt vero calor moderatus, aromata, potus vini generosi in pastu vel meri, vel medicati, & motus frequens corporis.

I X.

Si *cachexia a febribus intermittentibus inveteratis, vel male tractatis oriatur*, primo ad humores noxios evacuandos lenia laxantia, ut pilulæ tartaræ, extract. panchym. Crollii, pilulæ nostræ polychrestæ, Beccherianæ, aliæve similes dandæ, ac deinde medicamenta antifebrilia, salina & amara, quo & tandem cortic. aurantiorum, cortex peruvianus & cascarillæ pertinent, sæpius usurpata, maxime conducunt, & præsertim etiam vina medicata, quæ præter alia amara, modo laudati cortices ingredientur.

Cachexia a febribus.

X.

(a) Confer. Cap. X. §. XXI.

X.

*Ab hæ-
morrhoi-
dibus
aut mē-
sibus
suppres-
sis.*

Si ab hæmorrhoidibus suppressis, tunc præmissis attenuantibus & evacuantibus §. V. vel VI. speciatim hæmorrhoides pellentibus supra Cap. VI. §. IX. & XVII indicatis, curatio est instituenda, & si hæmorrhoides ab his non revocentur, & tamen eas revocare velimus, *hirudines ano applicandæ*, vel venulæ tumente scalpello aperiendæ, aut si hoc nolimus, earum loca. Venæ sectio in pede est instituenda, quæ deinde præservationis gratia circa æquinoctia repetenda, subjuncti postea modo §. VII. laudatis remediis, idoneo victu & motu frequenti.

Cachexia a mensibus suppressis vel inordinatis quoque requirit, ut fluxus eorum restituatur atque in ordinem redigatur: quod quâ ratione fieri debeat, dictum est Cap. IX. N. VIII. & sequentibus: quibus postea modo dicta roborantia sive tonica cum eodem regimine jungenda.

X I.

*Si ab hæmor-
rhagiis
nimis.*

Si ab hæmorrhagiis nimis prægressis cachexia oritur, temperata blanda analeptica, emulsiones, gelatinæ, & juscula, maxime vero moderata diætâ adhibenda, ne copiosioribus alimentis chylus crudus indigestusque nimia copia generetur: quapropter & blanda stomachica ac roborantia, præsertim amara, itemque mixtura tonica sunt suadenda, vitando calidiora aromatica & spirituosâ, ne novus orgasmus aut ebullitio in sanguine excitetur, quæ alias novam facile hæmorrhagiam concitaret. Vinum rubrum bonæ notæ qua temperatum subinde modica copia roborandi finem concedi quoque potest.

X I I.

*Si a scabie
repulsa.*

Si a scabie repulsa, purgantia mercurialia & diaphoretica, sæpe jam laudata, alternatim adhibenda, speciatim vero inter diaphoretica Essentia helenii & ferri mariæ, itemque decocta lignorum, sive infusa eorum pugillaria calida, cum leni sudoris, matutino præsertim tempore, regimine, reliquis palmam præripiunt. His denique Mixtura tonica aliave roborantia jungenda.

X I I I.

X I I I.

De Chlorosi.

In cachexia virginum five CHLOROSI eodem fere *Chloro-*
modo procedendum, ut §. V. ad VIII. in cachexia *sis*.
generatim diximus: attenuantibus scilicet, evacuantibus,
roborentibus, bonaque diæta, & motu corporis.
Speciatim vero si a *mensibus suppressis* oriatur, post
longea attenuantia & evacuantia, danda sunt tempore
stantium mensium menses moventia Cap. IX. §. VIII.
& seq. adhibenda sæpe pediluvia, immo & V. S. in
medie versus tempus menstruum, præsertim in plethorici-
s. Quandoque, cum primis si viscera adhuc sunt fa-
ta, potus legitimus *aquarum mineralium*, præsertim
martialium, vel etiam *thermarum* usus, immo & cu-
ratio per *limaturam martis* subtilissime tritam, cum a-
maris vel aromaticis instituta Cap. X. §. XXI. valde
conducit; sin vero hæc non sufficiant, aut ægræ ea
adhibere nequeant, matrimonium in hoc morbo reme-
dum est ut plurimum certissimum & probatissimum.

X I V.

De Oedemate.

Speciatim vero in OEDEMATE curatio interna per *Oedema*.
attenuantia, amara & resolventia, ut in cachexia §.
ad VIII. incipi debet, & deinde laxantia sæpius
interponi; vel etiam pro re nata mox laxantia & at-
tenuantia conjungi possunt, vel sub forma infusi aut
mediamenti laxantis, vel pilularum balsamicarum Bec-
cheri aut similium, pedesque *fasciis* simul involvendi,
in peculiaribus tibialibus coercendi, æque matutino
semper tempore denuo firmandæ, si ægri eas sine in-
commodo & præsertim sine spirandi difficultate ferre
possunt, atque a frigore probe defendendi. *Aquarum*
martialium, vel & *thermarum* legitimus usus hic quo-
que perquam est egregius.
Sed si post *febrem intermittentem* oriatur oedema, ro-
boran-

borantia amara & aromatica, interpositis subinde laxantibus continuanda, pedes sæpe fricandi, corpusque motu frequenti probe exercendum. Quod si autem febris simul adhuc adsit, præter dicta ipso cortice peruviano præmissis tamen præmittendis, & febris & œdema, immo & hydrops febris superveniens, sunt curanda. (a)

Oedema a fluxibus suppressis. Si ab hæmorrhoidibus vel menses suppressis, hi debitis remediis, Cap. IX. §. VIII. ad XVI. propositis sunt restituendi, & si malum nondum inveteratum. Venæ sectio in pede apud plethoricos locum quoque habere potest; sin vero jam inveteratum, aut ægri valde jam debiles, Venæ sectio nocet, immo quandoque sphacelum in pede, ut ipse vidi, & mortem inducit.

Monitum de externis remediis. Cavendum, ne œdema facile solis externis, præsertim frigidis aut adstringentibus, aut emplastris tractetur; quia his humores vitiosi ad nobiliores & internas partes facile repelluntur, atque asthma, hydrops, inflammationes internæ, polypi cordis, catarrhus suffocativus, apoplexia & mors sæpe inducuntur. Medicamenta vero externa maxime idonea in Institutionibus chirurgicis nostris indicata sunt Part. I. Lib. IV. Cap. XVII. p. 347.

X V.

De Hydrope.

Hydrops anasarca & ascites. In HYDROPE, sive *Leucophlegmatia*, aut *Anasarca* sit, sive *Ascites*, curatio iisdem fere remediis ea instituenda, quæ in curatione cachexiæ generali §. V. ad VIII. hujus capituli indicata sunt: nam & hic humores pituitosi & abundantes partim corrigendi, partim evacuandi sunt, partesque debilitatæ tandem rursus roborandæ. *Evacuatio* tamen abundantium humorum, urgente malo, sæpe præmittenda est correctio

ni, i

(a) Conf. filii mei πύρ & ἀγίως Diss. de quartana & hydrope cort. peruv. curatis, Anno 1740. Helvæ stadii impressa.

ni, aut conjungenda, aut saltem per intervalla interponenda.

Maxime vero hic notandum, quod ex Sydenhamii Curatur observatione evacuatio sæpe, præsertim si ægri haud subinde difficulter vomunt, egregie per emetica obtineatur, & emeticis. imprimis per aquam benedictam Rulandi, apta, attamen satis larga dosi ab ℥ij. scilicet ad ℥iij. alternis diebus aliquamdiu, vel & pro virium ratione tertio quovis die mane exhibitam: interpositis deinde semper maris, roborantibus, tonicis, ac diureticis laudatis: ita enim quotidie fere aut post singulum usum aquæ illius benedictæ tumores & ventris & pedum minui sæpe observantur. Ergo ubi hunc modum ægro prodesse conspiciamus, (nam non sempe succedit) continuandus erit.

X V I.

Sed si hic curandi modus minus arrideat, aut æger nimis difficulter vomat, aut eo uti nolit, vel etiam *modi*. *Alii* inhibitus nihil proficiat, pro diversa dispositione ægri vel ad sudorem vel diuresin facilem, vel ad alvum laxam, evacuatio nunc melius per sudorem, nunc per urgantia instituitur: atque hic in primis valet illud dictum HIPPOCRATIS, quo natura vergit, ducenda. Maxime vero in anasarca sudorifera vel sola, vel roborantibus combinata, egregie sæpe profunt, præsertim decocto ligni quaiaci, vel sassafras sine vel cum radice bistortæ & cinamomo, vel cortice aurantiorum vel baccis juniperi, (quæ simul diuretica sunt) aliisque gratis aromatibus parata, cum regimine sudorifero: Quandoque sudoriferis. Quorum virtus multum augetur, si simul semper cum hoc decocto Essentiæ lignorum, pimpinellæ vel alexipharmacæ apta dosi assumatur.

X V I I.

Si urina adhuc bene & facile procedit, curatio per Curatio diuretica institui potest, ac diuretica vino rhenano, in per diuretica. superius autem cerevisiæ tenui infusa; ut radix vinetox. levistici, asparagi, petroselini, rusci, ononidis, cæ juniperi, alkekengi, &c. optime profunt, si sæpe in die ℥ij. vel ℥iij. bibantur; vel lixivium, præsertim illud quod SYNDEHAMUS in hydropo commendat,

dat, quoque conducunt: (a) itemque *salia media diuretica* subinde exhibita, vel liquor terræ foliatæ tartari, Tinctura antimonii acris, vel aperitiva Moebii, u. & succ. raphani vulgaris vel marini, qui armoracia dicitur, vel cum saccharo vel vino remixtus, sæpeque assumtus.

Electuaria quoque ex conservis & extractis amaribus a modum *Sydenhamii* parata, corrigendo humores vitiosos, urinam movendo atque partes laxas roborando sæpe sunt egregia.

Si æstus aut sitis vehemens ægros affligit, salibus illis diureticis mediis nitrum jungi & subinde præsertim vesperti exhiberi debet.

X V I I I.

Curatio per purgantia. Quando ægri alvum habent laxam, aut alias facili purgantur, medicamenta alvum ducentia eaque paullo fortiora, ut elaterium, vel gummi guttæ, aliave resinosa purgantia, quo cumprimis etiam pertinent *pilule hydropicæ Bontii* a ʒʒ. ad ʒj. exhibitæ, (b) sufficienti copia sæpius danda, cumprimis si illa commode ferunt & levamen inde sentiunt, interpositis tamen & subjunctis antea laudatis amaribus, roborantibus, diureticis, martialibus. Nonnulli hic etiam eundem in finem infusum *radicis bryoniæ* valde commendant. Alii sunt cum *radicis iridis palustris luteæ*, (c) alii vero pulverem *gratiolæ* ad ʒiʒ. vel ʒij. mane ex vino. Lenibus vero purgantibus plerumque nihil boni his in morbis effici solet. Conf. *Sydenham.* de Hydropo, qui aut fortiter aut numquam hic purgandum esse statuit.

X I X.

(a) Quod ita se habet. R. Ciner. genist. ʒ. j. infunde vini Rhenani ʒ. iv. frigide, stent per noctem postea liquoris filtrati ʒiij. mane & vesperti hora quarta vel quinta bibantur.

(b) Vide earum præparationem in *Junchenii* lexico Chym.

(c) Commodam ejus præparationem & usum c. *Werlhofius* observ. de febrib. p. 60. docuit.

X I X.

Si *hydrops* a febre intermittente ortus est, vel febris intermittens simul adhuc continuat, tunc utramque, *Curatio hydropis a febre.* gravissimum quamvis malum, divini corticis peruviani legitimo usu sæpe simul tolli potest, non neglecto tamen & aliorum roborantium idoneorum recto usu. Quae de re vid. filii differt. de quartana & Hydrope per corticem peruvianum curatis, An. 1740. edita.

X X.

Dieta servanda bona, motus corporis, quantum fieri potest, praesertim quando se movere adhuc possunt, *Dieta Hydro- picorū.* frequenter instituat; alimenta aromatibus sint condita, vinum generosum, cum primis rhenanum, modice usurpetur, praesertim herb. absinth. bacc. junip. & cortic. aurant. immo & cortice peruviano ac cascarillæ imprægnatum; ubi vero in pauperibus loco vini, *cerevisia diuretica* bonæ notæ sumi potest. Cerevisia vero rens & feculenta omnisque potus refrigerans & nimis remque spiritus vini vitetur. Si vero his non cedit, in *ascite* mature ad *paracentesin*, est confugiendum, de qua vid. Chirurgia nostra, non neglectis tamen interea & post eam remediis idoneis & apta victus ratione, ut modo præcepimus.

X X I.

Hydopes particulares, ut *hydrocephalus*, *hydrops pectoris*, *hydrocele*, &c. interne eodem modo tractandi ac *Hydopes particula- res.* achexia vel *hydrops universalis*. Reliqua vero, & praesertim externa, si interna illa parum proficiunt, ex Chirurgiæ nostris institut. peti possunt.

X X I I.

De Tympanite.

In TYMPANITE, quia humores pituitosi, relaxato toni viscerum & flatus in causa sunt, qui intestina & flaccida & ventrem adeo distendunt, roborantia &ve tonica & carminativa, resolventibus, amaris & alinis in hydrope laudatis miscenda vel interponenda, ut Essent. cortic. aurant. flor. chamomill. Essent. & spiritus carminat. &c. item limatura martis cum ex-

Tympanitis.

tractis amaris, ad modum Sydenhamii pro tono partium roborando, vel in forma pilularum vel Electuarii valde hic conducit. Singulo triduo vel quadriduo laxans vel e pilulis lenioribus, utpote balsamicis aliisque similibus, vel pulvere e jalapa & mercurio dulci, vel sale amaro cathartico exhibeatur: hisque per duas tresve hebdomades aut diutius prout necessitas exigit, continuetur; postea vero prælaudataonica sive roborantia, servato eodem regimine ac diætâ ut in cachexia & hydrope, subjungantur. Abdomini, olea destillata & balsama carminativa calide sæpe illini debent; vel emplastrum de cumino aut de baccis lauri, vel diasaponis imponi potest. Si alvus obstructa negotium facit, vel indicato purgante vel clystere carminativo, quoties opus est, solvatur.

X X I I I.

De Ictero.

Icterus.

ICTERUS est cachexiæ species, in qua biliosæ particulæ copiosius quam par est, per sanguinem totumque corpus, ac speciatim faciem & oculos diffunduntur, vel ob viarum biliariarum in hepate obstructionem, vel hepatis spasmodicam constrictionem, unde transitus bilis ex vena portæ in ductus biliarios impeditur, eaque hinc per venam cavam ex hepate ad cor abire cogitur, unde per totum corpus diffunditur, cumque, oculos & urinam potissimum colore flavo tingit.

X X I V.

Ejus curatio.

In curatione bilis & sanguis tenax ac viscidus iisdem remediis, ut in cachexia, §. V. ad VIII. dictum est, attenuandus ac resolvendus, maxime salibus digestivis Essentiis amaris, & infusis radicum & herbarum attenuantium aquosis, ad modum Theæ usurpatis, quibus ipsis etiam constrictio hepatis moderatur, & icterus plerumque optime tollitur. Speciatim vero præter modo indicata, hic egregie profunt radic. rhei, curcumæ chelidon. majoris, dulcamaræ, (a) pimpinellæ albæ herb.

(a) Hæc radix valde commendata est a Pekkeri i. Exercit. pract.

herb. marrubb. alb. hepaticæ nobilis, linguæ cervinæ, capilli veneris, cardui benedicti, *Anima* seu *Essentia* rhabarbari, aqua poratæ cochleatim usurpata, & denique *millepedes* vel in pulvere, vel electuario, vel succus eorum expressus, cum regimine diaphoretico, ita enim particulæ sanguinis & bilis viscidæ ac stagnantes resolvuntur, atque per ductus biliarios & cutim sensim expelluntur. Idem etiam obtineri potest legitimo usu aquarum medicatarum, quæ hic quoque valde egregiæ. Sapo tandem bene præparatus & purus, ac præsertim venetus aut hispanicus a ʒss. ad ʒj. bis terve in die exhibitus, non omissis infusis aqueis laudatis, tam in ictero, quam aliis cachexiis atque obstructionibus, ob vim ejus attenuantem, resolventem ac diureticam, valde hic prodest. Ita etiam *cortex peruvianus* cum salibus neutris sive mediis, tanquam insigne specificum in hoc morbo a quibusdam valde laudatur. Vid. *Camerarii* de hoc argumento peculiaris dissertatio.

X X V.

Si alvus hoc in morbo, ut plerumque fit, non rite succedit, dum *feces albæ, duræ & siccæ*, ut in canibus plerumque esse solet, rhabarbarum vel in pulvere vel in *Essentia* aquosa, vel in decocto sive potiuncula, si-
ne vel cum foliis fennæ, datum optime prodest: id quod etiam reliquis remediis, præsertim si morbus ab ea ortus est, sæpius interponendum.

Quando icterum æstus & sitis febrilis comitatur, salibus digestivis, nitrum & antimonium diaphoreticum, addenda, potusque sufficiens aqueus temperatus commendandus.

Vomitiva purgantia fortiora, *sudorque*, tam per medicamenta calidiora, quam per regimen coactus, plerumque nocent; lenis vero sudor seu transpiratio paulatim auctior, mane, præsertim in lecto, aqueis præsertim calidis producta confert.

Dieta tenuis ac parca, quæ in aliis cachexiis convenit, cum potu sufficienti tenui, itemque motus corporis frequens hic valde sunt necessaria, ira vero ac tristitia, ut & quies nimia, sunt fugienda.

X X V I.

De Scabie.

*Scabiei
cura.*

SCABIEM quoque, (quæ cachexiæ species est cum acrimonia) interne eadem fere remedia sanant, quæ contra cachexiam in universon §. V. ad VIII. propofita sunt: imprimis vero Effentiæ, pulveres & decocta vel infufa diaphoretica, ac fpeciatim Effentia fumariz, helenii, fcordii, alexipharmaca, fuccini, lignorum, ligni faffafras, Tinctura antimonii tartarifata, lapides cancrorum, antimonium diaphoreticum, antimonium crudum, & flores fulphuris parca dofi remixti, decocta radicum & lignorum, fpeciatim radicis lapathi acuti, cum regimine diaphoretico, non fudatorio, præmiſſis atque interpoſitis purgantibus ad materiam vitioſam evacuandam, quæ ſemper *mercurius dulcis* ingredi debet, egregie hic conducunt: hiſque aliis quamdiu, obſervata ſimul bona diæta, continuatis, levior ſcabies, ſine externis etiam adhibitis remediis, ſæpe cedit.

X X V I I.

Pertinacioris.

Quod ſi vero hoc non fiat, ſed *ſcabies* pertinacior ſit, atque prædicta remedia per dies circiter quatuordecim adhibita fuerint, *externe* vel unguento ex fulphure & axungia porcina, vel quod fere melius adhuc eſt, unguento mercuriali partes affectæ, imprimis articuli, quotidie ſemel vel bis calide inungi, & mane rurfus vel ſapone, vel furfuribus ex amygdalis, præſertim amaris, vel decocto avenæ, vel aqua calcis vivæ, vel lixivio antimonii diaphoretici, aut lixivio fulphuris aqua calcis vivæ parato, aut decocto radicis lapathi acuti, vel enulæ, vel herba ſaponariæ aut ſcabioſæ admixto pauco nitro antimoniato, tepide ablui poſſunt: continuatis interea prædictis purificantibus medicamentis internis, donec malum omnino cedat.

X X V I I I.

*Ferine
curatio.*

In *ſcabie maligna*, inveterata ſive *ferina* interne etiam, præter dicta, medicamenta mercurialia, alterandi ſine, ut *mercurius dulcis*, parca doſi, mane & vespere,

peri, vel solus vel cum sulphure antimonii remixtus, cum fructu dantur; vel si ægri sint habitus scorbutici, succi recentes herbarum antiscorbuticarum, ut cochleariæ, nasturtii, acetosellæ, numulariæ, &c. cum jusculis carniū vel sero lactis mane dati & aliquandiu continuati, valde hic sæpe profunt, quibus Essentia umariæ cum spiritu cochleariæ parata, ante meridiem & circa vespertum optime jungitur.

X X I X.

In *venerea scabie* frequens & moderatus usus mercurii dulcis mane scilicet & vespertini, cum vel sine sulphure antimonii, purgationes mercuriales sæpe repetiuntur, decocta lignorum ac radicum laudata, cum regimine diaphoretico paullo fortiori, præsertim mane in lecto, prædictæ essentia & unguentum aliquod mercuriale plerumque sufficiunt. Si vero malum gravius, aliaque adhuc morbi venerei symptomata adsint, curatio ut in ipsa lue venerea adhibenda.

Curatio
scabiei
venereæ.

X X X.

In *omni scabie vitandum* est frigus, cibi falsi, aromatici, acres, caro suilla, aliaque sale vel fumo inquinata, & nimia repletio, caveantque ægri, ne manuum, partes prurientes sæpius aut vehementius scalendo, exacerbent.

Vitanda
in scabie.

X X X I.

Quando a scabie intempestive retropulsa symptomata revertuntur, ut capitis dolores, difficilis respiratio, angustia præcordiorum, febres, epilepsia, asthma, &c. frigus vitandum; calor moderatus externus & remedia diaphoretica cum decoctis lignorum in lecto sunt adhibenda, ut essentia quædam diaphoretica, & pulvis exapidibus cancrorum, antimonio diaphoretico, arcanis applicat. cum parca copia mercurii dulcis & floribus sulphuris. Quod si vero ægrum calor simul febrilis scabie repulsa invasit, loco sulphuris pulveribus prædictis aurum nitri admiscendum. Numquam igitur curatio affectionum scabiosorum externis, præsertim mercurialibus aut sulphuratis incipienda, quia scabiem repellunt, & varia periculosa symptomata, immo ipsam mortem sæpe, præsertim in infantibus & debilioribus producant.

Retro-
pulse
tracta-
tio.

Sanguineis & succulentis præsertim, scarificationibus alias jam assuetis, *scarificationes* quoque in scabie valde profunt, quæ malum jam ad cutem propulsum melius educunt, quam Venæ Sectio.

XXX XII.

De Scorbuto.

Scorbutus quid.

SCORBUTUS est cachexiæ species, in qua sanguis spissus, quasi coagulatus sive grumofus & ad motum ineptus videtur, atque singularem corruptionem, & quasi putredinem, cum acrimonia, modo alcalica sive calida, modo acida sive frigida, modo salsa, concipit: unde dolores, maculæ rubræ aut lividæ in artubus, ulcera mali moris, fœtida, cruentationes & erosiones gingivarum ac dentium, os fœtidum, debilitas & lassitudo totius corporis, anxietates circa præcordia, aliaque symptomata proveniunt.

XXX III.

Ejus divisio & causæ.

Dividi, mea quidem sententia, optime potest in *alcalicum* sive calidum; *acidum* sive frigidum, & *salsum*, ubi ægris sapor salsus semper in ore adest. *Causa scorbuti calidi* sive *alcalini* est nimia copia salium alcalinorum in sanguine, eoque calidioris temperamenti homines corripuntur, itemque illi, qui in calidiores, remotiores regiones iter per mare faciunt: ubi salia sanguinis per calorem nimium in alcalica transmutantur, quæ deinde effectus scorbuti producant. *Contrario scorbutus frigidus* sive *acidus* in frigidioribus potissimum regionibus dominatur, & non solum harum incolas, ac præsertim qui circa maritima loca habitant, invadit, verum etiam qui navibus longinquæ itinera per mare in boreales regiones faciunt; ubi tamen præcipue illos affligit, qui otio indulgent & corpus non satis motu aut laboribus exercent: quibus causis cibi crassiores & potus assumti in ipsis quasi acescunt, atque sic acrimoniam acidam, una cum viscido, in sanguine producant. *Scorbuti salsi* causæ videntur quam maxime cibi salsi, & cum primis frequens ac nimius usus salis, itemque carnum & piscium sale

mari-

marino conditorum, qui sensim efficiunt, ut sal salinum sive muriaticum in corpore ac humoribus prædoninium adipiscatur.

X X X I V.

Præter signa generalia in §. 32. indicata, *alcalicus* & calore p. n. rubore faciei, oris & labrorum; frigidus sive *acidus* ex sapore, sudore & ructibus acidis, febris & oris parte interna pallida, alba vel cœrulea, pallore & frigore corporis cognoscuntur. In *salso* vero scorbuto sapor salus fere semper in ore adest. Quo leviora vero vel graviora symptomata adstant, eo facilius vel difficilius curatur.

X X X V.

In *curatione*, generatim viscidum & acre corrigendum, atque impurum per sudorem & urinam expellendum. Quem in finem generatim profunt decocta & infusa aquosa, diaphoretica, in scabie laudata, & in nimis decoctum radicis cichorii, lapathi, bardanæ, porzonæræ, sassaparillæ, chinæ & ligni sassafras, si modo corpus contra frigus probe muniatur, in perpetua transpiratione conservetur, ac frequenti motu exercetur. Cibus vero parvus ac potus tenuis, aquosus si temperatus sufficienti quantitate assumatur, præsertim in scorbuto calido & salso. *Aquarum tandem vel medicatarum vel & simplicium purissimarum usus* legitimus, Curatio generallis. per plures dies aut hebdomades continuatus in quocunque scorbuto præstantissimus est: quia optime diluunt viscidum atque omnem acrimoniam egregie corrigunt, temperant, atque eluunt, ita tamen, ut in sanguineis, calidioribus & robustis, prægressa Venæ sectione, mas acidularum, Pyrmontensium nimirum, Sualbacenarum, Egranarum, Spadanarum, &c. in frigidioribus vero debilioribus aquarum temperatiorum, ut Selsenensium; & Thermarum, ut Emsensium, vel Wisbadensium, Carolinarum, Aquisgranensium, usus, & quidem in his calidus, in illis frigidiusculus fere præferendus videatur.

X X X V I.

Speciatim vero in iis, qui calidioris sunt temperamenti, sive scorbuto calido laborant, utpote in quibus acrimonia alcalica peccat; præter remedia temperantia & diluentia generalia, conducunt quoque & alia Curatio specialis scorbuti calidi. mode.

moderata *medicamenta acidula*, ut acetosa, acetosella, succus citri, aurantiorum, pomorum sinensium, cerasa, fraga, rubi, ribesia aliique fructus horæi, maturi, græte acidi. Præterea *tincturæ acidulæ*, ut rosarum, florum bellidis, aquilegiæ; papaveris rhead. itemque condimenta & embammata acidula, ac denique nitrum & nitrum antimoniatum, cum pulveribus temperantibus succo citri aut limonum, vel aceto saturatis subinde data; vitando omnis generis calefacientia & spirituosissima, atque imprimis antiscorbutica calidiora, ut cochleariam, nasturtium, raphanum rusticanum sive armoraciam, sinapi, aromata, & inde parata. Prodest hi etiam egregie *potus feri lactis*, lactis ebutyrati, præsertim verno tempore, mane quotidie ad libram unam vel alteram hausti; vel & *aquæ medicatæ* aliæve puræ frigidæ, legitime usurpatæ.

X X X V I I.

*Scorbuti
frigidi.*

In *frigidioribus* vero, sive qui *frigido scorbuto* laborant, qui septentrionalibus valde familiaris est, popularis, & in quo *acidum* ac *viscidum* præcipue peccant videntur, stricte sic dicta *antiscorbutica acriora*, sive *alcalica*, ut cochlearia, nasturtium, lepidum, beccabunga, chelidonium minus, sedum acre, vermiculare raphani quicumque & præsertim rusticanus dictus, sinapi, cepæ & alium in substantia, jusculis medicatis & in cibo conveniunt. Ex præparatis vero imprimis hic conducit vel spiritus cochleariæ, vel Essentia fumariæ cum spiritu cochleariæ parata, aliquoties in die usurpata, itemque amara quæcumque & præparata e eis, vel in forma infusi, aquosi vel vinosi, essentia vel extracti: ut fumaria, trifolium fibrinum, carduus benedictus, chærefolium, radic. cichorii, lapathi acuti, chinæ, sassaparillæ, vel etiam in forma decocti interpositis subinde lenibus laxantibus. Præterea etiam ex prædictis herbis *antiscorbuticis*, *acribus*, *succus recens expressus*, ad cochlearia duo vel tria conducit, vel cum jusculo carnis tenuioris prius coquantur jusculis medicata fiunt efficacissima, si quotidie per aliquod tempus, subjuncto motu, matutino tempore, usurpantur. Speciatim vero & *cochlearia* & *nasturtium* vel in succo, ut modo dictum est, vel tenuiter tantum disse-

cta,

ta, cum vel sine paucō saccharo, utilissime sæpe ab his comedi possunt: quibus omnibus vero aliquamdiu um debito regimine & diætā continuandum. Essentiæ ignorum; ligni assafras & tinctura antimonii tartarizata hic quoque, ut in plerisque sanguinis impuritatibus, valde egregiæ sunt.

X X X V I I I.

In ea denique *scorbuti specie*, quæ *salsa* dici solet, *Scorbuti bi ægri continuo falsum saporem in ore* percipiunt, præ-*falsi*.
er aquas medicatas modo laudatas, aut simplices alias purissimas, rite præparatæ *aquæ calcis vivæ* legitimus usus internus ac diuturnus, a libra una ad duas eam quotidie mane, immo & circa vesp̄eram bibendo, pro summo specifico merito habetur, vitando simul abusum salis, carnesque & pisces salitos.

X X X I X.

Contra *stomacacem sive gingivarum erosionem ac cruentationem*, una cum laudatis internis medicamentis, externe utiliter adhibetur Tinctura gummi laccæ, quæ gingivæ mane & vesperi leniter fricantur; vel Essentia myrrhæ aut succini; vel mel rosarum spiritu salis vel succo citri leniter acidulatum, vel *sal culinare* leniter contritum, quo dentes eadem ratione bis vel ter in hebdomade blande fricantur, quod ultimum etiam mentium sordes ac putredinem egregie expurgat. Itaque *myrrha* sæpius manducata & aliquandiu in ore detenta, immo & si dentes ea fricantur, contra hæc vitia perquam utilis est; vel electuario ex myrrina, sanguine draconis, radice bistortæ, nuce moschatæ & paucō alumine crudo vel usto, cum melle rosato parato, gingivæ subinde graviter detergantur. *Salvia* etiam ejusque infusum aqua vel vino, præsertim umbro utiliter pro abstergendis sæpe gingivis putridis cum fructu adhibentur. Si *myrrha* & *terra japonica*, vel *rosmarinum* & *muscus pruni sylvestris* in vino ruetro decoquuntur, eisque gingivæ sæpius eluuntur, egregie quoque eas mundant ac gingivas firmant.

X L.

Ad maculas scorbuticas abigendas, interne laudata diaphoretica, infusa nimirum calida radicum, herbarum & lignorum, Essentia alexipharmaca, lignorum, *Macularum scorbuticarum*.
M. S.

M. S. pulveres diaphoretici cum evitatione frigoris lenique subinde sudore mane in lecto excitatio, adhibenda, & si forte post horum usum aliquandiu continuatum non evanescant, externe aqua calcis vivæ, calide quotidie pauco spiritu vini camphorato acuata ablui possunt; vel etiam unguento ex mag. marcasitæ mercurio præcipitato albo & unguento rosato, vel etiam ex duobus ultimis solis paratum his maculis vel peri inungi.

X L I

*Dieta
scorbuti-
corum.*

In *Dieta*, scorbutici calidi, omnia calefacientia, acris, salsa, aromatica, & spirituosæ; frigidi contra acida refrigerantia, utrique vero crassa & quæ difficulter concoquuntur, nimiamque alimentorum copiam vitare debent: & quoniam sæpe plethora concurrit, præsertim in calido, Venæ sectio vere & autumno & præservandi & curandi scopo utiliter adhibetur. Frigidi etiam vitent, quantum fieri potest, aerem frigidum & humidum, quærantque contra calidum & siccum, atque aromatibus & antiscorbuticis in cibis, ut zingibere, sinapi, cinamomo, cardamomo, caryophyllis, macæ, nuce moscata, pipere, armöracia, nasturtio, cochlearia, aliisque moderate calidis modice utantur calidiores vero contrarium observent.

X L I I.

Scorbutus & L. V. non confundenda.

Denique vitanda est scorbuti & luis venereæ confusio: hæc enim, licet varia signa ac symptomata curæ scorbuti habeat communia, tamen antiscorbuticis plerisque, præsertim acrioribus, non curatur, sed potius exacerbatur; ille vero, & cum primis alcalicus sive calidus, plerumque per mercurialia, præsertim fortiora itemque per purgantia ac sudorifera valentiora redditus deterior. Ubi vero complicata sunt lues venerea & scorbutus, ut sæpe fieri solet, illa suis medicamentis prius aggredienda atque expurganda, & postea quoque scorbutus, nisi jam simul, ut sæpe fit, illius remedium sublatus sit. Tandem adhuc indicare volui, quod bona *dieta* §. 41. indicata, motus frequens corporis, & potus sufficiens temperatus, præsertim aquosus, præcipua sint scorbuticorum tam ad præservandum quam curandum remedia atque asyla.

X L I I I.

De Morbis Venereis.

MORBI VENEREI præcipui sunt *Gonorrhœa*, & *Morbi*
 a dicta *Lues venerea* cum suis symptomatibus; ad *venerei*
 quas ceteri omnes referri possunt. **GONORRHŒA** & I.
 vero est vel *benigna* vel *maligna* sive *virulenta*. *Beni-* *Gonor-*
ghœa dicitur fluxio seminalis materiæ ex urethra, quæ *rhœa*.
 ne dolore & inflammatione; sed potius a laxitate,
 debilitate, sive atonia glandulæ prostratæ, vesicularum
 seminalium, aut ductulorum in urethra. **MORGA-**
NI, vel ab exulceratione post gonorrhœam virulen-
 tam relicta provenit; oriturque vel sine contagio im-
 puro venereo, a nimio coitu, nimis pollutionibus,
 at aliis nimis feminis profusionibus quibuscumque;
 vel post gonorrhœam virulentam vel frequentiore,
 vel diuturniore, non satis curatam, veneno licet
 venereo destructo aut sublato. *Virulenta* contra, sive
maligna inflammationem, dolorem & exulcerationem
 urethra, a contagio venereo sive coitu cum impura
 lue venerea affecta contractam, pro causa ha-
 bet, dolores hinc acerbos creat, cum ardore vehemen-
 ti in urethra, præsertim quando ægri urinam emit-
 unt, atque materia excreta purulenta, virescens &
 quandoque sanguinolenta existit. Superveniunt sæpe
 inflammatio & tumor præputii, tumores testiculorum do-
 rifici, bubones in inguinibus, (*poulains* Gallis) ulce-
 ra in præputio, aut glande penis, *chancres* vulgo di-
 cta, *priapismus*, *phimosis*, *paraphimosis* aliaque mala,
 immo haud raro ipsa *lues venerea*, præsertim si vel
 negligitur, vel non rite curatur. Atque ex his diagno-
 sticis & differentias utriusque gonorrhœæ, una cum parte
 cognoscere patere existimo, & hoc solum hic adhuc
 addimus, quod gonorrhœa benigna inveterata ut plurimum
 difficilius quam maligna & recens curationem admittat,
 partes læsas nimium quantum relaxatas ac debilita-
 tas, adeoque & ab hac curationem nostram auspicabi-
 tur, atque de benigna deinceps acturi sumus.

*Curatio
virulen-
te.*

In *curatione igitur virulentæ* ad expurgandum viru-
venereum incipiendum a *potu frequenti* ptisanæ tenui-
ris, temperantis, sirupo dialtheæ parum edulcoratæ
atque idoneis *purgantibus*, iisque aliquoties repetitis
vel ex pulv. jalappæ idonea copia, vel extract. pa-
chym. Croll. vel ex pulpa Cassiæ, (quibus semper me-
curius dulcis, tanquam præstantissimum gonorrhœæ an-
tidotum, apta portione, admiscendus) constantibus
Deinde ulterius pro corrigenda ac destruenda mater
virulenta bis in die vel sæpius *decoctum* ex radicib.
antivenereis, sed absque regimine sudorifero, assuman-
ac simul cum hoc præsertim in frigidioribus, Essenti-
& Tincturæ, quæ in scabie & scorbuto laudatæ sunt
propinentur. Inprimis vero hic valent Tinctura an-
monii tartarifata, Essentia lignorum, pimpinellæ albæ
& Succini. In *calidioribus* vero ac *sanguineis* pro dolo-
re, priapismo molestissimo, & ardore mitigando *sa-*
guis mittendus, & pulvis temperans ex lapidibus ca-
crorum citratis, conchis aceto præparatis, nitro
camphora compositus sæpius exhibendus, eisque inte-
posito subinde, quovis, verbi gratia, triduo, conve-
niente purgante, per duas circiter hebdomadas vel diu-
tius, pro symptomatum gravitate continuandum, donec
nec fluxus seminalis vel purulentus, dolor aliaque sym-
ptomata valde remittant, vel omnino cessent.

X L V.

*Quid
subactio
veneno
venereo
agendū.*

Quod si vero, ardore & dolore cessante, fluxus
tamen materiæ albæ blandæ adhuc continuet, id quoque
virus subactum & destructum indicat, tunc *specificus*
fluxum hunc sistentia, præsertim os *sepiæ* sæpius par-
dosi exhibeatur, & vel cum Essentia balsamica
balsamo copaivæ aliquandiu continuetur, donec omnis
no cesset. Servanda vero simul diætâ tenuis, vitanda
venus, vinum, spiritus vini, motus vehementior
omnis excessus. Pro *ordinario potu* inservit vel ptisana
vel simplex decoctum hordei aut avenæ, præsertim
sirupo dialtheæ modice edulcatum.

X L V I.

*Quid in
malo co-
tumaci.*

Quod si *malum contumacius*, cuivis dosi pulveris
sis *sepiæ*, sacchari saturni, gr. i. ij. vel in robustioribus

buc

us tria admisceantur, aut *pilule Blancardi* contra gonorrhœam, ex gummi. elemi, mastichis ā zij. & terra catechu ℥j. constantes, a ℥ss. ad ℥j. vesperi quotidie vel alternis diebus cum fructu usurpantur, immo & prædicto pulveri adjungantur *Injectiones in urethram* principio lenientes, ex lacte vel decocto hordei aut avenæ cum melle rosarum; circa finem vero adstringentes & roborantes, ex aqua plantaginis & calcis vivæ cum saccharo saturni, vel lapide medicamento Rollii, aut paucō spiritu vini camphorato remixta cum fructu adhibentur.

X L V I I.

Bubones & ulcera venerea, præputii & testium tumores, aliaque hujus morbi symptomata, interne eodem, ut gonorrhœa recens, modo tractanda; externa vero curatio ex Chirurgia nostra prolixius peti potest: terea tamen præcipua hic trademus. Igitur si *inflammatio vel tumor præputii*, quæ sæpe vel *phimosin* vel *eraphimosin* constituere solent, adest levior, egregie scutitur, si spiritus vini vel simplex vel maxime camphoratus, tepide sæpius illinitur, cavendo, ne pars forte erosæ eo tangantur, eoque ipso dolores vehementiores moveantur, aut fomentum cum splenio sæpius applicetur ex aqua calcis vivæ, paucō spiritu vini camphorato roborata, addita cerussæ præparatæ, vel hargyrii portione. Sin vero jam vehementior, aut ædicta parum sunt, unguentum album camphoratum, mixto paucō mercurio vivo, aut præcipitato albo, sæpius illinatur, & subinde decocto calido ex emollientibus & solventibus cum lacte parato aliquamdiu foveatur, vel eidem tepidæ penis per aliquod tempus amittatur, donec tumor dispareat.

X L V I I I.

In glandis aut præputii erosione sive ulcere (chancre). Ulcera quæ calcis vivæ paucō mercurio dulci vel præcipitato po roborata, subinde abstergatur, & deinde oleum orum & philosophorum, partibus æqualibus mixtum, applicetur, quod oleum philosophorum etiam fungosas rum ulcerum excrescentias, consolidationem impediens, quia lenissimum septicum est, tollit. Ita & unguentum ex mercurio vivo, terebinthina, quantum
suf.

sufficit, subacto, & unguento rosato paratum, alia-
 unguenta ex mercurio confecta egregie hic conducunt

X L I X.

Bubones. Si ex gonorrhœa nimis cito per adstringentia sup-
 pressa *bubones* aut *testiculorum tumores* orti, illa purgatio-
 nibus sæpe repetitis ope mercurii dulcis decoct. ligne-
 rum, & Essentia succini, alexipharm. vel pimpinel-
 alb. revocanda, & postea, ut §. XLIV. propositum
 est, curanda. *Externe* vero bubones sæpe fricandi un-
 guento mercuriali gryseo, atque Emplastr. diachyl. cum
 mercurio vivo roboratum superaddendum. *Si vero jam*
in abscessum vergunt, emplastro diachylo cum gummi-
 vel de meliloto suppurandi, atque in Chirurgia docu-
 mus, aperiendi ac persanandi.

L.

Testicu- *Testiculis* vero *tumidis* vel aqua calcis vivæ cum sp-
lorum ritu vini camphorato & cerussa, splenii beneficio ca-
tumores. de imponenda, vel cataplasma ex mica panis cum l-
 æte & croco cocta paratum; vel decoctum oryzæ sp-
 sum cum lacte, aliudve simile supra dandum; &
 tumor valde rursus imminutus est, reliquum emplastr-
 de ranis cum mercurio vel diaphoretico *Myns.* vel
 cumino, optime resolvitur; usurpatis simul interre-
 modo §. præcedenti laudatis.

L I.

Gonor- In GONORRHŒA BENIGNA, quæ difficilis
rhœæ be- plerumque, ut dictum est, sanatur, quam maligna
nignæ ad diffundendum serum superfluum partesque laxas ro-
curatio. randas, conducunt frequens motus corporis, decocta
 gnorum cum radice tormentillæ vel bistortæ ac pim-
 nellæ albæ parata, & essentia lignorum, pimpinel-
 albæ, succini, alexipharmaca, aliquoties in die ha-
 sta, interpositis subinde laxantibus mercurialibus & sp-
 ciatim pilulis nostris polychrestis, aliisve similibus
 Quibus post aliquod tempus, si prædicta non suc-
 ciant, fortiora roborantia & moderate adstringentia ad-
 jungenda ac subjungenda: ut pulvis ex osse sepiae
 croco martis, vel pilulæ Blancardi contra gonorrhœam
 supra §. XLIV. laudatæ, itemque Tincturæ martialis
 aut Mixtura tonica, ex Tinctura tartari cum spiritu
 C. C. remixta; vel & infusum vinosum ex roboran-
 bus,

us, ut radic. bistortæ, tormentillæ, pimpinellæ cum cortic. aurantiorum, ac præsertim etiam cascarillæ connectum. Externe injectio roborans ex aqua calcis vivæ cum paucis sacchari in urethram, vel ex aqua calcis vivæ, vel plantaginis cum paucis spiritu vini camphorato supra jam laudata, valde etiam hic conducit. Dieta simul sit parca, siccans & roborans; bibant subinde vinum Pontac dictum, vel aliud simile modice adstringens; vel etiam illud cum aqua mixtum divitiis pro potu ordinario concedi aut suaderi apte potest. Denique etiam opus est, ut ægri illo tempore a venere abstineant, donec curati sint, atque etiam postea frequentiores venerem diu evitent.

L I I.

De Lue venerea.

LUES VENEREA est cachexiæ species, in qua *Lues venerea.* sanguinis singularem crassitudinem & acrimoniam, ut plurimum, a contagio per impurum congressum suscepit: unde stagnationes, dolores capitis & artuum præsertim noctu ingravescentes, artuum lassitudines, maculæ rubræ & crustæ sive & scabies in variis partibus, præsertim in facie, fronte, & capite, tumores, erosiones & ulcera partium mollium æque ac durum, imprimis in partibus genitalibus, labris, palato, faucibus, & naribus, eveniunt, ita tamen, ut hominum symptomatum modo minor, modo major copia sit. Sæpius sequitur gonorrhœam, vel in mulieribus et fluxum album virulentum, intempestive suppressum neglectum; vel quod frequentius, bubones aut ulcera venerea (chancres) in partibus genitalibus neglecta et male tractata; unde fermentum sive virus venereum totam massam sanguineam ipsasque partes solidas facit ac lædit.

L I I I.

Dividi apte potest hæc Lues in leviores & vehementiores. LEVIOREM vocamus gradum, si malum tantummodo in humoribus adhuc existit, & lassitudine, tempore, doloribus capitis & artuum, nocte ingravescentibus, retro faciei colore, maculis lividis, scabie

Ejus divisio.

Q capi-

capitis aut frontis, vel etiam bubonibus, aut levioribus ulculculis in partibus genitalibus vel faucibus, & se manifestat. *Sin vero partes solidas*, ut fauces, uvam palatum, nasum, penem & præcipue ossa palati, na aut cranii jam invasit, & quidem jam vehementius ita ut vel uva exesa, vel septum nasi aut palatum erosum, vel omnino jam perforatum, tumoresque hi inde sive nodi venerei, & graviores aliæ exulcerationes oriantur, *gradus hujus morbi est vehementior*, periculosior, curatuque longe difficilior: immo quo plura & pejora adsunt symptomata & læsiones, quo diutius jam duravit, quo corpus magis extenuatum ac consumptum, & quo magis jam vires destructæ, eo difficilius curatur, aut quandoque, præsertim ob virium defectum, prorsus est insanabile. Qui a juventute si a matre, sive a nutrice impura jam infecti sunt, omnium difficillime, aut prorsus non curantur.

L I V.

Curatio
gradus
levioris.

In *curatione* igitur Luis venereæ virus venereum expellendum, destruendum, & cachexia illa peculiaris corrigenda: id quod in leviori, vel saltem non ad vehementi gradu, *sine salivatione* & solum attenuantibus, sudoriferis, maxime decoctis lignorum, ut ligni assafras, quajaci, juniperi, radice saraparillæ, china, bardanæ, pimpinellæ albæ, ut & herba saporariæ, mane & circa vesperam, vel sæpius larga copia datis, præmissis & interpositis sæpe purgantibus mercurialibus, haud raro obtineri potest; cum quibus tamen decoctis Tincturæ antimonii tartarifatæ, Essentia lignorum vel pimpinellæ, &c. majoris efficacæ causa apta dosis semper exhibeatur, adjuncto regimine diaphoretico aut blande sudorifero, mane vel in lectulo, vel quod nonnullis magis placet, in stuphis arcubus sudatoriiis. Certius tamen & melius succedet curatio, si simul singulis vel alternis diebus parva dosis mercurii dulcis vel panaceæ mercurialis exhibetur vel & quotidie unguento mercuriali tarfi ac mallei pedum, itemque flexuræ cubiti probe fricantur, iisque prudenter continuatur, (vitando salivationem) donec symptomata sublata sint. *Frigidioribus*, plegmaticis succulentis temperamentis pro decoctis illis magis

gna;

na; calidioribus vero & macilentioribus, radices & herbas laudatas, tamquam temperatiores, præscribere solum, & pro potu ordinario decoctum secundarium harum radicum, vel & ptisanam.

L V.

In graviore aut inveterato malo, maxime ubi partes vitales, fauces, palatum, nasus, frons, immo ossa erosa, tumores duri & dolores osteocopi fixiores, c. adsunt, *sudorifera hæc cura sæpe non sufficit*, sed fortior usus mercurialium, verum absque salivatione, attamen ad instantem usque salivationem, vel ipsa salivatio mercurialis requiritur, quæ medicamentis vel internis vel externis solis, vel ambobus combinatis, que vel leniori vel fortiori modo, excitari potest. Sique præmittenda una aut altera lenis purgatio mercurialis, ususque aliquot dierum decocti lignorum aceticum primarii & secundarii, modo laudatorum, lassis, itemque diæta moderata tenuis, atque in plethorâ quoque sanguinis missio.

L V I.

Sique deinde internis salivationem excitare lubet, Quomodo salivatio instituetur.
mercurii dulcis (qui inter mercurialia securissimus mi-
videtur,) gran. V. VI. VIII. vel X. pro subjecto-
n diversitate, bis, terve in die, sub boli, pilulâ-
n, vel pulveris forma ægris exhibeantur, donec tu-
or faucium & gingivarum, anima foetida, exspuitio
prior, aliqualis erosio linguæ, labrorum, genarum,
gingivarum, dentiumque vacillatio, tanquam lenis
vationis signa appareant; quæ si incidunt, ab usu
mercurii desistendum, & interea decocta & ptisana
a continuandum, donec fluxus salivæ sufficiens sen-
sequatur; & si postea quotidie libræ duo vel libræ
s circiter intra horas XXIV. exspuantur; sufficit:
que sic per hebdomades tres, quatuor, quinque vel
, donec symptomata, maxime dolores, tumores &
era, valde sint imminuta, aut prorsus evanuerint,
tinuetur, exhibendo subinde, si minui salivatio vi-
ur, circa vesperam, aliquot grana mercurii dulcis
panaceæ mercurialis: atque hoc modo salivatio per
longum tempus continuanda: nam brevi tempore
graviori malo curatio plerumque absolvi recte ne-
quit,

quit, sed malum si non satis diu continuatur facile potest hanc curationem recrudescit.

L V I I.

In nonnullis laudata *mercurialia salivationem habent* producant, sed parum sunt, præsertim in robustioribus; quibus in casibus, si aliquamdiu frustra adhibita fuerunt, singulæ dosi mercurii dulcis aut panaceæ, *turpethi mineralis* gran. ij. vel iij. admisceo, sic plerumque brevi inde succedit; sed his deinde in casibus interdum remediis etiam salivatio, si minui incipit, est continuanda, quamdiu malum eam exigit.

L V I I I.

Quid post salivationem agendū. Postquam sic symptomata maxima ex parte vel intantum evanuerunt, decocta sudorifera aliquamdiu cum regimine diaphoretico sunt continuanda, ad malum remanens dicitur extirpandum, interponendo simul subinde vespere pauca grana mercurii dulcis, ad lenem salivationis vestigium adhuc aliquamdiu conservandum, donec omnia mala sublata sint.

L I X.

Quomodo per externam excitetur. Si vero externis salivationem instituere placet medicamentis, unguentum mercuriale, ex mercurio crudo cum axungia porcina paratum, inungitur primo quotidie bis aut ter calide tarsis pedum, malleolis & suris, singula vice fabæ aut phaseoli magnitudine: & quidem melius ab ægro ipso quam ab alio, ad ignem vel fornacem, linteo postea involvendis, & si post alterum tertiumve diem nulla adhuc salivationis signa adsunt, etiam flexuris cubiti, immo & parotidibus sub augebus, æger mercurium inungat, partes unguento probe ac calide fricando, donec salivatio sequatur sufficiens; ubi ab inunctione abstinendum, quamdiu salivatio satis fluit: quæ vero fricatio cum unguento mercuriali, quoties salivatio minuitur, vespere iteranda, involutis semper partibus inunctis per lintea & fascias, & sic sic circumspecte continuandum, ut antea dictum est, donec malum sublatum est.

L X.

Quomodo utraque ratione. Quando internis & externis remediis simul salivationem producere volumus, quotidie semel vel bis parva dosi mercurii dulcis exhibetur, & simul semel vel

fric-

icatio pedum & crurum vel & cubitorum, si lubet, affuitur, eisque continuatur, donec salivatio sequatur. Nonnulli etiam spinam dorsi unguento mercuriafricant; verum quia hoc facile varia damna producere potest, & antea §. 59. descripta satis efficax est, hoc abstinendum esse censeo.

L X I.

Interea dum hæc fiunt, atque durante etiam salivatione, os sæpe aqua calida aut *gargarismate* emolliente *Quid durante* aatur, *potus* assumatur sufficiens, aquosus, diluens, *salivatione faciendū.* mane & a meridie decoctum aliquod radicum & liquorum huic morbo contrariorum, reliquo diei temporis vel decoctum hujus secundarium, vel ptisana aut decoctum hordei cum passulis, vel cum liquiritia & nine anisi aut fœniculi paratum, immo & cerevisia quis bonæ notæ, quandoque, si eam anxie desiderat, concedi potest, itemque Thea & Coffe: sed si forte, ut sæpe contingit, temporis tractu fiat desis, interponi subinde potest mixtura ex aquis cordiatis, vel emulsio similis, itemque gelatinæ roborantis: sique æger a lacte non abhorret, decoctis prædictis semper aliquid lactis calidi admisceri, immo lac in pane triticeo calide pro cœna, immo & pro prandio cum fructu dari apte potest, præsertim macilentis debilibus.

L X I I.

Dieta sit parca & tenuis, ex solis fere jusculis, ac, *Dieta.* plus appetant, cibis mollioribus sive facilis digestionis constans; vitentur vero aromata, falsa, acida, dura & crassiora, caro suilla, lardum, legumina, odoriora, repletio nimia, ac frigus, corpusque semper in aere temperato ac leni diaphoresi conservetur, nondum salivatio durat, corpusque & mens sint tranquilla.

L X I I I.

Si salivatio oriatur nimia, & fauces nimis quantæ intumescunt, ita ut periculum suffocationis imminere, mox vel clyσμα forte, vel purgans aliquod vehementius, sed sine mercurio, ad affluxum ad fauces nimium revellendum, exhibeatur; idque, si necesse, repetatur, donec rursus detumuerint. *Cautela.*

2. Quando una salivatio morbum non omnino sustulit aut ob ægri impatientiam vel debilitatem satis diu continuata non est, post aliquod tempus, vel etiam redeuntibus venereis symptomatibus, repeti potest præsertim si æger robustus, & salivatio prior facta fuerit.

L X I V.

De usu salivationis in aliis morbis. Denique notandum, salivationem non solum contra morbos venereos prodesse, verum etiam in multis aliis morbis pertinacibus & gravibus, ut amaurosi, cataracta, ulceribus rebellibus, scabie pertinaci, tumoribus &c. sanandis adhiberi posse.

L X V.

Symptomata morbi venerei. Scirrhi, Tophi sive nodi venerei sub usu laudatorum medicamentorum antivenereorum & cumprimis salivationis, plerumque digeruntur ac dissipantur, præsertim si nondum inveterati, & si sub ea simul empl. vigeret cum duplo vel triplo mercurii, vel diachylum cum mercurio superimponitur, & unguento mercuriali tractantur. Sin vero dissipatio, uti quandoque contingit, obtineri non possit, tophi scalpello aperiendi, mercurio præcipitato rubro, unguentis admixto, mundandi, ac sic, ut ulcus, consolidandi. Scirrhi vero quando solvi nequeunt, si tuto id fieri potest, & ægri abscindi liberi esse volunt, excindendi.

Ulcera venerea externa curatione generali sæpe sanantur, sine peculiari sæpe ad ea attentione. In aliis tamen melius agimus, si ea simul mundantur mercurio præcipitato rubro, unguento basilico vel digestedo modice intermixto, vel aqua phagedenica, & deinde unguento mercuriali, vel essentia lignorum vel succi myrrhæ aliave simili sanantur.

Ulcera faucium venerea, præter curationem internam sæpius abstergenda decocto lignorum, Essentia succi & myrrhæ imprægnato; vel decocto herbæ cujusdam vulnerariæ, melle rosarum & spiritu vitrioli imprægnato, vel etiam hoc melle & spiritu subinde solo. Vero malum ossa palati arrosit, oleum caryophyllorum cum oleo ovorum temperatum, sæpe adhibendum.

Ulcera nasi venerea requirunt, ut turundæ, & calcei vivæ, mercurio dulci impregnatæ, sæpius adhibeantur.

uantur, & in nares immittantur; vel ut unguento mercuriali subinde quoque illinantur, curatione simul interna laudata rite adhibita, utpote sub qua ut plurimum glutinari solent.

Verrucæ & excrescentiæ venereæ circa partes genitales spiritu vitrioli vel salis, vel pulvere herb. sabinae, cum mercurio præcipitato rubro vel lapide infernali, si prædicta curatio accedat interna, auferuntur, sine hac vero perfecte vix curantur.

L X V I.

De Fluore albo.

FLUOR ALBUS *mulierum* quoque cachexiæ species est, & quasi *coryza uteri*, sive *gonorrhœa mulierum*, atque hinc quoque in *benignum* & *malignum* sive *venereum*, aut *virulentum* dividi solet.

!Fluor
albus
ejusque
divisio.

In *benigno*, serosa magis aut mucosa & plus minus cadens est materia effluens; sed sine aliis indiciis luis venereæ; in *maligno* vero sive *venereo*, purulenta, viscidescens, flavescens, versicolor, magis foetida, & magis erodens effluit, aliisque luis venereæ sæpius comitantur symptomatibus, temporeque mensium fluere non intermittit; quæ vero in *benigno* tunc intermittere solet.

L X V I I.

Ratione curationis *fluor albus benignus*, præsertim si jam diu duravit, ob partes nimium quantum relaxatas curatu difficillimus est, attamen ad eum tollendum in plethoricis revulsioni gratia Venæ sectio instituat in brachio; quæ vero in pituitosis nocet, et eoque intermittenda. In utroque autem casu ad feriendum pervacui, quod hic peccat, evacuationem & revulsione curatio idoneis purgantibus, admixtis serum corrumpentibus vasaque simul roborantibus, est inchoanda, primis vero vino quodam medicato, quotidie apta coacta per aliquod tempus, ex herbis & radicibus uterisque balsamicis & aromaticis parato, ut herba melissæ, smarini, marrubii, abrotani, radic. aristolochiæ, cicorii, caryophyllatæ, helenii, pimpinellæ, levistici,

Curatio
interna
benigna.

barbari, hellebori nigri, & foliis fennæ parato; vel pilulis balsamicis Beccherianis; aliisve similibus, per plures dies apta dosi usurpatis. Postea autem pro cachexia viscida & lymphæ corrigenda (tonoque partium relaxatarum rursus roborando, diuturnus usus Essentiæ succini, cui parum Essentiæ myrrhæ additum sit, præstantissimus est, si quotidie bis vel ter assumatur ex infuso aqueo herbæ melissæ, vel rosmarini, vel millefolii, &c. vel his & similibus combinatis. His utrumque ob scopum interponantur adhuc sæpius pilulæ balsamicæ Beccherianæ, aut aliæ similes. Denique quando multum hic fluxus imminutus est, & prædictis omnino tolli nequeat, id quod tamen haud raro contingit, interne loco præcedentium, paullo *fortiora roborantia* & quidem martialia præstantiora ac probatiora, ut Tinctura vitrioli martis Zvvœlff. Tinctura martis aperitiva Ludovici, Tinctura martis cydoniata, aut crocus martis aperitivus loco priorum usurpanda.

L X V I I I.

Curatio externa. Externe vero ex herbis nervinis, uterinis & subacringentibus balnea sive *inseffus*, immo in malo rebelliori, *injectiones* quoque cum vino rubro ex similibus paratæ, in vaginam uteri aliquoties in die fieri possunt: ut ex roremarino, hormino, matricaria, mentha, melissa, pulegio, salvia, millefolio, cum radicibus bistortæ, tormentillæ & paucò alumine; vel & ex aqua calcis vivæ; ita & *aque medicatæ martiales*, ut *thermæ* externe & interne per satis longum tempus rite usurpatæ, hoc in malo cum fructu ut plurimum venerea labes abest, adhibentur.

L X I X.

Dieta. *Dieta*, sicut in cachexia generatim dictum est, hic probe observetur: in primis vero vitentur lac, acida, fructus horæi, farinacea, pingua & omnia quæ pituitam generare possunt, itemque potus nimius Theæ Cossæ, cerevisiæ, ut & venus nimia, &c. alias omnia medicamenta in pertinaci aut rebeli hoc malo fistraanea sunt.

L X X.

Fluoris albi maligni curatio. FLUOR ALBUS MALIGNUS sive *venereus*, gonorrhœa virulenta in viris, quia eandem causam agno-

gnoscit, curandus; aut si ipsam lūem veneream con-
nitetur, ut hæc quoque tractandus: ubi vero simul
injectione ex aqua calcis vivæ cum mercur. dulci in va-
ginam uteri aliquoties in die immissa, egregie hic mun-
at, roborat & sanat. Si tamen, destructo veneno ve-
ereo, ob partes affectas sive patientes a morbo valde
elaxatas ac debilitatas, fluxus aliquis, sicut post go-
orrhœam virulentam sæpe quoque fieri solet, rema-
eat, quia hic tunc, ut benignus considerandus, etiam
adem, quo modo hunc curare præcepimus, ratione,
J. LXVII. est sanandus.

C A P U T X I I.

De Obstructionibus.

I.

SI transitus rerum fluidarum aliarumque quarumcun-
que in corpore humano contentarum, quæ move-
ri, fluere, propelli aut expelli debent, quocunque mo-
do in vasis, canalibus, ductibus, intestinis, vesica a-
liisque viis ac partibus corporis humani impeditur, *Ob-*
structio appellatur, unde, ut omnis generis morbi pro-
veniant, necesse est; sicuti ex fluxibus sanguinis, præ-
sertim mensium aut hæmorrhoidum suppressis, obstru-
ctio, aliisque supra jam Cap. IX. p. 138. expositis,
intelligi potest. *Nunc vero alias adhuc obstructions,*
quæ in corpore humano contingunt *considerabimus:* ubi
videndum est, liberum in corpore motum sive transi-
tum, ut quis sanus sit, desiderare sanguinem aliosque
humores utiles & excrementitios, itemque spiritus, bi-
lem, genituram, salivam, lac, aerem, flatum, fæces,
urinam, fœtum & secundinas in partu, &c. Hoc vero
rite fiat, partes, quæ transitum concedere, & res,
quæ transire debent, recte sint constitutæ, necesse est,
etque ut causa sive vis propellens & expellens sit sa-
tis valida. Quando igitur liber itus aut reditus rerum
propellendarum impeditur, obstructio aut saltem mo-
tus vel transitus remota & varia inde pendentia sym-

*Quid
obstru-
ctio.*

pto-

ptomata proveniunt : caussaque erit vel in movente vel in viis , vel in re transmittenda , vel in variis hi simul .

I I.

Earum Vasa & viæ , dum ad transitum ineptæ fiunt , vel *causse* , angustantur , collabuntur , obstruuntur , comprimuntur , vel *I. angustatio* , concreescunt , & sic , quod transmittere debent ; transmittere non possunt .

vasorū. Angustantur autem a rebus variis : nimirum vel *tartarea* vel *gypsea substantia* , intus parietibus vasorum adnata , verbi causa , viæ bilis in hepate ; vel a glutinosa aut viscida materia , sive a *pituita* , intus obducuntur certæ partes , ut nares , bronchia & aspera arteria , sicut in coryza , tussi , dyspnœa & asthma vel a *spasms* prædictæ partes respirationi inserviente contrahuntur , unde eadem mala ; vel angustantur a tumores moribus & inflammationibus , ut fauces a tonsillis intumescuntibus ; itemque subinde in *urethra* a cavernosorum ejus substantia turgescente , (a) qua urinæ libera excretio sæpe impeditur ; vel a rebus p. n. excrescentibus , sive tuberculis & carunculis ; ut a *polypo nasarium* , *caruncula urethrae* , *vaginae uteri* , *intestini recti* , &c.

I I I.

2. *Collapsus.* Vel collabuntur vasa a sanguinis aut humorum defectu , post hæmorrhagias largas , fluxus alvi longos , inediam diuturnam , &c. unde tabes vel atrophia ; vel a spirituum defectu nervi concidunt , in deliquiis animi , affectibus soporosis , comate , caro , lethargo , apoplexia , paralyfi , marasmo senili , &c.

I V.

3. *Obstructio.* Obstruuntur vero vasa sanguifera sæpissime a rebus transmittendis ; ut a sanguine viscido tenaci , aliave materia spissa , ut in tumoribus varii generis , in glandulis induratis quibuscumque , earumque schirris & scrophulis ; vel canales & meatus a corporibus solidis , ductus biliarii a calculis ; vel terrea sive gypsea substantia ; meatus auditorius , a cerumine duro , a pituita vel

(a) Vid. Instit. chirurg. nostr. Cap. 138. p. 886.

vel calculis illapsis aut intrusis ; *ureteres & urethra* ,
 itidem a calculis vel sanguine crasso , in vel post mi-
 ctum cruentum ; *nares* a polypo ; *bronchia* , *aspera arte-
 ria* , ab illapsis rebus solidis quibuscumque ; *œsophagus* ,
 a deglutitis ossibus , spinis piscium , vel nucleis , v. gr.
 prunorum ibidem subsistentibus ; vel *corporibus excrescen-
 tibus* aliisque rebus ; *sinus cerebri & vasa majora cor-
 dis* , immo ipsum *cor* a *polyposis* concretionibus ; *mam-
 mæ* a sanguine vel lacte nimis spisso ; *testiculi* a liqui-
 do genitali vitioso ; *alvus* plerumque a fæcibus durio-
 ribus , quandoque etiam a calculo , (a) *nucleis ceraso-
 rum* copiose cum cerasis comestis : in quibus omnibus ,
 quo major est obstructio , eo major inde oritur noxa .
 Huc etiam pertinet *fœtus nimis magnus* vel monstruo-
 sus , uterum tempore partus ita occludens , ut expelli
 nequeat ; id quod etiam de *secundis nimis magnis* post
 partum , intelligendum .

V.

Comprimuntur vasa a ligaturis fortioribus , ut in fra-
 cturis , luxationibus , vulneribus , ut humores ea transi-
 re nequeant , atque inde tumores , inflammationes ,
 gangræna , scirrhi , &c. oriuntur ; vel *ab humoribus ex-
 tra vasa sua p. n. effusis* , ut in cerebro & thorace :
 unde apoplexiæ dispnœa , suffocatio , syncope , &c. &
 sæpe mors proveniunt . Quandoque *certæ partes magna*
ex parte vel omnino p. n. coalescunt , aut in utero ma-
 terno jam sunt coalitæ ; ut *partes genitales & obscœnæ*
in ita dictis atretis , de quibus in Instit. chirurg. ita ut
 id , quod transmittere debent , transmittere nequeant ,
 vel etiam a læsionibus externis quædam partes subinde
 vel integræ , vel ex parte *concrescunt* : ut *oculi & na-
 res* a variolis , vel ambustione ; vel *vagina uteri* post
 partum difficilem , facta inde gravi quadam laceratio-
 ne , vel *vulnere aut ulcere harum partium male curatis* ;
 id quod & *in ano* quandoque ab ejusmodi læsione fa-
 ctum esse recordamur .

4. Com-
 pressio
 vel coa-
 litus .

V I.

(a) Novi exemplum , ubi nobili in vicinia magnus
 calculus , anum pertinaciter obstruens , ope ferramen-
 torum feliciter extractus est .

4. *A spirituum defectu.* In partium moventium aut spirituum culpa residere quoque potest causa variarum obstructionum, si fibrarum partium nimis sunt flaccidae, & sanguis aut spiritus vel deficiunt, vel narcoticis rebus oppressi; sicut observatur in morbis soporosis, comate, caro, apoplexia, paralysis, ischuria senili, virium languore quocumque, in senibus aliisque debilibus, & imprimis quoque in parturientibus in partu longo ac difficili; quo etiam pertinet fumus carbonum in cubilibus locisque clausis quibuscumque.

V I I.

Curatio obstructionum generalis. In curatione igitur obstructionum generatim illud quod haeret, sive stat & quietum est, in motum est convertendum, & causa sive remora vias angustans vel obstruens, aut motus impediens, investiganda ac tollenda; id quod pro causarum diversitate diverso modo fieri debet. Si enim vasa colapsa, distendenda; si contracta aut compressa, relaxanda; si obstructa, aperienda; si per m. concreta, incidenda, &c.

V I I I.

De Dyspnœa & Asthmate pituitoso.

Dyspnœa & asthma.

In spirandi difficultate sive dyspnœa vel asthma ab humoribus viscidis, quod asthma pituitosum vocant, & ex rejecta multa pituita dignoscitur, infusa aut decocta cum aqua ex solventibus herbis & radicibus pectoralibus composita, ut ex herba veronicæ, hyssopi, radic. fœniculi, ari, enulæ, semine anisi, fœniculi, &c. mane & circa vespem assumpta, egregie conducunt; itemque infusa ex iisdem radicibus & herbis cum vino parata, & vel in pastu vel circa pastum usurpata, ut & Essent. helenii, pimpinellæ, succini, Elixir. pectorale Wedelii, spirit. salis ammoniaci anisat. balsam. sulphuris anisat. cum prædictis infusis data; ita & species diaireos, vel pulvis pectoralis dictus, ex lapid. cancrorum cum sperm. ceti & sacchar. cand. compositus, adjectis aliquot guttulis olei anisi, egregie resolvit, si sæpius a ℞j. ad ʒss. exhibetur. Aut

gummi ammoniacum, vel in pilulis, vel in potiuncula, qua hyssopi vel veronicæ ac vino rhenano solutum & sæpius ad ℥j. vel ʒss. exhibitum, vel in celebri potiuncula *asthmatica Bruneri* datum. (a) Quandoque *Looch ad asthma* usitatum bene prodest; quibus vero omnibus subinde *purgantia* idonea sunt interponenda, vel quandoque etiam *emeticum* ad humores noxios per superiora ejiciendos, immo & *vesicatoria* in furis aut ruribus adhibita in hoc malo sæpe sunt valentissima, itemque *pediluvia*, atque, si fieri potest, *frequens motus* corporis simul instituat. Multis etiam *aquarum prædicatarum* usus his in malis egregie prodest, præsertim si calide vel saltem tepide bibantur. Nonnulli *pulverem radice squillæ* hic valde commendant & mihi inde prædicunt, qui etiam sæpe egregius est. Vide de hac cumprimis sæpius jam laudati WAGNERI observ. clinicæ. Quod si forte paullo *vehementior paroxysmus asthmaticus* ægrum aggrediatur, quavis hora etiam *oxymellis squillitici* ʒss. vel cochlear. j. cum fructu exhibetur, donec ʒij. vel ʒij. nisi citius remittat, assumptæ sint. *Præservandi* gratia valde conducunt, conticuli in pedibus, purgantia idonea per intervalla exhibita, sanguinis missiones in plethoricis, & aquæ medicatæ cum motu & exercitatione frequenti.

I X.

De Asthmate sanguineo, flatulento, spasmodico
& scirrroso.

Si asthma est sanguineum, quod a nimia sanguinis ac præsertim spissi copia, in vasis pulmonum hærente, originatur, missio sanguinis utilissima ac summe necessaria est, præmissis & subjunctis laudatis modo §. VIII. *Asthma sanguineum & flatulentum.*

(a) Quæ ita se habet. ℞. gummi ammoniaci pulvis ʒij. ʒij. solv. in aqua hyssopi ʒiv. & vin. rhenan. ʒij. M. dentur sæpius cochlearia tria, donec respirandi difficultas remittat,

infusis aut decoctis pectoralibus, guttis, pulveribus, potiunculis & ceteris. Quando a flatibus, ventriculū & intestina valde distendentibus, atque diaphragma & pulmones ita prementibus, ut libere ac recte respirationem perficere nequeant, quod *Asthma flatulentum* appellare solent, servata primo moderata victus ratione, flatus discutientia sive *carminativa*, ut aqua carminativa officinar. aqua anisi vel carvi vel cortic. aurant. spirituosā, ad cochlear. j. ij. vel iij. Essent. carminativa Wedelii, Cortic. aurant. spiritus nitri dulcis, vel carminativus aut anticolicus de tribus, a gutt. 30. ad 50. per intervalla exhibita, egregie profunt. Ita & *pulvis flaved. cort. aurant.* a ℥ss. ad ℥j. cum vini ℥j. vel ℥ij. calefactus aut leviter coctus, addito pauxillo sacchari ad gratiam, vel iidem cortices vino vel cerevisia infusi valentissime etiam flatus expellunt, & viscera simul roborant; immo & *clysteres* ex carminantibus adhibiti magnum quoque sæpius, præsertim si alvus obstructa, his ægris levamen afferunt.

X.

Asthma spasmodicum. Si *asthma* a bronchiis *spasmo constrictis*, sive angustatis, quod *asthma spasmodicum* appellatur, provenit, antispasmodica, temperantia, cinnabarina, nitrosa ac succinata, & inprimis etiam liquor. C. C. succinatus pulvis antispasmodicus, pulvis Marchionis, cum spec. cephal. Michaelis, immo & cum his pediluvia, & vesicatoria pedibus sunt adhibenda.

Asthma scirrhum. Si a *scirrhis* in pulmonibus, quod *asthma scirrhum* dici potest, resolventia, ac diluentia, §. XII. laudantur, itemque aquæ medicatæ, immo & *mercurialia* lenia, diu usurpata egregie profunt, atque in sanguineis venæ sectio quoque subinde est adhibenda.

De Ictero. De *Ictero*, quia sæpius ab obstructione vasorum sive ductuum biliarium ortum trahit, hic quoque jam agere posset; verum quia jam Cap. XI. de cachexia §. 23. de eo actum est, nolumus idem hic repetere.

XI.

Fauces angustæ. Si viæ angustantur ab inflammationibus aut tumoribus, ut fauces, in tonsillarum & pharyngis inflammatione, inflammationes hæ, sicut supra Cap. VII. §. XX. & XXI. docuimus, sunt resolvendæ. Si a corporibus

& *speciatim de alvo obst. & ileo.* 199
us *excreſcentibus, tumoribus duris, aut ſchirris*, quæ
medicamentis in Inſtitut. chirurg. noſtris, locis debitis,
indicatis, tolli aut reſolvi nequeunt, manu chirurgica,
tuto id fieri licet, auferendi.

X I I.

De Alvo obſtructa.

In *alvi obſtructione* ſive ſegnitie, *flatulentia & coli-* *Alvi ob-*
a virium defectu, conducunt roborantia, ut vinum ſtructio,
eneroſum, aquæ, ſpiritus & eſſentiæ roborantes, car- *ſtatus &*
minativæ & blande aromaticæ, ſpiritus nitri dulcis, colica.
ſpiritus carminativ. de tribus, ſive anticolicus, & clyſ-
ata aut ſuppoſitoria. In hac *alvi ſegnitie* præter di-
a, ſpiritus etiam torpidos & fibras languidas intelli-
guntur excitant *purgantia* leniora; ut aqua amara ca-
ræſtica Seidlicenſis, Carlsbadenſis, Wiſbadenſis alia-
e ſimilis; vel ſal quoddam *amarum catharticum*, ut
hemicum vel anglicanum, aut mirabile Glauberi,
qua calida vel ſimplici vel minerali quadam ſolutum
hauſtum; vel *potiuncula quedam laxans* ex tamarin-
is, foliis ſennæ & manna, ut *Managetta*, vel *Syden-*
mii aliave ſimilis, itemque *Electuar. de tamarindis,*
in fol. ſennæ paratum, juſta quantitate datum.
Si alvus a fecibus durioribus obſtructa, victu hume-
ante ac lubricante ex prunis, ceraſis aut pomis co-
ctis, cum vel ſine paſſulis aliisque ſimilibus, potu co-
poſiori, præſertim etiam Coffeæ, cum vel ſine pau-
lo lactis admixto, *lotionibus alvi* ſive clyſmatibus,
collientibus, itemque modo laudatis blande alvum
moventibus aquoſis aut ſalinis.

Si *nuclei ceraſorum* copioſius comeſti alvum pertina-
ter obſtruunt, ut quandoque obſervatum eſt; vel *cal-*
culus major in inteſtinis natus, ut aliquando contingit
ſupra §. IV. jam indicavi, uncinulis in chirurg.
Tab. 27. fig. 10. aut Tab. 33. fig. 17. itemque
ſcapiſculis calculariis Tab. 28. aliisque idoneis instrumen-
tis ejiciendi.

X I I I.

De Ileo.

*Iliaca
passio.*

In ILEO, (quod pertinacissima est alvi obstructio cum vomitu vehementi, nausea, atque acerbissimi ventris doloribus) quod vel a fecibus induratis, vel ab inflammatione intestinorum, vel, quod frequentissimum est, ab hernia umbilici aut inguinum aut scroti *incarcerata*, ut vocant, producit, pro causæ varietate etiam curatio est varianda. Adeoque si a fecibus induratis oriatur, lenia laxantia exhibenda, & præsertim *sal catharticum Anglican.* vel *Bohem.* cum aqua felferenfi aliave medicata datum; vel *decoctum ex foliis sennæ*, tamarindis & manna, paratum ac partitim vicibus exhibitum, egregie sæpius prodest, præsertim quando sequenti ratione præparatur & usurpatur.

℞. Tamarindor. ℥j. fol. sennæ elect. ℥vj. crem. tartari, ℥j. ebull. in f. q. aquæ simplicis per momentum horæ, Colaturæ ℥vj. add. mannæ calab. vel sirup. rosar. solutivi ℥j. de quo æger primo capiat ℥iij. & postea, si alvus inde post bihorium non movetur, quævis bihorio rursus ℥j. donec alvus solvatur. Sed si *clysteres* emollientes ac paullo acriores, ex lacte & fopone veneto parati, injiciantur, aut præmittantur, aut si hi parum, *fumus Nicotianæ* peculiari fistula quæ *clyster tabacalis* appellari solet, in anum impulsus valde hic sæpe conducit.

Quando ab *inflammatione intestinorum* iliaca passio oritur, id quod ex febre & ardore in intestinis cognoscitur, interne potus tenuis, aqueus; pulveresque mixturæ temperantes & antispasmodici nitrosi & camphorati, sicut in aliis inflammationibus, sunt exhibendi. Externe eadem sunt facienda, quæ in inflammatione intestinorum commendavimus, & cumprimis, *siffritus vini camphoratus* cum linteis complicatis, vel *sifica aqua* vel lacte calido, in quo flores chamomilæ cocti, repleta, ventri imponenda; non neglecta in sanguineis matura Venæ sectione. Quando vero ab *hernia incarcerata* ileus oriatur, *sanguinis missio* quoque utilis

finiat

ima est, & deinceps intestina prolapsa, ubicumque hoc vitium sit, una cum loco prolapsus, spasmodice constricto, externis medicamentis emollientibus, præsertim unguentis & cataplasmatibus, vel vesica lacte aut aqua calida repleta, itemque clysteribus similibus, sunt emollienda atque intestina deinde, manibus, si veri potest, blande reponenda; aut si his reponi nequeant, *fumus Nicotianæ* fortioris, prædicta fistula, argiter per anum immittendus, donec æger ad desinendum stimulum sentiat, quo ipso intestina intus ita simulantur, ut se contrahant & angustiora fiant, atque sic in ventrem sæpe retrahantur. Sed si & hoc parum esset, *ad ferrum confugiendum*, & post maturam incisionem tegumentorum communium & loci prolapsus, qui est vel annulus musculorum abdominis, vel circulus arteriæ cruralis, nimis constricti, vel in hernia umbilicali, ipse umbilicus, antequam intestina sphæce corripiantur, sunt restituenda; de qua uberius vid. Chirurgia nostra cap. de bubonocèle & hernia scroti incarcerata; quo facto prædicta symptomata plerumque mox cessare solent, quo tamen in statu blandum kansas ad intestina a saburra collecta liberanda commo- subjungitur.

X I V.

De Dysuria & Ischuria,

S I V E

Urina ex parte aut omnino suppressa.

Dysuria & Ischuria sunt morbi affines iique valde *Causse*. Iusti ac dolorifici, atque a causis quamplurimis originari possunt: hinc quoties quis hoc malum prima vice patitur, in veram causam Medicus quam curiosissime inquirere, eaque perspecta, remedia cuivis speciei propria adhibere rite debet. Si vero jam sæpius ea lavavit, causa plerumque jam magis cognita esse solet. Oriuntur vero sæpissime vel a calculo, vel ab inflammatione renum, vel cervicis vesicæ, in sanguineis,
R item-

itemque in iis, quibus hæmorrhoides aut menses vel suppressi, vel qui moliminibus hæmorrhoidum urgentur, vel ab urethræ spongiosa sive cavernosa substantia, sanguine abundante ibidem congesto, nimis distenta & quasi inflata, ita ut urinam vel difficulter, vel omnino non transmittat. In aliis urina a spasmo cervicis vesicæ, vel ab acri urina, vel a sanguine ob quamcunque causam ibidem congesto, concitato retinetur; in aliis vero ob vesicæ ipsius resolutionem sive paralyfin, quando urinam expellere nequit, suppressitur; vel a caruncula, quam vocant urethræ; vel a tumore, abscessu aut ulcere, in glandula prostata; vel ab eadem hac prostata justo majore atque indurata, sicut & MORBIDUS GAGNUS, (a) & ego quoque jam aliquoties observavimus. Ita & a mictu cruento urina haud raro vel suppressitur, vel difficulter saltem & non nisi magni nixu ac dolore expellitur, quando scilicet sanguis coactus urinae iter occudit.

X V.

Signa Ut vero hæ causæ atque inde natæ diversæ specierum diversarum horum malorum suis signis probe a se invicem distinguantur, summa ope Medicum niti decet. Quando nimis ab inflammatione renum, dolor potissimum & aduror in eorum regione cum febre urgent; si a calculo renum, dolori renum vomitus accedere solet; quæ duo indicia jam a Baglivio pro signis pathognomonicis calculi renum haud male habiti sunt; si vero a calculo vesicæ, dolor vehemens est in vesica, & per urethram ad extremam usque glandem se extendit; mucus apud cum urina pallida excernitur, digitoque in anum immisso sæpe sentitur; certissimum vero signum catheter in vesicam immissus & in corpus lapideum impingens præbet. Quoties a calculo in urethra hæ noriuntur, hic vel tactu per digitos, vel specillum a catheterem quoque detegitur. Si ab inflammatione cervicis vesicæ, tumor & dolor in perinæo percipiuntur, quando locus hic tangitur, & adhuc melius eam cognoscimus, si digito in anum immisso eoque versus vesicam

(a) In Advers. Anat. II. p. 3.

ficant sursum reflexo, tumor ibidem a Medico, ab ægro autem dolor ardens & premens percipiuntur; atque catheter in urethram immissus circa collum vesicæ impedimentum deprehendit, ut ulterius progredi nequeat. His signis in graviori malo sæpe accedit tenesmus, ani constrictio, anxietas præcordiorum, frigus extremorum, vomitus & pulsus febrilis. Quod *urethræ cavernosa substantia sanguine nimis sit inflata*, inde intelligimus, quando urina suppressa, fistulam argenteam in urethram vix vel non nisi difficillime immittere possumus, præsertim si ægrum multo sanguine abundante cognoscimus. Quod *spasmus in collo vesicæ* adsit, ex eo dijudicamus, quando prædictæ causæ desunt; attamen spasmodica constrictio circa collum vesicæ ab ægro percipitur, & catheter commode ad cervicem vesicæ usque, sed non ulterius, ad vesicam scilicet, dimitti potest, nullo præsentē calculo vel in urethra vel in vesica. Si *urina acris* hunc spasmum inducit, dijudicamus hoc ex urina valde foetente, præsertim si ægri vel enes sunt, vel scorbutici, & in urina multæ particulae salinæ, & quasi gypseæ se manifestant. An autem *caruncula* in vesicæ collo urinæ iter obstruat, præsertim cum multi ex recentioribus eam prorsus negent, sicut prolixius hac de re in Chirurg. nostris Institut. part. II. Cap. 138. p. 385. disputavi; quam difficillime certo scire possumus. *Abscessum vero in glandula prostatica* loco carunculæ sæpius urinæ fluxum impedire & *Benevoli* observationibus (a) eodem in libro asseveravimus. Quod vero *scirrhus glandulæ prostaticæ* sit causa urinæ suppressæ, durus, at vel indolens tumor in urinæ, vel saltem non multum dolens indicat.

X V I.

Si canales uriniferi obstruuntur a corporibus solidis, Curatio
 & pelvis renum, ureteres, vesicæ cervix, aut urethra dysuriæ
 calculo, eoque nuper orto, aut recens saltem e re & is-
 bus in ureteres aut vesicam delapso, ita ut urina vel churicæ
 fficulter exeat, vel omnino suppressa sit, isque ad a calculi
 ac parvus, propellitur & expellitur sæpe diureticis lis.
 R 2 variis,

(a) In libell. de caruncula urethræ.

variis, supra pag. 176. & seqq. ubi de calculo egimus, indicatis; quibus hic adhuc addam decoctum rad. eryngii, itemque pulverem præstantissimum ex pulv. antispasmod. ʒj. & lap. cancror. ppt. ʒß. compositum; vel & ejus loco sal cathart. Anglic. aut Bohemic. ad ʒj., vel cum eryngii radice decocto, vel cum aquæ fellerensis haustu sæpius assumtum. Sed si dysuriæ aut ischuriæ causa calculus major est vel in vesica vel urethra hærens quam ut per hanc expelli, aut medicamentis solvi possit, pellentia, præsertim fortiora hic summe noxia, adeoque vitanda,isque potius heroica sectione excidendus est, sicut in Institut. Chirurgic. Part. II. Cap. 139. & seqq. prolixè satis docuimus. Quod si vero æger sit vel nimis debilis, vel nimis senex, ut difficilem & periculi plenam hanc curationem per scalpellum sustinere commodè nequeat, aut etiam illam ob quamcunque rationem admittere nolit, palliativa tantum sic dicta cura tunc locum habet; quæ consistit primo in eo, ut quoties calculus major urinæ iter occludat, hic cathetere repellatur, ut urina exire queat; deinde ut dolores ægris leniamus: id quod fit interne, antispasmodicis modo laudatis, & simul medicamentis lenientibus, lubricantibus, oleosis & blandis anodynis; externe vero clysteribus laudatis, unguentis, linimentis ac balneis emollientibus ac lenientibus, de quibus supra jam pag. 177. proposuimus. His in doloribus vehementioribus addi possunt injectiones lenientes in vesicam ex ol. olivarum, lini, papav. albi vel amygdal. dulc. vel & ex decocto sem. lini, aut rad. malvæ in lacte, addito pauxillo butyri recentis.

X V I I.

Curatio Si urinæ difficulter fluentis aut omnino suppressæ
si ab in- causa est inflammatio renum vel vesicæ, diuretica, præ-
flamma- fertim calidiora, summe quoque sunt perniciofa; im-
tionem aut mo vel ipsæ etiam aquæ minerales egregie alias diure-
plethora. ticæ, haud satis tuto tunc adhibeantur. Verum potius
 hoc in malo danda sæpe sunt remedia refrigerantia, ni-
 trofa, salia media, lapid. cancr. vel conchæ acido ci-
 tri vel tartari saturata, addito singulæ dosi camphoræ
 gr. j. vel altero, quæ efficacissima hic sunt cum di-
 luentibus aqueis refrigerantibus, ut decocto vel infuso
 radic.

radic. petroselini, eryngii, herbæ theæ, hederæ terrestres, fragar. aliarumque similium, vel & *aquis destillatis* petroselini, fragariæ, alkekengi, exhibita; itemque *Emulsiones* ex sem. 4. frig. cum lap. cancror. antimon. diaph. & nitro vel ex femine violariæ (quæ & alvum & urinam simul utiliter movet); quibus adjungendæ *fomentationes*, & præcipue *vesica lacte* vel aqua calida repleta, aut *cataplasmata* emollientia & resolventia, renum vel vesicæ, immo & perinæi regioni, si inflammatio in hoc loco, itemque *balnea* ipsa; præ omnibus vero *sanguinis missio* hic est instituenda, quæ cæteris fere omnibus palmam hic prærit, præsertim in ægris plethoricis & calidioribus: quæ & omnibus eis in casibus est adhibenda, ubi sanguis abundat, & cumprimis etiam in hæmorrhoidibus ut mensibus obstructis, hæc mala inducentibus, quando nimirum sanguis hic retentus circa vesicam congeritur, & urinæ excretionem sæpe molestissimam & crebro redeuntem concitat, quæ in senibus raro prorsus tolli possunt. Interea tamen studendum, ut suppressæ sanguinis evacuationes suis remediis, ex Cap. IX. substituantur; vel si hoc fieri nequeat, sanguinis missiones earum loco sæpius iterandæ substituantur, & aperientia ac resolventia simul adhibeantur, ut pulveres & lap. cancror. citr. arcan. duplic. tartaro vitriolato & nitro, ut & lig. terr. foliar. tartari vel *aquæ medicatæ*, interpositis subinde salibus amaris catharticis, vel *pilulis balsamicis* *Becheri* aliisque similibus, præsertim in sexu foeminino.

X V I I I.

Ita etiam si urina ob *urethræ substantiam spongiosam*, sanguine in ea largius congesto, nimis tumentem & quasi inflatam, reddi nequeat, *Venæ sectio* quoque lar-primarium rursus hic est remedium, quia sanguinem huc inde revocat & educit, immixtis deinde per quod tempus *candelis aptis cereis*, aut *stylis plumbeis*, rei tenuioris amplitudinem habentibus, ad urethram nimis angustatam rursus diducendam & ampliandam. Quando urina hoc in casu valde urget *catheteres* etiam, qualis ille est, qui in Institur. chirurg. nostr. tab. XXVII. fig. 7. sistitur, tunc adhiberi apte possunt;

Ab urethra nimis tumente.

ordinarii vero & consueti illi, qui eadem tabula fig. 3. 4. & 5. exhibentur, & circa extremum utrinque foraminibus oblongis præditi sunt: quia hæc inflata urethræ substantia in hæc foramina se ingerit, atque motu ejus inde male afficitur, aut omnino laceratur, notum hoc in casu deprehenduntur.

X I X.

A spasmo.

Quando *spasmus cervicis vesicæ* difficultatis reddendæ urinam causa est, pulveres temperantes & antispasmodici, ex aquis vel infusis diureticis, supra §. 17. commendatis, interpositis *emulsionibus* aut *oleis lenientibus* v. gr. amygdal. dulc. olivarum, rec. papav. albi vel lini, ut & externe *cataplasmatibus*, *unguentis*, *clysteribus* atque *balneis* emollientibus ac demulcentibus, ibidem laudatis, immo & lenia *opiata*, si vis mali exigat, hic maxime profunt.

Ab urina acri.

Si *spasmus ab acri urina proveniat*, serum acre scorbuticum partim blandis purgantibus, partim idoneis diaphoreticis est evacuandum atque divertendum; reliquum vero corrigendum 1. *absorbentibus* sive *terreis* ut lapid. cancror. matre perlar. creta præpar. antimon. diaphor. succino præparato; 2. *decoctis* lenientibus radic. chinæ, sarsaparillæ, malvæ, althææ; 3. *emulsionibus* & *oleis demulcentibus* modo laudatis, quo & *sirup. d. althææ* referri recte potest; 4. in doloribus vehementioribus, ipsis moderatis *opiatis*: non omisis *unguentis*, *cataplasmatibus*, *clysteribus* & *balneis* prædictis lenientibus.

X X.

Si a paralyfi.

Sed si hoc vitium a *paralyfi* aut resolutione ipsius corporis vesicæ ortum trahit, sicut in *senibus* præsertim id haud raro incidit, (quæ species leviores, immo subinde nullos movet dolores), primo *frictiones* & *fomentationes* ventris ac perinæ remediis roborantibus, nervinis, spirituosus diligenter sunt adhibenda; *cataplasmata* quoque ex cepis aliisque roborantibus & stimulantibus vesicæ superimponenda; *clysteres* ex huiusmodi ejusdem naturæ ac nervinis in intestinum rectum injiciendi, non neglectis remediis antiparalyticis ac roborantibus internis, ipsoque vino generoso rhenano aut mosellano. Interea tamen, quando *urina* fo-

nimis

nimis urget, ne vesica nimium inde distendatur atque resolvatur, mature hæc *fistula idonea argentea*, quam *catheterem* vulgo vocant, prudenter per urethram in vesicam immissa, educenda, hocque negotium, si urina postea ex arbitrio reddi nequit, bis vel ter in die, prout res id exigit, iterandum, continuatis laudatis internis atque externis; donec successu temporis vesica eam rursus virtutem recuperet, ut sponte urinam pro lubitu rursus expellere valeat; id quod sæpe post aliquot demum hebdomades contingere memini, ita ut hi ægri posthac hoc modo perfecte fuerint restituti.

X X I.

Quod si in *mictu cruento* sanguinis pars in vesica, *Amictu cruento.* ut quandoque fit, concre scat, atque cervicem ejus, ut viam urinæ obstruat, sanguis hic spissus & concretus est resolvendus & expellendus; id quod faciunt 1. *Infusa calida herbarum* digerentium ac simul urinam pellentium cum aqua, ad modum Theæ parata, & cum primis herbæ hederæ terrestris, arnicæ, chærefolii aut veronicæ, &c. 2. *Tinctura tartari* vel liq. terræ fol. tartari, cum infusis his apta dosi assumpta. 3. *pulveres digerentes*, ex lap. cancror. succ. citri aut limonum trituratis, sperm. ceti, tartaro vitriolato, nitro & cinabari parati, atque ex aqua chærefolii aut petroselinii abinde dati. 3. *cepæ assatæ* regioni pubis & perinæ valide superimponantur, vel *cataplasma* ex farina tritici in lacte cocta, addito butyro & pauxillo croci, a quodve, ex rad. lilior. alb. herb. malvæ, altheæ & flor. chamomillæ paratum, ad spasmum colli vesicæ relaxandum; vel etiam *vesica lacte calido*, in quo flores chamomillæ aut meliloti cocti fuerunt. 5. *clysteres emolientes & resolventes*, ex floribus chamomillæ in lacte coctis, addito oleo vel butyro recenti. 6. Si forte hæc omnia parum essent, & urina nimis ægrum torqueret, *cathetere* hic sanguis in vesicæ collo hærens repellendus et perrumpendus, & per eum urina ejicienda.

X X I I.

Ulcus in vesica etiam haud raro suppressæ urinæ causæ est; id quod *ex urina purulenta ac fætida*, dolore vesicæ sæpe vehementissimo, haud aliter, ac si *Ab ulcere vesicæ aut urethræ.* ulculo vesicæ ægri laborent, cognoscitur. Hoc *ulcus in* *seni-*

senibus, sicut Hippocrates jam notavit, vix unquam in junioribus vero non nisi *difficillime curatur*, præsertim si inveteratum, & vesica jam nimis inde exesa atque corrupta est. Interea tamen, vitatis primo omnibus acribus & stimulantibus, *infusa radicum & herbarum vulnerariarum*, absorbentia §. 19. oleosa & mucilaginosa, blanda balsamica, cum primis *balsamum de Meccha* in elæosaccharo, & moderatus *usus mercurii* præsertim ubi venerea subest causa, sæpe quamplurimum hic præstant. Immo & post hæc *aque minérales* tam simplices, quam cum lacte tepide ac per plures hebdomades potæ, itemque ipsæ *thermæ*, ut Emsenses Carolinæ aliæve similes hæc ulcera quandoque una cum dysuria adhuc persanant. Quibus omnibus vero & *injectiones* ex decocto herbarum traumaticarum, ut agrimonie, hyperici, plantaginis aut millefolii, mille rosarum temperato præparatæ & per fistulam æneam vel argenteam in vesicam immissæ, subinde interponantur vel horum loco *lac cum sirupo dialtheæ* aut butyro recentis, vel & oleum hyperici injici possunt. Si *dysuria* ab *ulcere urethræ in gonorrhœa*, hoc ita curandum, ut in gonorrhœa docuimus.

X X I I I.

Si in gravidis aut puerperis urina suppressa.

Si *urina in gravidis*, ultimis præsertim mensibus *difficulter succedat*, vitanda *diuretica*, quia fœtum præ mature expellere facile possent; verum quia hoc vitium tunc plerumque a collo vesicæ, ob uterum valde turgidum, compresso, oriri solet, remedium ipsis sæpe est, sola ventris gravidæ utraque vel alterutra manu altum elevatio, vel si hæc parum est, *catheteris* provisa in vesicam immissio, atque per hunc urinæ facta immissio. Ita si *puerperæ in partu*, præsertim diuturno & difficili, urinam mittere non possunt, atque vesica congesta partum adhuc difficiliorem reddat, catheter quoque hic & ad urinam & ad partum promovendum summe necessarium & optimum est auxilium.

X X I V.

A prostata tumida.

Denique si a *glandula prostata nimis tumida* atque indurata, vel ab ipso *scirrbo hujus glandulæ* urinæ liber exitus prohibeatur, ea, quæ ad ejusmodi tumorem & scirrhos digerendos infra §. 29. & seqq. tam interne quam

quam externe commendavimus, quam solertissime adhibenda sunt.

Quod si vero malum his non cedat, & urina prorsus atque ita supprimatur, ut & catheteri via ad vesicam omnino præcludatur, cum in hoc ultimo, tum aliis præcedentibus ejusmodi casibus, vesica ferro tenti, triangulari cuspidе donato, & tubulo argenteo in-
uso, quod *Troicar* Gallis vocatur, (a) vel ab inferiori, quæ curatio *punctura perinæi* appellatur, vel a superiori parte, quam *vesicæ puncturam* Chirurghi nominant, prudenter perforanda, factaque perforatione, erum e tubulo educendum, sed hic in vulnere & vena relinquenda, urinaque per hunc dimittenda, & excidat, funiculo circa ventrem firmandus, os deinde hujus fistulæ sive tubuli turunda vel subere claudendum, & per hunc postea pro lubitu & quoties opus est, urina emittenda, donec causa ischuriæ sit sublata. Periculosum quidem & molestum est auxilium, sed cum necesse sit, non omnino contemnendum. Ubi-
us hoc de auxilii genere evolvi possunt Institut. Chirurg. nostr. Cap. 144. Part. II. p. 1005. Ita & si a *varicella*, vel ab *abscessu*, aut *ulcere*, vel *tumore* in
ethra lotium supprimatur, remedia e Chirurgiæ Cap. 8. Part. II. petenda sunt.

X X V.

In Dysuria & Ischuria senum, morbis hic vix un- *Dysuria*
quam omnino tollendis, sed tantum leniendis, præter *Ischu-*
aleptica, prosunt liq. terræ foliatæ tartari, aut tin- *ria se-*
ura tartari, vel sola vel cum spiritu nitri dulci re- *num.*
mixta; item *emulsiones* ex semine violarum cum aqua
ærefol. petroselini, fragariæ, saxifragiæ, admixta
nca aqua cinamomi cum vino paratæ, vel emulsio-
s ex nucleis persicorum factæ, & sæpius haustæ.
terne *allium* vel *cepæ* sub cineribus assatæ, & chæ-
fol. in forma cataplasmati, aut ol. scorpionum, ju-
per. succini in forma linimenti pubis & perinæi re-
oni, excitandi & stimulandi fine, applicanda. In
ischuria senum plethoricorum & laute viventium, vel
hæ-

(a) Quod videri potest in Institut. Chirurgic. no.
Tabul. XXIV. figur. 1. & Tab. 32. fig. 3.

hæmorrhoidibus suppressis laborantium, præter dicta *missio sanguinis*, sicut in aliis plethoricis, sæpe urina egregie solvit; dum sanguinem in collo vesicæ congestum revellit. Sed si hæc non sufficiant, & symptomata urgeant, *cathetere* vel ipsa *punctura vesicæ*, si nimirum urina in vesica hæret, educenda; *sin vero causa* urinae suppressæ *in renibus*, hæ operationes chirurgicæ non sunt adhibendæ, quia eis urina e renibus educi nequit. Sed præter laudata interna, *regio renum* scilicet *oleo scorpionum*, *juniperi* & *succini illini* & cataplasma emolliens deinde imponi possunt: ubi & *clysteres* emollientes ac balnea egregiam sæpe opem præstare solent. *In malo autem inveterato*, vix ulla superest curatio. Vid. Hipp. aphor. 31. Sect. VI.

X X V I.

De Morbis sive Obstructionibus vasorum a viscido generatim.

Si obstructiones vasorum ab humoribus lentis, viscidis, spissis, grumosis, coagulatis, ut in tumoribus glandularum, scrophulis, dyspnœa & asthmate a vasis per humorum obstructis, polypo cordis, &c. illi sunt attenuandi, resolvendi & fluxiles reddendi: id quod iis maxime remediis fit, quæ supra in cachexia curanda Cap. XI. laudavimus; præcipue vero infusis, decoctis, essentiis herbarum, lignorum & radicum, diaphoreticis; omnis generis medicamentis amaris; salibus alcalicis, mediis, digerentibus sive digestivis vulgo dictis, & maxime quoque aquis medicatis, non omittis purgantibus & sanguinis missione. Præterea etiam notandum, quod in morbis a viscido, obstructionibus vasorum & nervorum atque cachecticis affectibus, humoribus tenacissimis, oriundis, mercurialia quoque prudenter adhibita, absque, vel & quandoque cum excitata salivatione, sæpe egregie conducant; immo plus summe sint utilia ac necessaria: ut in cephalalgia & hemicrania pertinaci, amaurosi ab obstructione nervorum opticorum, in cataractæ initio, vel saltem non inveterata; epilepsia, affectibus catarrhalibus diuturnioribus,

, aut sæpe recurrentibus, præsertim ophtalmiis ejus-
di, affectibus paralyticis, scorbuto viscido & frigido
tumaci, lue venerea, scabie inveterata, quartana re-
li, ulceribus cacoethicis, cariosis, spina ventosa, plica
onica, obesitate nimia, & fluore albo pertinaci, aliis-
que in affectibus rebellibus; qua de re prolixius vide-
potest STAHLII dissertat. de salivatione mercuriali
is præter luem veneream morbis rebellibus extirpandis
i, & dissertat. nostr. de Amaurosi salivatione curata.

XXVII.

De Glandulis induratis, Scirrbo & Cancro.

Speciatim vero ad obstrukciones ab humoribus visci- Glandu-
etiam merito referuntur glandularum tumores, scir- larum
& tandem carcinomata sive cancrofi affectus, qui o- tumores,
es ab obstrukcione vasorum & præsertim in glandu- scirrhi
, ab humoribus crassis, viscidis, tanquam causa pro- & can-
qua, suam originem ducunt; quibus vero in can- cri.
sis affectibus peculiaris & quasi venenata acrimonia
ens, cujus natura hætenus perspicui & curari non
m potuit, accedit, qua dolores rodentes sæpe vehe-
ntissimi & partium læsarum ac vicinarum erosiones
e ulcera concitantur.

XXVIII.

Cognoscuntur hæc mala ex tumoribus duris; plerum- Diagn-
e mobilibus & initio indolentibus; quod in statu sis &
ndulæ induratæ dicuntur; sed quando hæ non brevi progno-
eruntur, aut suppurantur, sed potius negliguntur & sis.
gis adhuc indurescunt, glandulæ scirrhosæ sive scir-
appellantur, & si hi, præsertim in mammis, ro-
te incipiunt, carcinomata sive cancro incipientes vel
ulti, sed si jam diu durarunt, cancro occulti invetè-
i; si vero cutis & vicina tandem inde eroduntur
que exulcerantur, carcinomata & cancro aperti sive
ulcerati dici solent; quorum priores tumores medica-
entis raro ac difficulter digeruntur & curantur; po-
riores vero vix unquam & rarissime. Immo secun-
m præceptum Hippocratis (a) melius est canculos oc-
cultos

(a) Aphor. 38. Sect. VI.

cultos intactos relinquere, quia medicamentis communi-
plerumque deteriores fiunt, & ægros citius inter-
ciunt.

Glandulæ colli induratæ, quia in pueris a voracitate
& prava victus ratione oriuntur, hac emendata atque
correctis humoribus corruptis, motu fortiori, ipsa æta-
te ac tempore, naturæ vi, plerumque rursus digerun-
tur. Interea tamen hoc sæpe non fit, verum e contra
glandulæ hæ induratæ haud raro successu tempo-
augmentur vel multiplicantur, præsertim circa collum
atque auctæ *scrophularum* (*Gallis Ecrouelles*), im-
si adhuc majores fiunt, *strumarum* nomen adipiscuntur.
licet hæ haud raro glandulæ induratæ non sint, sed
tumores potius tunicati sive *saccati*, varios humores pri-
vos continentes, qui mirum sæpe in modum excres-
cunt, atque varia mala ægris inducunt.

Denique hic adhuc observandum, quod plerique
mines solis externis remediis duos hosce tumores digerere
ac curare velint; verum cum hæc sola vix interna
humorum vitiosam intemperiem corrigere valeant, hu-
ratione curati in pejorem plerumque statum abeunt
adeoque ab *internis potius remediis* auxilium & peten-
dum & sperandum esse existimo.

X X I X.

Curatio
glandu-
larum
durarum
I. deco-
ctis.

Remedia vero, quæ glandulis induratis emolliendo
ac dissolvendis maxime opportuna esse censemus, sunt
I. *Infusa & decocta* ex radicibus, lignis & herbis
resolventibus parata, bis terve in die usurpata: ut
rad. sarsaparillæ cum ligno quajaco; vel ex radic. sa-
saparillæ, chinæ & ligno sassafras; vel ex radic. *scrophulariæ*
aut *vincetoxici*, quæ in Ephem. Nat. Cur. De
I. An. I. Obs. 57. valde laudantur. Ita decoct. lig-
quajaci cum radic. liquirit. vel infusum aut decoctum
herbæ *rosmarini* cum saccharo, ad glandulas colli tu-
mescentes digerendas recte commendantur a D. Kuc-
lero, Medico Lipsiensi, (a) quod cumprimis etiam
valet.

(a) In dissert. de glandulis colli puerorum tumefactis
Lipsiæ in 4.

et in puellis mox adultis, quibus menstrua adhuc
ficiunt; cum quibus vero omnibus subinde apta dosis
st. antimon. vel essent. lignorum aut succini data
otium hoc tanto melius expedit.

X X X.

Præter hæc quoque 2. *pulveres* sanguinem hunc vi-
um attenuantes, exhibendi: inter quos celebris est
vis ad *strumas* *August.* cui vero cinnabaris vel mer-
ii dulcis gr. j. vel alterum in quovis præbio apte
i potest. Ita & *antimonii crudi pulvis* huic pulveri
strumas commode substituitur, præsertim si ipsi in
vis dosi gr. j. vel alterum mercurii dulcis adjungi-
, qui egregie glandulas puerorum in collo & mi-
es ac recentiores *scrophulas dissolvere solet.* *Pulvis*
lepedum a Dss. ad Dj. cum gr. j. vel altero mer-
ii dulcis *probatissimi quoque est usus*, cum in *exter-*
um glandularum tumoribus, tum & in viscerum tu-
ribus duris, præsertim si quovis triduo vel quatri-
interjecto idoneum purgans mercuriale interponi-
. Ita & *pulvis radic. ari* cum mercurio dulci datus,
entissimus est in *tumoribus induratis internis & ex-*
is dissolvendis, a quibusdam etiam *athiops minera-*
valde commendatur, quamvis a *Boerhavio* in che-
sua tamquam corpus iners rejiciatur: quæ vero re-
dia omnia diu sunt continuanda, præsertim in malis
inveteratis, vitata molesta salivatione; alias bre-
tempore parum vel nihil efficere solent.

X X X I.

Conveniens simul his in malis *viæ ratio est obser-*
da, vitando omnia *alimenta austera, crûda, crassa,*
ulenta, difficulter digerenda, olera hyberna, legu-
ia ac similia; itemque voracitatem ac nimiam et-
alimentorum teneriorum aut leviorum copiam;
m frigidum & insalubrem, *mærorem, tristitiam,*
ium otium, &c. sed contra corpus sæpe exer-
nt.

X X X I I.

EXTERNE pro scopo glandulas & scirrhus recentes
blvente hic conducit *fotus spiritus vini calidi* sim-
is, cum spleniis sæpe super impositus; vel *spiritus*
camphoratus & crocatus, aliquoties in die reno-
vatus.

2. Pul-
veribus
digeren-
tibus.

Viæ
ratio

Reme-
dia ex-
terna.

vatus. Ita & *emplastra resolventia*, ut sunt empl. ranis Vig. cum mercurio, de meliloto, diaphor. Myns. diachylum, aliaque in Institut. chirurg. no. p. 337. commendata, calide his tumoribus imponi prædictus fatus, si lubet, vel & *sacculi digerentes* de supperaddi apte possunt, vel ex herbis & floribus fragrantibus, vel ex cineribus calidis, vel ex sale arena compositi; hinc & *Deidier* in mammis scirrhus valde commendat *arenam maris calidam* (a); cuius ro forte arena vulgaris cum sale æquipollet. *Vapores acidi* a quibusdam etiam vehementer laudantur, quibus quoque uberius Institut. chirurg. nostr. videri sunt.

X X X I I I.

In quibusdam ad glandulas & tumores scirrhus discutiendos egregium quoque est *oleum philosophorum* & *balsamum sulphuris* *Ruland.* si aliquoties in die calide ac probe fricentur, supradato postea *emplastro* *fotu* vel *sacculo* ex modo commendatis. Illorum etiam valde efficax est *Linimentum* ex oleo destillato, saponis, petroleo albo, axungia humana & unguento martiali *August.* paratum, cui postea *emplastrum* ex gummi ammoniaco, vel de sapone vel de meliloto, vel de sperm. ceti, aut de ran. Vigon. cum mercurio superimponendum, factaque his emollitione & *plastrum* oxycroceum cum diaphor. Myns. sufficere avertat *Mittermayer* (b), si modo interna supra lauta simul diligenter assumantur.

Si a labe venerea, ut sæpe fit, istiusmodi tumores oriuntur, *unguenta mercurialia* utilissima & valentissima sunt, si eis sæpius calide & diu probe fricentur, quæ vero & in aliis prosunt, si interna non neguntur.

Si vero omnia hæc, ut haud raro contigit, parum essent, *scalpello* sæpe excindi possunt, quando locus mali conditio extirpationem admittunt; qua vero re conf. Institut. nostræ chirurg. P. I. lib. IV. Cap. item P. II. Cap. 98.

XXXIV

(a) Lib. de tumor. p. 127. (b) In dissert. de fistulis Bungenium.

X X X I V.

Cancrī curatio.

Quod si vero scirrhus extirpari nequeat, aut ægri Cancrī
 irpationem ejus admittere nolint, is tamen *dolere* curatio
ipiat, *inequaliter* tumeat, augeatur, venæ circa il- interna.
 n, ut sæpe fit, intumescant, & sic malum *carcino-*
tis; quod vulgo *cancrum* & quidem *occultum* appel-
 e solent, (a) indolem assumat, studendum est, ut
dolores, quia tolli prorsus vix possunt, quantum fie-
 potest, *ægris leniantur* ac *tolerabiles* reddantur; id
 od tamen difficillime ac raro, præsertim in mam-
 rum cancro, utpote frequentissimo, obtineri potest,
 at jam dudum expertissimus *Hildanus* monuit, (b)
 andumque est, ut meliora aut valentiora his in
 lis cognita essent remedia, quæ huic scopo satisfa-
 ent, quam quæ hucusque ad nostram cognitionem
 venerunt; cum e contrario a quamplurimis po-
 s remediis, ut §. 28. jam diximus, exacerbentur,
 ue incrementa sumant. Interea tamen *interne*, præ-
 temperantiam & aptam victus rationem, *decocta*
zorum, vel horum loco decoct. *cortic. ulmi*, & fo-
 um *saniculæ*, (c) *pulveres antispasmodici* & *nervi-*
 primo sine anodynis aut opiatīs, sed si illi non
 iciunt, cum extractis papaveris aliquot granis, vel
 um loco emulsionem papaverinæ, aut *Essentia croci*
 o malvatico parata, & vesperi ad gutt. 30. & plu-
 sensim data; vel hujus loco laud. liquid. *Sydenha-*
 a gutt. 15. ad plures sensim ascendendo, egregie
 efaciunt; vel denique & massa pilul. de *cynoglos-*
 cum pulveribus antispasmodicis, a gr. j. ad plura
 endendo; aut denique ipsum, si prædicta parum
 t, *laudanum opiatum*, quia natura sensim huic vel
 illi

a) Plura hac de re in Institut. chirurg. n. p. 242.
 i possunt. (b) Lib. de Gangrena, Cap. VII.
) Quod *Harris* in dissert. chirurg. sua X. valde com-
 mendat.

illi assuescit, ita ut mutatione remediorum subinopius sit, si aliquid levaminis ægris præstare velimus. His *lenia purgantia* & cumprimis extract. *bellebor. nig.* cum *mercurio dulci* a RIVERO etiam feliciter usum patum (a), interponenda, & in plethoricis, vel in consuetæ sanguinis evacuationes suppressæ, *sanguinis attractio* subinde instituenda, pro ægrorum & rerum quæ circumstant, diversitate.

X X X V.

Remedia
externa
canceri
occulti.

Extrinsècus super *scirrhum dolentem* aut *cancrum impientem*, vel saltem adhuc *clausum*, *lamina plumbea* mercurio imprægnata imponatur, qua subinde in nonnullis dolores per aliquod tempus egregie leniuntur, vel loco hujus varia *emplastra* & *unguenta saturni* commendantur, quæ vero, quia jam Institut. chirurg. nostr. p. 340. nominata vel descripta sunt, ne actum hic agere videar, lectorem ad illas remitto. Maturum vero *Carcinomatis extirpatio* præcipuum hic est remedium; quamvis hoc malum etiam post hanc sæpe redeat, ut sæpius expertus sum, & nemo certam curationem spondere possit.

X X X V I.

Si cancer
exulceratus.

In cancro exulcerato, qui ut plurimum vehementius me dolet & foetet, præter ea, quæ in Institut. Chirurg. nostr. ad hoc malum leniendum commendavimus. *Harrisius* adhuc laudat *terebinthinam* splenio illitam, quæ etiam subinde revera aliquid præstat. Ita & *per vere ligni sancti*, *sarsaparillæ* & *santali citrini* *marmam* *cancrosam* se curasse scribit, loco antea citato parte solum a frigore defensa; qui vero pulvis fortis quædam, certe non adeo multas liberabit; parte læsam etiam tenui *lamina plumbea* & *splenio spiritus vini imbuto*, obtegi suadet. Alii *succum tabacci* recens expressum, tam mundandi, quam consolidandi fine laudant. Alii *succum bellæ donnæ*, alii *folia* & *decoctum* ejus & *externe* & *interne* magnificiunt (b), verum fine.

(a) Obs. 97. Cent. I. & Scultet. in Armam. Chirurg. Obs. 55.

(b) Qua de re videri potest dissert. de Bella donna Halæ edita.

ne fructu hæc adhibita fuisse novi. In quibusdam a-
sa calcis cœrulea aliquid levaminis præstitit; in qui-
 busdam *unguent. nutritum*, ex aceto lythargyr. cum
 oleo rosarum, vel solani paratum; in aliis *spirit. vini*
 simplex linamenti impositus. Si vero hæc omnia pa-
 ram sunt; *ferrum* sæpe, præsertim si mature adhibea-
 tur, sanat. Verum ab omnibus his certam curationem
 non esse expectandam, usu didici. Si *emplastro* tegeren-
 tur & ea ægra ferre potest, optima sunt *saturnina*, &
 imprimis illud de minio camphora roboratum.

X X X V I I.

Ubi *obstructiones & inflammationes a ligaturis* fortio-
 bus, ut in fracturis, vulneribus, hæ sunt solvendæ &
 moderatius adstringendæ, adhibito simul fomento dige-
 nte ex spiritu vini calido vel aqua calcis cum spiri-
 tu vini camphorato. Quando ab effusis humoribus in-
 pite, sive calvaria, & hi resolventibus medicamentis,

Obstru-
 ctiones a
 vasis cõ-
 pressis.

Chirurgia nostra, cap. de capitis vulneribus, lau-
 tis, tolli non potuerunt, perforatione sive *trepana-
 ne*, ut vulgo vocant, cranii; sed si qui in tho-
 ace effusi, & præsertim pus in *empyemate*, aut san-
 is in vulneribus pectoris, *paracentesi* sunt educen-
 di, de quibus operationibus vid. Institut. nostræ chi-
 rurgicæ.

X X X V I I I.

Extranea aures vel nares obstruentia, ut pisa, fabæ,
 pilli, vossellis uncinulisve eximenda, id quod et-
 iam in calculo urethræ fieri debet. Polypi in naribus,
 rentia in œsophago, prolapsa solida in asperam arte-
 m, tubercula sive tumores e vagina uteri aut inte-
 no recto excrecentes & vias naturales obstruentes,
 inque ita dicta *caruncula in urethra*, manu quoque
 chirurgica sunt auferenda.

Obstru-
 ctæ au-
 res, na-
 res, æ-
 sopho-
 gus.

Si viæ naturales, ut palpebræ, aures, nares, anus,
 gina uteri, urethra p. n. sunt coalitæ, ut in ita di-
 s atretis, scalpello sectione provida sunt aperiendæ.
 omnium denique obstructionum, ut brevis sim, quæ
 num chirurgicam requirunt, curationes ex Institut.
 chirurgic. nostris peti possunt, quæ in ejusmodi malis
 solvendæ.

Partus difficilis est quoque species obstructionis dum foetus in partibus genitalibus hæret, eas obstruit & transire nequit; verum de hoc quoque ample satis in Instit. Chir. egimus & nonnulla adhuc infra, ubi de morbis mulierum Cap. XVI. acturi sumus, proponemus.

C A P U T XIII.

De Fluxibus sive Fluxionibus, iisque maxime serosis.

I.

Quid fluxus. **F**luxus p. n. opponuntur obstructionibus, atque per eos intelligimus quascumque profusiones aut affusiones p. n. sanguinis aliorumve humorum sive utilium, & ve excrementitiorum, corpore humano: unde debilitas & rium aliaque symptomata, immo, nisi in tempore iuste succurratur, sæpe mors, sequuntur. Quoniam vero de fluxibus sanguinis plerisque supra Cap. V. jam actum est, reliquos hoc in capite proponemus.

I I.

Contingunt variis in partibus. Contingere solent tales fluxus in capite, thorace abdomine, partibusque genitalibus utriusque sexus, & in tota peripheria corporis. In capite contingunt fluxus lacrymarum nimius sive lachrymæ involuntariæ, ocululus lacrymans quoque dictus & epiphora, atque deinde rhyas, coryza, ptyalismus sive sputatio aut salivatio nimia, &c. In thorace, tussis humida, rheuma, & catarrhus pectoris, cum vel sine difficili respirazione, vel raucedine. In abdomine, diarrhœa, dysenteria, eaque vel cruenta vel biliosa, vel purulenta; enteria, cœliaca passio, cholera, vomitus, fluxus hepaticus, diabetes, urinæ incontinentia, pollutio nocturna nimia, gonorrhœa & fluor albus: sed de his duobus ultimis quoque jam Cap. VIII. ubi de cachecticis affectibus egimus, dictum est. In corporis peripheria sudor nimius & ulcera serosa occurrunt.

III.

I I I.

CAUSSA horum fluxuum generatim vel in humoribus hæret, vel in partibus solidis; in humoribus, quantum vel quantitate, vel prava quadam qualitate, aut motu turbato peccant. A quantitate excedente oriuntur epe diarrhœæ serosæ ac biliosæ, dysenterix, vomitus, cholera, sudor nimius, omnis generis catarrhi, tussis, coryza, præsertim si transpiratio ob quamcunque causam fuit suppressa, vel crapula præcessit.

A quantitate humorum, maxime spirituum, deficient, proveniunt debilitates, animi deliquia, urinæ & sæm incontinentia, ut & sudor frigidus debilium atque orientium, vel & validus quandoque nimius, sive colicativus, ut in hecticis & phthisicis.

A debilitate spirituum & inde pendente partium debilitate, observantur etiam, præter modo dicta malæ, lacrymæ involuntariæ, diarrhœa, lienteria, colica passio, diabetes, gonorrhœa benigna in viris, fluor albus diurnus & rebellis in quibusdam mulieribus.

Prava qualitas & quidem acrimonia humorum, præsertim biliosa, sæpe excitat vomitum, diarrhœam, dysenteriam, choleram; acrimonia serosa, partim eadem, partim tussim, raucedinem, coryzam; unde & ulcera scorbutica ortum suum trahunt. Ab acrimonia venerea, gonorrhœa, fluor albus virulentus, ulcera venerea, fistulæ, caries, spina ventosa aliaque mala producantur.

A motu turbato spirituum atque humorum, ut a terrore, metu, ira, oriuntur subinde, præter varias hæmorrhagias, diarrhœa, vomitus, cholera, alvi & urinae fluxus, uteri hæmorrhagiæ, immo abortus ipse invidis. Quo gravioribus vero comitati sunt symptomatibus, eo majus adest periculum.

I V.

In curatione harum fluxionum generatim ad diversas causas semper probe est respiciendum: ut si vasa & spiritus debiles, roborantia, tam ex diætâ, quam phar-
maceutica, sunt adhibenda; si humores acres aut biliosi, per contraria sunt corrigendi, alterandi, atque etiam evacuandi; si quantitate excedunt, purgantibus,

Curatio
genera-
lis.

diaphoreticis, diureticis, vel & pro re nata vomitoriis, sicut sæpe in diarrhœa & dysenteria opus, sunt expellendi. Si a motu turbato spirituum, hic quiete nervinis & anodynis in ordinem est redigendus.

V.

De Coryza.

Speciatim
coryza.

Speciatim in CORYZA, si fortior, (nam levior si modo conveniens victus ratio servatur, naturæ relinquenda) primo purgantia & postea diaphoretica anticatarrhalia sunt exhibenda, & imprimis Essentia quædam diaphoretica mane, & vesperi pulvis quidam diaphoreticus. His præmissis, externe omnia ex majorana confecta naribus modice attracta vel inuncta dissipant & roborant; vel semen nigellæ cum pauca camphora remixtum & naribus subinde admotum, itemque balsama cephalica, aut salia volatilia urinosa eadem ratione adhibita; sed cavendum, ne solis externe & quidem nimis cito, eam aggrediamur: quia abundans & noxium, quod expellendum, his ipsis repellitur, vel sistitur; unde dolores capitis, vertigo, alique graviora mala inde oriri solent. Dieta sit parca temperata, vitandusque aer humidus & frigidus; quavis iter sæpe aut motus fortior in quibusdam, ut sæpe expertus sum, hunc morbum solvat.

VI.

De Oculo lacrymante.

Oculus
lacrymans.

OCULUS LACRYMANS, si a debilitate glandulae lacrymalis oriatur, conveniunt primo roborantia externa, ut spiritus vini, vel aqua Reginae Hungariæ, qua simplici, vel aqua fœniculi, valerianæ aliave simili temperata, & superioribus palpebris aliquoties die illita. Interne, serum abundans purgantibus est evacuandum & revellendum, acrius vero balsamicis anticatarrhalibus est alterandum & corrigendum, Essent. succini & lignorum, ut & decoctis lignorum atque

etque simul revellendum, *vesicatoriis*, vel & pro re-
ata, *fonticulis*. Sed si *ductus nasalis* est obstructus, aut
caussa hujus mali sit *fistula lacrymalis*, vel aliud chi-
urgicum vitium lacrymantem oculum faciat, ex Chi-
urgia auxilium petendum. Vid. Chirurgia nostra, Cap.
de oculo lacrymante. Si *caruncula lacrymalis* vel ro-
tentibus medicamentis *erosa*, vel sectione improvida
oblata, vel aliam ob causam deficit, quod vitium *rhyas*
appellari solet, malum est immedicabile; sicut & si a
neftute oriatur.

V I I.

De Sputo nimio.

In *ptyalismo*, sputo aut *salivatione nimia*, præsertim *Ptyalif-*
m faucium magno tumore, humores revellendi & *mus*,
per alias vias, maxime autem per alvum, sunt eva-
uandi, atque vasa salivalia nimis laxa in ore roboran-
: quapropter hic purgantia, sed sine mercurio, &
stea sudorifera, anodyna atque gargarismata adstrin-
gentia requiruntur.

V I I I.

De Tussi humida, & raucedine.

TUSSI *humidæ* & *raucedini*, purgantia, & præser- *Tussis*
n potiuncula purgans ex fenna, manna, aliisque, & *rau-*
lubet, parata, ac deinceps diaphoretica & pectora- *cedo ab*
medentur: quæ tamen pro ratione causæ sive ma- *acri*.
tiæ peccantis varianda. Quod si enim materia reje-
ta sit *acris ac tenuis*, incrassantia, oleosa & mucila-
nosa danda: ut saccharum candum, vel saccha-
um hordeatum, vel succus *Glycyrrhizæ* vel *massa*
floralis ex cremore hordei, saccharo, gummi ara-
bio aut tragacanthæ in formam morsulorum reda-
ta, de qua sæpius frustulum in ore dissolvitur, ac
sim deglutitur; vel rotulæ diatragacanthæ, aut
chisci becch. albi, vel ol. amygdalarum dulc.
um aut cum sirup. flor. papav. vel violar. tem-
peratum; *juscula* mucilaginosæ ex hordeo, ave-

na, oryza, fagopyro aut similibus parata; *infusa pectoralia*, ex radic. liquirit. ficubus, dactylis, passulis & herb. pectorali composita, ut sunt spec. pectorales nostræ, Dispensatorii Brandeb. aliæve similes, atque tussis vehementior, *anodyna*, ut massa pilularum distyrace vel de cynoglossa, vel laud. opiat. parca copia vel Rotulæ beccicæ opiatæ disp. Brandeb. vel *emulsion*es ex sem. papav. albi, vesperi exhibita.

I X.

Tussis a
caussa
viscida.

Sin materia tussis est viscida & tenax, resolventia attenuantia, abstergentia, lenibus dulcibus remixta optime conducunt; ut radices & herbæ pectorales attenuantes: rad. scilicet helenii, pimpinellæ, irid. florentinæ, herb. veronicæ, hyssopi, scabiosæ, tussilaginis, cum sem. fœnic. anisi & anisi stellati, in forma infusi, vel decocti, atque præter hæc inprimis etiam *sperma ceti* in jusculeo calido; vel decocto Coffeæ aut pectorali filtratum, vel cum lapid. cancr. & saccharo in pulvere redactum, atque aliquoties in die apta dosi adhibitum cui etiam aliquot guttulæ olei anisi instillari commode possunt. Ita & spec. diarr. vel in pulvere vel in rotulis, Elix. pectorale Wedel. Essent. helenii, pimpinellæ albæ, spirit. salis ammoniaci anisati, sirup. de eriofin. Lobelii, egregie hic profunt, præmissis & interpositis, pro re nata, idoneis *purgantibus* ad pituitam abundantem a pulmonibus revocandam atque evacuatam. In *sexu feminino*, quia mensium sæpe obstructio & redundans ad pectus sanguis tussis producit ac curat, horum fluxus, ut supra Cap. IX. docuimus, restituendus; interea tamen hic *pediluvia* revellendi bene profunt, sed inprimis *Venæ sectio in pede* quoque multum confert, & diuturnam tussim inde ortam, aliter frustra adhibitis, sæpe sanat. Confer, Histor. Morbor. Uratislaviensis.

X.

De Diarrhœa sive Alvi fluxu.

Diarrhœa. DIARRHŒA, quia sæpe est fluxio sive excretio naturæ salutaris materiæ alicujus abundantis aut vitiosa.

e, præsertim si æger inde non debilitatur, & cibi fastidium deest, *principio non est sistenda*; sed vel abstinentia curanda; vel *potius evacuatio* supervacui aut novi *juvanda*, potu scil. calido diluentium temperantium; ut aquæ calidæ aut tepidæ, Theæ, Coffeæ, juleculi tenuis e carne quacumque, decocti hordei vel avenæ, immo subinde leni laxante ex rhabarbari pulvere aut decocto, vel ejus essentia, vel potu aquarum mineralium temperantium, ut Selseerensium, aut purgantium, ut Egrensiarum, Pyrmontanarum, &c. ad libitum ij. vel iij. tepide haustarum. Postea vero *stomachicæ* roborantia specifica, ex mentha, cydoniis & cinamomo parata, ut aqua menthæ cum vel sine vino, aqua cinamomi simplex & cydoniata vel vinosa, itemque theriacalia, ut theriaca vel diascordium a 3ss. ad ℥i. per intervalla data optime opem ferunt, observata simul quiete corporis & calore temperato. Si in forma guttarum remedia desiderentur, omnis generis Essentia stomachicæ, & cumprimis Ess. Nucis Mosch. cinamomi, terræ japonicæ, theriacæ vel diascordii hic conducunt. *Diarrhœa* tamen etiam *motu corporis*, *vectione cumprimis in curru aut equitatione*, immo & *supere provocato* haud raro egregie compescitur, nam una accretione aucta, altera imminuitur: quam ob causam & *vomitorium*, atque imprimis hypecacoanna sæpe crux ventris pertinacior, ut HIPPOCRATES (a), CELSUS jam dudum notarunt, atque recentiorum observationes quamplurimæ confirmarunt, compescere haud raro solet. *Externe* balsama stomachica ex ol. N. I. express. & oleis destillat. stomachicis, ut menthæ, sinthii, chamomillæ, mastichis, carvi, fœniculi & balsamo peruviano; vel ex theriaca & oleo Nuc. mosch. terata, ventriculo sæpius illinantur, superimposito etiam in malo graviore Empl. vel ex theriaca, vel de crusta panis, vel de tacamahaca, aut sacculis stomachicis, ex herb. menth. chamomil. rad. Zedoar. Galingæ, sem. carv. aneth. fœniculi supradatis, aut crusta panis tosti, cum spiritu vini calido vel vino hispanico

(a) Aphor. 15. Sect. VI.

nico imprægnata, ac nuce moschata aliisque aromatibus conspersa; vel cataplasmate ex pane mellito, aromatibus roborato, & vino hispanico ebrio; vel & cataplasmate ex frumento saracenico, quod *Mayz* vulgo appellari solet, in formam pultis redactio. Quæ ipsæ etiam medicamenta & interna & externa roborantia: *hypercatharsi* adhibita, optime conducunt.

X I.

De Vomitu, & Hyperemesi.

Vomitus. Vomitus, quia sæpius etiam est naturæ excretio fatalis humorum noxiorum præsertim in ventriculo harrentium, cavendum quoque ne mox adstringentibus aut opiatis cohibeatur; verum studendum potius, ut ejectio eorum potu aquæ tepidæ, aut jusculi tenuis frequenti promoveatur; vel ipso etiam, si res id exigat leni emetico & cumprimis radice hypecacoannæ, nam hic sæpe verum est dictum vetus, *vomitus vomitu curatur*. Postea vero eadem roborantia interna & externa sunt adhibenda, quæ modo in diarrhœa §. X. commendavimus. Atque eodem etiam modo *Hyperemesi* sive nimius vomitus, a medicamento purgante vel emetico fortiori ortus, est curandus.

X I I.

De Cholera.

Cholera. In cholera, in qua vomitus & diarrhœa simul affligunt, & morbus ex his duobus quasi compositus est, quia causa fere eadem, saltem paullo vehementior, eodem fere modo procedendum: ab initio nimirum hæc excretiones adstringentibus aut opiatis non mox cohibendæ, sed potius largo potu aquæ calidæ, ut *Celsus* jam docuit; vel jusculi carnis tenuis calidi, quod *Sydenhamus* tantopere commendavit, vel decocti avenæ materia irritans, acris, quæ plerumque hic biliosa est diluenda, corrigenda atque evacuanda; postea vero, cessante cholera, quiescendum, ac ventriculus

us internis, externisque roborantibus ac stomachicis, modo in diarrhœa §. X. laudatis, vino item generoso simplici vel aromatibus, præsertim cinamomo aut masticæ imprægnato, aliisque idoneis, aquis, essentiis & elixiribus stomachicis roborandus ac restituendus, servata simul diætâ modica.

X I I I.

De Lienteria, & Cœliaca passione.

In LIENTERIA, ubi assumpta nondum digesta per vi fluxum excernuntur, id quod ventriculum debilem valde læsam ciborum concoctionem indicat, præmissa & interjecta evacuatione per *rhabarbarina*, ventriculi coctio stomachicis roborantibus, vino generoso, simplici & aromatibus roborato §. XII. aqua cinamomum, cortic. aurantiorum, stomachali quacumque, carnativa, vitæ Matthioli, pulveribus & trageis stomachalibus, essentia absinth. compos. Zedoar. galani, aliisque idoneis externis internisque, quæ §. X. in diarrhœa laudata sunt, est promovenda ac restituenda; servata semper parca diætâ, adjunctoque motu corporis frequenti, ambulatione, equitatione, venatione. In COELIACA PASSIONE, ubi chylosa materia sæpe per alvum rejicitur, id quod vasa lactea intestinis obstructa denotat, eadem conducunt, sed diætâ media his interponenda, ad vasa lactea obstructa aperienda.

Lienteria & cœliaca passio.

X I V.

De Dysenteria.

In DYSENTERIA, quæ vel *cruenta* vel *alba* sive *Dysenteria*, & in qua aliquid acre, quod intestina erodit, inflammât & corrumpit, (quodque propterea evacuandum & corrigendum) ad hanc materiam acrem irritantem temperandam, corrigendam & ex intestinis evacuatam, exhibendum i. vel *leno evacuans per inferiora*, ex pulv. rhabarb. cum pauxillo nitri, imprimis ubi æstus

æstus adest, vel ex anima rhabarbari, ad cochlear. vel ʒʒ. exhibita, vel ex infuso vel decocto rhabarbari cum fol. fenn. & tamarindis; vel etiam mox in principio *emeticum*, præsertim si per nauseam, pressione sensum, & anxietatem circa præcordia, vel vomitionem conatum indicatur, ex rad. hypecacoannæ, quæ hæc securissima ad grana XX. XXV. ʒʒ. vel ʒij. (a) vel & *potus aqueus calidus copiosus* assumptus: de quo infra pluribus.

2. Post 6. vel 8. circiter horas ab assumpto primo purgante vel emetico, *pulveres acrimoniam & æstum* si quis adest, *temperantes*, ut pulvis ex lap. cancr. vel conch. citratis, crystallo montana præp. & nitro, singulo bihorio vel trihorio ex aqua quadam diaphoretica, cum pauxillo aq. cinamomi cydon. roborata, vel potu conveniente sunt porrigendi; vel horum loco magno cum fructu, præsertim si nullus adest calor p. n. pulvis *gummi arabici* aut *tragacanthæ* ad ʒj. sæpe eodem modo exhiberi potest; quæ gummata ob vim temperantem & demulcentem in multis hic valde sunt egregia.

X V.

Quomodo
dolos
res mit-
tigandi.

Si vero dolores vehementes intestinorum sive tormina valde urgeant, optime profunt, præter modo laudatæ gummata 3. oleosa, ut ol. amygd. dulc. vel olivarum vel sem. lini aut papaveris, vel per se quodlibet, vel saccharo remixtum, sed larga dosi, singula scilicet vice ad ʒj. ʒjʒ. vel ʒij. & quidem aliquoties in die data, quia parca dosi parum proficit; quæ olea similia acrimoniam rodentem egregie temperant, partesque erosas demulcent ac rursus sanant, ita ut multi et vixit go solis hisce oleis & saccharo ab hoc gravi morbo liberent. Ita etiam pulveribus illis temperantibus *leuconodinum*, præsertim vesperi, contra illos dolores apte admisceri potest.

Præterea 4. *Clysteres* vel ex decocto seminis lini, vel ex

(a) Infantibus & pueris pro ratione ætatis tantum aliquot grana exhibentur, eaque subinde totus morbus tollitur, vel saltem minui solet.

lacte & oleo ac theriaca, vel sero lactis & theriaca, vel ex solo oleo olivarum aut lini, in malo vehementiori, sunt injiciendi, & quidem, si dolores urgent, aliquoties in die, quæ & *tenesmo*, symptomatice sæpe molestissimo, egregie medentur. Ventri deque vel eadem applicari possunt, quæ §. X. in diarrhoea laudavimus; vel *sacculus* imponatur e semin. carvi, anethi, & flor. chamomillæ; vel, ubi inflammationis in intestinis signa adsunt, *spiritus vini camphor.* calidus cum theriaca ope linteorum complicato.

X V I.

Loco potus ordinarii, *cerevisia haud bibenda*, præferenda frigida, aut sæculenta, quia hac ipsa omnia rediuntur pejora; sed potius his ægris suasi, ut utantur *cocto*, C. C. vel hordei succo citri imprægnato, vel *enæ*, vel *ichtyocollæ*, vel sero lactis, vel *aqua felsens*, addito semper pauculo lacte, quando ægri ab hoc non abhorrent, & quidem primis diebus larga copia & sæpius bibant, ad acria temperanda, eluenda & mulcenda. Sic *juscula* etiam *vitulina*, gallinacea, *urvecina*, præsertim incocto semine carvi, si æger iuvula non averfatur, haud raro egregie hic profunt; de his §. XXIV. plura.

Potus idoneus.

X V I I.

Quoties alvum deponere cogitur æger, patina aut vas quod huic usui idoneum in lecto ei subiciatur, ne sursum cogatur, ob frigus his ægris summe noxium evitandum, præsertim quando in loco non satis temperato decumbit. Sed si hoc præsto non sit, aut æger sursum malit, extra cubiculum haud prodeat, verum perstratae sellæ semper infideat, cui caloris causa vas supponatur aqua calida (in qua *verbenas* decoqui suadet ELSUS) impletum, lateresque calidi pedibus subjunguntur, ne frigore lædantur, corpusque in perpetuo calendo calore, vestibus probe defensum, ad transpirationem, quæ hoc in morbo plerumque imminuta, reatuendam, conservetur; omne enim frigus, quia transpirationem lædit, hic valde nocet & tormina auget: nec & potus semper sit calidus, aut saltem tepidus, reeturque frigidus qualiscumque quam solertissime.

Qui alvus deponenda.

X V I I I.

Degneri
modus
curandi
dysen-
teriam
hypeca-
coanna.

DEGNERUS, Medicus clarissimus Neomagenſis qui in vehementi dysenteria epidemica haud pride vixit, atque utilissimum librum cum multis egregiis observationibus hoc de morbo nuper edidit, initio ubi signa vomitum indicantia aderant, radicem *hypecacoannæ* optimo semper, ut asseverat, cum succet exhibuit; verum non solum in principio, sed etiam quovis morbi tempore, ubi indicia, noxiam quandam in ventriculo adhuc hæere materiam, se exhibebant nisi forte virium defectus aut aliud quid id verabat eam a ʒss. ad ʒij. dedit, & si hæc materiam flavam aut viridem sursum vel deorsum evacuabat; alvi fluxus ut plurimum inde minuebatur & ægri plerumque intra paucos dies reconvaleſcebant.

X I X.

Essentia
rhei.

Sed si adhibita *hypecacoanna* alvi fluxus cum ceteris malis continuabat, ad materiam vitiatam acrem, tamquam illorum causam, uberius & evacuandam & corrigendam, horis XII. elapsis, *essentiæ rhei aqueæ si animæ rhabarbari* cochleare dimidium vel integrum pro ægrorum diversitate, ipsis dedit, idque singulis IV. vel VI. horis repetiit, donec malum imminutum fuit; atque de hac præterea affirmat, materiam noxiam non solum omnem hac ipsa blande evacuari, verum etiam intestina debilitata egregie roborari; immo simul, quando dolores ægros vehementer divexant, eam quoque præstantissimum illis esse anodynum.

X X.

Non in omnibus autem curationis initium ab *hypecacoanna* fecit; sed ubi vel non indicabatur, vel morbus jam invaluerat, initium quocumque morbi tempore cum modo laudata *rhabarb. essentia* fecit, atque præstantissimos inde fere semper vidit effectus; ægri quoque, ut asseverat, hoc remedio evacuante non debilitantur, sed fluxus potius sub usu ejus continuato fessim, una cum ventris doloribus, imminuebatur, sæpe sine aliis remediis adhibitis plane cessabat, ægrique optime inde, nisi jam, quando accederet, profligati desperati essent, sanati sunt.

X X I.

Sed præter evacuantia hæc, si malum his omnino illi non potuit, *remedia quoque corrigentia & roborantia* in usum vocavit, inter quæ præ ceteris novum specificum, nimirum *decoct. corticis exotici, simarubæ di-* *De si-*
maru-
bæ vi-
ribus.
i, quod celebris JUSSIEUS jam antea in Acad. Reg. ar. 1729. valde commendaverat, extollit, cujus $\text{z}ij.$ libris circiter $ij.$ aquæ, ad residuum $\text{z}viii.$, pro tribus cyathis, coquuntur, quæ ordinaria dosis est, quæ hunc sistit. Si tamen hi tres cyathi hoc prima vice haud præstent, iterandum est illud decoctum, a plerumque post sextum haustum fluxus cessat, ætque ut plurimum jam ab altero cyatho multum le-
vaminis sentiunt. Attamen illud nunquam adhibendam esse præcipit, nisi evacuatis & liberatis prius prius viis a materia acri rodente, tanquam causa hujus morbi, per prædicta evacuantia. Vel etiam omni bihorio vel trihorio $\text{z}j.$ vel $\text{z}ij.$ hujus decocti ægris bibentibus dedit, ad plenam usque curationem, per aliquot dies. *Effectus ejus blandos & lenes esse docet, sine aliqua evacuatione, & dysenteriam, præsertim cruentam, ob ejus usu fere semper sensim decrevisse. Immo si*
hibitum hic fluxus, ut fieri quandoque solet, aliquando redierit, repetito ejus usu intra triduum denuo iterum curatum fuisse. Lenit (inquit) corrigit & roborat, ob amaritiem blandam, quam possidet. Si quibus
por ejus est adversus, addito sirupo quodam verb. rat. papaveris &c. emendari commode potest; in substantia vero ventriculo molestus est. Si decoctum hoc
consideratum effectum non præstabat, forte ob materiam non satis evacuatam, tincturam rhei laudatam bono
am successu ei admiscuit.

X X I I.

Denique notat DEGNERUS, ægros fuisse, attamen *Casca-*
aucos, ubi prædicta omnia desideratam opem non præ- *rillæ &*
stant, & præsertim ubi tonus intestinorum nimis *terre*
quantum debilitatus erat, atque tunc se ad fortiora *japoni-*
stringentia, corticem scilicet cascarillæ, ipsum pro- *cæ u-*
cessum esse: ubi autem primo non cascarillæ pulve- *sus.*
rum, sed plerumque ejus tincturam sive essentiam cum
simarubæ decocto mixtam, propinavit. Non raro etiam
hanc

hanc tincturam cum tinct. rhei, partibus æqualibus in decocto simarubæ dedit, atque bonum inde effectum vidit. Notat autem simul *decoctum simarubæ majorem vires in fluxu cruento*, quam bilioso, mucoso aut purulento, (quem vulgo *dysenteriam albam* vocant) exsternuisse; quo vero in casu *huic decocto cascarillam* utiliter admiscuit. Verum & hac nihil proficiente, tandem ad *terram japonicam* dictam, sive ad succum *catechu*, tanquam fortius adstringens, progressus est, eumque vel in pulvere vel in tinctura reliquis adstringentibus admixtum tutissimum deprehendit.

X X I I I.

*Radix
salab.*

Quoniam vero *in doloribus oleosa* a multis ob naturam peculiarem sumi nequeunt, loco oleorum supra §. XV. laudatorum, Degnerus contra vehementes dolores aliud specificum, *radicem* scil. *salab*, quæ orchidifera species esse dicitur, & naturæ mucilaginosæ esse valde laudat: cujus ℥j. subtilissime pulverizatæ in aqua ℥viii. infunditur, & leni calore extrahitur; postea per linteum expressa quiete in *gelatinam* abit pulcherrimam, de qua contra dolores singulis duabus vel tribus horis cochleare dimidium vel integrum, prout dolorum vehementia est, sumitur, qua egregie eos leniri, & intestina ulcerata sanari prædicat. (a)

X X I V.

*Victus
& regi-
men.*

DIÆTA ex Degneri consilio, *acrimonie alcalicæ* contraria, adeoque fere ut in febribus ardentibus moderata *acida* tantum abest ut noceant, ut potius tutius moderata copia omni cibo addi possint, & imprimis succus citri sive limonum, aut ipsum etiam acetum. Pro potu optime adhibetur *decoctum hordei* vel CC. cum succo citri, vel *decoctum album Sydenhamii*, vel *ichthyocollæ*, item Thea, Cossæ, aut horum loco *decoctum sem. Carvi*, quod egregium hic est anodynum cum

(a) Inquirendum an non idem effectus vel a nostris *orchidibus*, quæ quoque mucilaginosæ sunt, vel etiam a mucilagine radicis *symphyti* coctæ, vel *malvæ*, vel *altheæ* vel seminis *lini* aut *cydoniorum* vel *ichthyocollæ* alijsve similibus obtineri queat.

in & sine lacte ; vel etiam illorum loco & variationis causa *lac ebutyratum* & *serum lactis* ; (a) quibus horandi gratia subinde *haustulus boni vini rhenani* vel *osellani*, præsertim si æger illud appetat, interponi potest. Sed hæc omnia moderatis haustibus & non frigidè sunt bibenda. *Absint cerevisiæ*, præsertim sæculentæ & frigida; nam hæ sæpe æstate, ex mea sententia, dysenteria causa sunt, eamque magis & sæpius, quam lectus horæi, ut sæpius vidi, produciunt. *Vina dulcia* æcumque, *canariensia*, *hispanica* & *gallica*, immo & *bra*, & speciatim illud quod *Pontac* vocatur, aliave similia adstringentia his ægris nocere DEGENERUS quoque notavit, præsertim initio morbi, sicut omnia adstringentia. *Quies servanda & calor moderatus*, §. XVII. jam docuimus, cubiculo temperato, vestitus tegumentisque procurandus; *motus vero ac frigus* præsertim *potus frigidus*, aut *incessus per pavimenta frigida* aliaque frigida, nudis præsertim pedibus, sumuntur sunt noxia.

X X V.

Morbo multum imminuto aut omnino superato, conducunt *roborantia*, & tonum intestinorum restituentia; ut *c. de hyacintho*, *corall. rubr.* *terra japonica*, *terra allata*, *cort. cascarillæ*, *crocus martis* adstringens; *absinth.* *cort. aurant.* *cascarillæ*, *millefolii*, *ova duritiem cocta*, cum paucis aceto in pastu, vinum generosum, & si intestina valde erosa sunt, oleum lini vel amygdalar. dulc. vel olivarum cochlear. j. vel gummi arabici, ʒss. subinde interendum, factaque curatione, exacta & moderata vi ratio per aliquot adhuc hebdomades requiritur, quando noxium cibum atque potum, & cumprimis et frigus; alias facile morbus cum periculo redit, & osque perimit.

X X V I.

Præservationis gratia bona est servanda diæta, & de e quotidiè mane, ex Degneri consilio, *tinctura rhei* anl. j. assumendum. Ita & essentia *millefol.* cum essent. *Præservatio dysenteria.*

a) Quod Baglivius & Degnerus quoque valde lau-

sent. scordii, vel essent. pimpinellæ aut alexipharmacæ egregie conducunt, si quotidie bis, matutino scilicet & vespertino tempore, apta earum dosi utamur; *corpus a frigore*, ubi opus, probe defendamus, cerevisia fæculentam aut non probe coctam, fructusque horæ præsertim magnam eorum copiam vitemus, & moderatam diætam servemus. *Haustris vini rhenani generis* in pastu etiam ad malum hoc avertendum egregie prædest, & apud ægros *saliva non est deglutienda*, neque etiam *edendum* aut *bibendum*. Quibus nullum est negotium apud ægros, eos vitent, quia dysenteria sæpe valde contagiosa.

X X V I I.

*Monita adhuc quædam medica circa
dysenteriam.*

Monita practica. 1. *Nulla dysenteria periculo vacat*; adeoque nunquam flocci facienda; qua in re multi peccant, initio præsertim, nimis leve existimando, illamque sic negligendo, vel adhuc magis inepto vitæ regimine augendo.

2. *Haud facile sponte cedit*, & natura sola in curatione ut plurimum stat post principia, & parum valet; artis vero præstantia & Medici dominium super naturam hic egregie eminet; quia evacuando & corrigendo in tempore materiam noxiam & acrem, tantam quam causam mali, morbum plerumque feliciter sanat.

3. *Omnes, qui hoc morbo pereunt, ex sphacelo intestinorum moriuntur*; quare hic omni modo præcautus.

4. *Adstringentia* in principio & speciatim terrea, terra sigillata, japonica, corallia, C. C. ustum, corallus montana, croci martis, tincturæ martiales, iuniperi & vinum, Pontac dictum, aliaque ejusmodi, vitent, adeoque vitanda; quia retinendo vitiatos intestinorum humores eorum inflammationes, dolores, ulcerationes, itemque febres, aphthas aliaque mala immo ipsam mortem inducunt, in fine tamen, si

XXV. dictum est, roborandi causa adhiberi apte possunt; ubi ex DEGNERI sententia observatione *finaruba*, *casçarilla* & *terra catechu* reliquis roborantibus palmam hic præripiunt, & securissima sunt.

5. E contrario *diluentia*, *potus aqueus*, *copiosus*, *cadidus*, initio largiter haustus, ut cum primis hydrogæ, feri lactis, lactis ebutyrati, lactis ipsius, aquæ elserensis cum lacte, decocti hordei vel citrati, vel ad modum coffeæ parum rosti, vel ichtyocollæ, cum vel sine gummi arabico, aliive similes, tam egregie sepe profunt, ut multi fere solis his, mox in principio largiter adhibitis, servato simul apto victus regime, restituti sint.

6. Ita & *salia omnia*, intestinis erosis, nocent: neque *mineralia* quæcunque hic magni sunt usus; sed *vegetabilia* & nonnulla ex *animali regno* hic prævalent.

7. Omnia *drastica purgantia*, immo & *aloetica*, ac speciatim quoque *Beccherianæ pilulæ*, sive simplices, sive correctæ, ex DEGNERI & mea experientia, nihil boni præstant: quamvis hæ ultimæ a nonnullis in hoc malo valde commendentur.

8. Neque *gummata resinosa*, & nominatim *masticæ*, *olibanum*, aut *balsamica*, aut *balsamus peruvianus*, *terebinthina* &c. a multis olim hunc fluxum sistendi fine proposita, neque *sudorifera*, præsertim *caliora*, magnam virtutem hic exerunt.

9. *Rhabarbarum tostum*, a non paucis hic adeo laudatum, minus valet in hoc morbo, quam simplex pulvis & essentia ejus; quia torrendo vires ejus potius minuuntur quam augentur.

10. *Opiata* & inter hæc etiam *theriaca* ac *diascorium* in dysenteria Neomagensi nocuerunt; aliis vero locis, evacuata prius & correctæ probe materia nota, aliis admixta, sæpe profuerunt. Hinc caute observandum, ubi ea vel profint vel noceant.

XXV, I I I.

De Diabete.

In *Diabete*, cum scilicet *urina* eaque plerumque *crures*.
T da

da super potionis modum, cum ægri languore excernitur, id quod plerumque ob *renes debiles* & nimis quantum laxos contingere solet, præsertim in iis, qui potu quocunque, annis præcedentibus se *nimum* & *sæpius repleverunt*, roborantia, blande adstringentia, in primis species de hyacintho cum croco martis, & anodynis maritata, vel terra japonica aut ejus essentia tinctura martis cydon. vel tinctura vitrioli martis, & vinum rubrum, aqua temperatum, modica quantitate profunt; potus vero sit parcus, & nimius quicumque vitandus. *Exercitatio* quoque & fricatio corporis frequens egregie hic conducunt: quia partes roborant, & transpirationem augendo serum a renibus divertunt.

X X I X.

Urinæ incontinentia.

Urinæ incontinentia. *Urinæ incontinentia* recens, quia *Sphincterem vesicæ debilem* pro causa agnoscit, roborantibus & nervinis externis atque internis, martialibus, aromaticis ac spirituosus, balneis martialibus & nervinis, vino rubro vel alio generoso modice usurpato, curanda; atque externa præcipue regioni pubis & perinæi imponenda. Vt si hæc parum sint, & , ut haud raro fit, nihil efficiant, congruis *instrumentis* (de quibus in chirurgiæ nostra) cohibenda.

X X X.

De Pollutione nocturna.

Pollutiones nimia. In *pollutione nocturna nimia*, si a sanguine abundantia acri ac fervido originem ducit, præter venæ sectionem & diætam tenuem, refrigerantem aut temperantem ac potum aquæ, blanda acida, ut cremor tartari, hellebolicum rubr. Dresdense, temperantia citrata, rufescentia, cum pauco saccharo saturni & camphora profunt, vitandusque, quantum fieri potest, in somno decubitus supinus. Si vero debilitas jam insignis adsit, & *pollutiones tamen*, ut sæpius observavi, continent, & ratione

atio sæpe est perquam difficilis ; quia refrigerantia & tenuis diætâ adhuc magis debilitant, pleraque vero roborantia pollutiones provocant & augment, atque hinc rursus debilitant ; unde novi quosdam in summam corporis maciem, debilitatem cerebri ac memoriæ inidisse. His vero, quia acrimonia stimulans mali causa fuit, præmissis modo dictis, *cura lactea* per aliquot hebdomades adhibita egregie profuit : postea suasi alimentâ roborantia ex bonis jusculis & lacte, sed sine aromatibus aliisve acribus, itemque *emulsiones* ex amygdalis & seminibus frigidis, quibus malum tandem sublatum est. Quibus vero *pollutiones a seminis nimia coctâ oriuntur*, matrimonium est optimum remedium.

XXXI.

De Fluxibus a motu turbato.

Si a motu turbato spirituum, fluxiones oriantur, ut fluxus alvi post terrorem, tristitiam & metum, spirituosâ, roborantia, infusa aquea calida, motus corporis, imo in sanguineis ipsa sæpe venæ sectio conveniunt ; si iram vero fluxus ventris aut vomitus, quia salutares sunt biliosæ acris materiæ evacuationes, non mox sistendi, neque spirituum motus calefacientibus excitandus ; sed potius placandus temperantibus, absorbentibus, nitrosis & cinnabarinis : ut pulvere temperante, vel pulvere marchionis ac specifico cephalico Michael : ex aqua temperata assumptis, & denique quiete. Vitandæ contra sunt mox post iram evacuationes fortiores, præsertim emetica aut purgantia fortiora, quia turbatum nimisque exagitatum motum sanguinis & spirituum adhuc magis, ideoque nimis turbant ; itaque tandem ob causam vitandus cibus, aut potus, maxime spirituosus. Lene tamen evacuans ex rhabarbaro præsertim, aliove simili, aliquamdiu post assumptum non nocet : & quando post aliquod temporis ab ira interval- lum, amarities in ore, dolor ac pondus circa ventriculum, nausea, conatus vomendi, aut ipsa jam febris percipiuntur, lene emeticum, ad majora mala a bile coacta in primis viis hærente præcavenda, utilissimum

Fluxus a motu turbato.

esse cognovi : quamvis nonnulli id pro veneno proclamant. Vid. F. HOFFMANNI dissert. de emetico aut purgante post iram veneno.

X X X I I.

De Sudore nimio.

Cura-
tio, si ab
humo-
rum co-
pia.

Sudor nimius raro per se morbus est, verum plerumque non nisi aliorum morborum effectus vel symptomata est : quandoque tamen *sudor copiosus salutaris est excretio* sive crisis, qua natura a multis noxiis humoribus aut saltem a supervacaneis sese liberat, sicut in catarrhalibus, febrilibus, aliisque nonnullis malis fieri solet : ubi ægri hoc ipso vel a malis liberantur, vel saltem insigne levamen sentiunt ; *quandoque autem symptoma est*, quo ægri incredibiliter debilitantur atque extenuantur, quemadmodum hoc in hæcticis, phthisicis, febribus quibusdam malignis, aliisque quibusdam morbis observare licet, quibus in casibus etiam *colliquativi* dici solent.

X X X I I I.

Sudor copiosus & nimius. Quando forte a nimia humorum abundantia oritur nullo modo est impediendus : novi enim sic plures, qui quotidie fere mane in lecto fortissime, sine omni incommodo aut noxa sudarunt, qui ceterum sani vixerunt, leves & agiles inde fuerunt, atque ad magnam ætatem hujus beneficio pervenerunt, & qui male semper habuerunt, quando ille sudor consuetus matutinus non rite succederet, aut ob quamcumque causam impediretur aut interromperetur. Igitur ejusmodi sudor neque stragulorum refectione, neque refrigeratione, neque medicamentis quibuscumque adstringentibus aut opiatis est cohibendus, si tamen ille hominibus infirmis molestus esset, & imprimis illis noxius esse posset, quibus noctu sæpe aut summo mane, antequam hic sudor finitus, surgendum & in aerem frigidum exeundum esset, sicuti verbi divini Ministris, Medicis, &c. iis prout ter parciolem diætam in cibo & potu, suaderem. *si* pius

pius repetita purgantia, ut sic humores illi abundantes per aliam viam e corpore eliminantur; aucta enim una evacuatione, imminuitur altera, adeoque & hanc ob causam diuretica his profunt.

X X X I V.

Sudor nimius hecticorum & phthisicorum sive tabido- Si in he-
um noctu quoque potissimum eos affligens numquam *ctica aut*
evamen eis affert; sed potius mirifice illos debilitat, *tabe.*
adeoque symptomaticus est, atque non nisi curato mor-
bo, cujus symptoma est, curari potest, de quorum cu-
ratione supra Cap. VI. & Cap. X. §. XVI. egimus.
Interea tamen aliquo modo ipsum minuunt & calorem
temperant, primo tegumenta leviora, deinceps pulveres
temperantes, ex conchis vel lapidibus cancrorum citra-
is & nitro parati atque circa vesperam semel bisve
exhibiti; vel spec. de hyacinth. cum pauxillo nitri,
adjecto uno alterove grano mass. pil. de cynogloss. &
interjecto potu sufficiente feri lactis vel simplicis vel
cum herb. bellid. & acetosæ aut acetosellæ parati, aut
lactis ebutyrati, vel & emulsionis tenuioris: quibus si
non cedit, atque fluxus alvi adhuc supervenit, res
conclamata esse solet.

X X X V.

Sudores largi in fine paroxysmorum febrium intermit- Si in
tentium, itemque in crisi febrium acutarum boni post fe-
toris, non sunt impediendi; sed quia critici & salu- bres.
ares tranquillo decubitu, potu temperato sufficiente,
& potiunculis diaphoreticis ac temperantibus promo-
vendi.

Quando autem ægri post superatas febres intermitten-
tes multum sudant, ut sæpe fieri memini, interdium bis
vel ter ess. quædam amara cum quarta parte essent.
ortic. cascarillæ, noctu vero dosis spec. de hyacinth.
cum mass. pil. de cynogloss. gr. j. vel ij. data egregie
sudores hosce moderantur & tandem compescunt.

Sudores copiosi, iique præsertim frigidi, febribus acu-
tis & præsertim malignis, itemque inflammationibus
viscerum partiumque internarum, ut & gangrænæ &
phacelo supervenientes, ut plurimum certam brevi-
tate secuturam mortem indicant, nullisque remediis
cedunt.

X X X V I.

De Ulceribus.

Ulcerata In ulceribus serosis, serum abundans & acrius, pur-
serosa gantibus, cumprimis mercurialibus & balsamicis, item-
 que diureticis & diaphoreticis, ac nominatim essentiis
 & decoctis lignorum aut herbarum traumaticarum,
 est evacuandum ac divertendum, lymphæque corrupti-
 & acrimonia similibus, itemque succinatis, myrrhatis
 pilulis Beccherianis, aliisve ejusmodi balsamicis corri-
 genda; immo quandoque ipsa salivatione per hydrargy-
 rum, servando simul aptam victus rationem, & vitan-
 do actia, falsa, potumque nimium, ulcera hæc opti-
 me curantur. De externis medicamentis, conf. Chirurgia nostra P. I. L. V. C. III.

CAPUT XIV.

De præcipuis sensuum morbis.

I.

*Quomo-
do orian-
tur.*

Sensuum organa objectorum motus nervis recipiunt
 atque ope horum, si rite sunt constituta, ad co-
 rebrum & animam transferunt; quando vero vel in
 mechanica organorum fabrica sive in partibus ipsorum
 solidis aliqua læsio contingit, vel in humoribus, au-
 in spiritibus aliquod vitium oritur, sensus unus au-
 plures vel prorsus abolentur, vel solum imminuuntur
 vel depravantur, prout læsio illa & impedimentum
 actionis majus vel minus est: quandoque enim non
 tantum organum in una vel pluribus partibus sinu-
 læditur, sed vitium adhuc vel humorum vel spirituum
 accedit.

I I.

*Causse
genera-
tim.*

Quo minor est spirituum copia & in organa sen-
 suum influxus, eo minor est sensatio; hinc in *anima*
deliquiis & *apoplexia* a virium defectu, vel omnes ve-

ple-

plerique percunt sensus . Ita & quo humores magis vel minus circa organa vel nervos sensuum accumulatur & quiescunt , eo magis vel minus læduntur sensus . Ita & a læsione organi sensorii , verbi gratia , vulnere oculi , vel ruptura aut læsione membranæ tympani , visus vel auditus vel omnino destruitur , vel minuitur .

I I I.

Speciatim vero *cæcitas* oculo inducitur vario modo : *Speciatim visus tollitur in AMAUROSIS sive gutta serena* ubi nullum fere vitium in oculo apparet & æger tamen haud videt) quando spiritibus a cerebro per nervum opticum ad tunicam oculi retinam transitus ob quamcumque causam denegatur : quo casu oculus ipse quidem sæpe sanus & , ut jam diximus , fere sine labe apparet , attamen æger cæcus est . *sus vitia .*

SUFFUSIO sive CATARACTA plerumque ab humore crystallino opaco , ut in scriptis meis de cataracta evici , ut plurimum albicante sive gryseo aut margaritis simili inducitur ; rarissime vero a corpore membranaceo in humore aqueo genito , ut olim putarunt , fitur .

GLAUCOMA ex mea sententia a vitreo humore opaco originem ducit , quæ proinde opacitas , glauca , ut veteres docuerunt , profunde in oculo apparet ; cum in suffusione corpus opacum pupillæ sive uveæ parti posteriori sit proximum .

Amblyopia sive visus debilis , generatim , vel a spirituum defectu atque non sufficienti per nervum in retinam influxu , ut in senibus aliisque , vel a studiis nimis vel ab aliis causis valde debilitatis , vel ab humoribus , aut tunica cornea non satis pellucidis , provenit ; sive hoc fiat in senibus ob senectutem , sive in junioribus a causis externis sive internis , quibuscumque ; ab utroque vero caligo senum originem ducit .

Strabismus , vel a muscutorum oculi inæquali tractione sive hæc a spasmo , aut epilepsia , sive a paralyssi musculi cujusdam ortum trahat ; vel a puncto axis visionis in tunica retina læso .

OPHTHALMIA in inflammatione atque rubedine unicarum oculi & cumprimis tunicæ albugineæ consistit .

UNGUIS, *pannus*, & *pterygium* in membrana p. n. exterius corneæ adnata eamque obtegente, consistit.

LEUCOMA sive *albugo* ut plurimum a spissiori materia intra lamellas corneæ vel in superficie ejus hærente, vel & a cicatrice in cornea proveniunt.

NYCTALOPIA ut plurimum a *pupillæ nimia dilatatione*, ut in die satis constringi nequeat, ortum trahit, quo fit ut organum visus a nimia radiorum copia obruatur, ut sicuti noctuæ, interdiu videre nequeat.

Contrarium contingit in HEMERALOPIA, ubi vesperi vel in loco obscuro *pupilla nimis constricta* satis dilatari adeoque recte videre nequit.

MYOPIA vel a *cornea*, vel ab humore *crystallino nimis convexis*, vel ab oculis, consuetis aut usitatis iusto majoribus, ut leges optiæ docent, oriri potest. PRESBYTOPIA vero a contraria causa provenit; ad utraque vero vitia etiam totius oculi singularis conformatio, ut v. gr. nimis brevis aut nimis longa, &c. plurimum facere potest. Plura oculi vitia in Chirurgia nostra videri possunt.

I V.

*Auditus
lasi
causæ
& vitia
varia.*

Quod ad *auditus* attinet, tollitur hic vel nervo auditorio omnino obstructo, vel destructo, vel membrana tympani lasa, pertusa vel lacerata ex vulnere vel ulcere, aut ossiculorum *auditus* & labyrinthi corruptionibus variis, abscessibus, ulceribus, obstructionibus unde surditas provenit, licet causæ ejus sæpe ob situm absconditum perspicere nequeant.

DIFFICULTAS vero AUDITUS oritur vel a spirituum paucitate, vel a partium auris internæ ac præsertim membranæ tympani vel relaxatione, vel induratione, aut in partium labyrinthi obstructione, ut in senibus, literatis, aliisque debilioribus; vel ab humorum decubitu aut congestione, ut in plethoricis, nervum auditorium, aliasque organi *auditus* partes lædente; vel a meatus auditorii obstructione a cerumine aliisque corporibus peregrinis: unde pro diversitate læsionis levioris aut gravioris *auditus* magis etiam minusve lædi solet.

V.

Speciatim vero *tininitus*, *sibilus* & *susurrus aurium* oriri videntur vel ab obstructionibus quorundam vasculorum

um in membranis tympani, cavi tympani, vel lacinthi; vel a motu p. n. aeris in cavo tympani contenti; unde & quando *fragores* illos, qui a quibusdam præsertim surdastris in auribus sæpe, quasi sclopetus loderetur, percipiuntur, provenire verisimile est.

V I.

Gustus læsiones, atque *sapores inusitati* salivæ salibus *Gustus* egrinis, vel particulis biliosis immixtis debentur; vel *ol.* omnino *gustus tollitur*, aut salivæ nimis viscidæ, aut *factus* quæ nervis obstructis vel alia quadam ratione læsis, *læsus*. tum erit adscribendum.

ta & olfactus sublatus nervorum olfactoriorum obstructionem vel læsionem pro causa agnoscit.

V I I.

Fœtor corporis a sero corrupto & præsertim ejus particulis oleosis aut sulphureis corruptis & quasi putactis, dependet; nominatim vero *fœtor narium ex* rationi in narium membrana interna, sed maxime ossibus nasi spongiosis, ut in *ozæna*, vel *cancro* ipso etur; *fœtor oris* vero a putrilagine gingivarum aut tium, ulcere pulmonum, cruditatibus nidorosis intriculo hærentibus, vel a vermibus ventriculi, vel mercurialium medicamentorum usu & actione ortum it, qui *fœtor peculiaris* in ipsa salivatione ægro- maxime percipitur.

Fœtor corporis aut oris.

V I I I.

TUPOR partium & *tactus abolitus* ab obstructione *Stupor.* *paralypsi* nervorum cutaneorum, aut ab ipsorum corruptione alia qualicumque provenit; dum sic spiritus transire nequeunt, adeoque nec sensus tactus fieri est.

I X.

Sensus quoque interni varias patiuntur læsiones, & qui a primo vel omnino abolentur, ut in perfecta *aporia*, *epilepsia*, & *lipothymia* graviore; vel minuuntur, ut in hoc morbo levius affligente, vel in *memoria* *imminuta* aut prorsus abolita; vel depravantur, ut *judicio læso* ac deliriis. Considerabimus hic primo *MEMORIÆ DEBILITATEM* sive *oblivionem*, quæ spiritibus vel imminutis aut debilitatis, in senibus æpe, aut post febrem acutam, aut a venere nimia, aut

Memo- ria la- sa.

aut a studiis nimis , aliave causa simili quacumque oriri solet ; vel ab impedito aut confuso eorum motu in cerebro , vel a læsione quadam ipsius cerebri , ut anima suas functiones in eo perficere recte nequeat.

X.

Deliria. Deinde notanda DELIRIA , quæ sensus interni speciatim *judicii gravissimæ sunt læsiones* , & inordinatum spirituum motum in cerebro indicant , eumque nimis auctum , vel nimis imminutum . Nam in *febris* & *mania* vehementius commoti & efferati nunc aut furentes quasi sunt ; in *melancholia* vero non tam mobiles , sed quasi nimis fixi & depressi , vel ob humores nimis viscidos , vel propter obstructions in cerebro , aliasve causas . Ita & *deliria oriuntur* in plethorâ , quæ ægris a morbo vehemente , aut longo , *vigiliis præsertim* nimis valde debilitatis , utpote , quæ pestis moris esse *Hippocrates* indicat .

Sed CATALEPSIS a summa eorum fixitate & motu ad certum tempus impedito dependere videtur , dum ægri hi in eadem per aliquod tempus manent in futura , in qua , dum morbo hocprehenduntur , fuerunt .

X I.

Vigilia. VIGILIÆ NIMIÆ motum sive exagitationem nimiam spirituum in cerebro , adeoque organorum suam quietem læsam , a quacumque causa , sive a calore nimio , sive exagitatione & tenuitate humorum , sive ab animi affectibus vehementioribus , sive a doloribus inductum consequuntur , dum in somno spiritus quiescunt . Curæ & medicationes severæ ob eandem causam vigiliam concitant , sed *nimia ventriculi repletio* vigiliam quoque aut saltem somnum turbulentum valde interruptum producit .

X I I.

*Morbi
soporosi.*

SOPOR contra nimis sive affectus SOPOROSUS quo & *apoplexia* pertinet , ab impedito libero motu quidam nervosi sive spirituum per cerebrum & nervorum organa sensuum proveniunt , sive hoc impediuntur a *sulphure narcotico* in sanguine existente , sicut in opio , & aliis narcoticis continetur , oriatur ; sive a debilitate spirituum & inde pendente vasculorum cerebro collapsu ; sive a *plethora* in corticali cerebri substantia .

ma

dullarem ejus partem comprimentem ; sive a sero & guine nimis viscido , idem efficiente , vel medulla- n cerebri substantiam intrare non potente ; sive ab sione sanguinis vel feri intra cranium , a caussis ex- nis & internis , casu ab alto , fractura cranii , sive a moribus intra cranium obortis dependeat .

SOMNIA sive *insomnia turbulenta* a motu turbato rituum ob caussas quascunque provenire existimo ; ando vero ideæ in somno profundo fortius adhuc agi- tur , INCUBUS , immo *somnambulatio* sive *noctam- latio* inde oriri solent .

X I I I.

In *curatione* horum morborum generatim ad caussas Curatio o semper est attendendum , operaque danda , ut in genera- rituum defectu hi augeantur , in motu peccantes in lis . inem redigantur , & ut in organa sensuum spiritus ere fluere & agere possint , atque impedimenta a- nis horum , quæcumque illa sint , quantum fieri est , removeantur , organaque læsa corrigantur , aut ilitata rursus roborentur .

X I V.

Visus debilis & Amaurosis .

Generatim vero in *visus læsionibus* ac speciatim in VISU DEBILI , aut GUTTA SERENA sive AMAU- OSI incipiente aut saltem adhuc recenti , a spirituum ilitate aut paucitate , vel ab humoribus viscidis aut um decubitu sive congestione in vel juxta nervos op- os provenientiibus , medicamenta , quæ spiritus au- e , viscidosque humores partim attenuant , par- a revellunt , evacuant atque dissipant , interne t adhibenda : uti sunt , (præmissis & interjectis ido- s purgantibus , immo & subinde si vomitus indicantia unt emeticis) omnis generis cephalica (a) aromatica , car-

Visus debilis & amaurosis .

a) Galenus scite dixit : Qui oculos curare vult , curet us caput sive cerebrum , & qui hoc vult curare , cu- prius corpus reliquum .

carminativa, attenuantia, & inprimis herb. euphrasii, veronicæ, hyssopi, flores rosmarini, salviæ, cyani, fœnissi, fœniculi, radix valerianæ, fœniculi, lignum casia, safras, cinamomum, millepedes, in forma infusi & per veris usurpata, ubi & *succus millepedum recens expressus* peculiari per aliquot hebdomades ratione, quotidie solum licet in numero eorum ascendendo, assumptus egregie sæpe proficit, immo & *mercurialia*, & ipsa subinde *salivatio*, consideratis probe rebus circumstantibus, causis & subiectis, caute adhibita, sicut aliquoties videtur valde profunt, observato simul apto victus regimine (a). Si hæc vitia ab hæmorrhagiis consuetis suppressionibus præsertim hæmorrhoidibus aut mensibus, evacuationibus sanguinis usitatis neglectis, efficiendum ut illæ in ordinem rursus redigantur; vel si hoc fieri facile non possit, missiones sanguinis artificiales eis substituantur. Sed si a neglecta venæ sectione vel sacificatione hæc denuo instituantur.

X V.

Externe profunt revellendi sine fonticuli variis incisionibus excitati, *vesicatoria*, *setacea*, præsertim in phlegmaticis, vel *cucurbitulæ* & venæ sectio in plethoricis: faciatim etiam hic sæpe conducunt cauteria vel fonticuli in futura coronali aut in cervice; vel *setacea* in artibus facta, itemque *pediluvia* tepida frequenter adhibita. Oculis ipsis applicanda *roborantia*, ut aqua fœniculi, flor. cyani, valerianæ, euphrasii, rosarum, spiritus vini, aqua Reginæ Hungariæ, sal volatile oleosum S. vii, vel decoctum aut infusum rad. fœniculi in vino quæ omnia vel per se vel etiam cum sacculis ex herbis roborantibus & semine fœniculi paratis oculis sæpius illinenda vel super imponenda. Conducunt etiam humores noxios ab oculis abducendos *errhina* naribus attracta, & cum primis pulvis rad. iridis Flor. vel. stan. equinæ, itemque spiritus C. C. aut sal volatile oleosum naribus subinde admotum aut bregmati instillatum. Inveterata autem *amaurosis* ut plurimum sanabilis.

XVI

(a) Vid. dissert. nostra de Amaurosi salivatione curata

X V I.

Suffusio sive Cataracta.

Atque hæc omnia etiam profunt in **SUFFUSIONE** *Cataracta*
CATARACTA incipiente aut recenti, quæ ab *sta sive*
 moribus crassis, spissis sive viscidis, in humore cry- *suffu-*
 lino hærentibus, oriri solet; quia eos attenuant, *sio*
 solvant, fluxiles rursus reddunt ac spiritus augment,
 ut hac ratione quandoque pellucidus rursus redda-
 tur, visusque restituatur; quod si vero hoc obtineri
 nequeat, vel *cataracta* jam sit *inveterata* aut *matura*
 perfecta, manu chirurgica per acum est suppri-
 menda. Sed de his omnibus prolixius legi potest cura
 cataractæ & amauroseos in tractatione nostra de ca-
 racta prolixè tradita, & speciatim etiam de curatione
 alionis per acum Institutiones nostræ chirurgicæ.

F V I I.

De Maculis volantibus.

MACULÆ sive **IMAGINES** ante oculos **VOLAN-** *Imagi-*
S, quæ ab obstructis nervi optici aut retinæ fibril- *nes ocu-*
 vel a venulis ibidem p. n. nimis dilatatis mihi *lorum*
 videntur, difficillime tolluntur, præsertim si jam *volan-*
 inveteratæ, & haud raro vel amauroseos vel ca- *tes.*
 ctæ sunt prodromi; interea tamen in principio ple-
 ne ea ad obstructions illas referendas optime hic
 unt quæ §. XIV. & XV. modo proposuimus & com-
 idavimus, easque tunc sæpe vel tollunt, vel mi-
 nt, vel saltem pejora mala præcavent, præsertim
 onveniens vitæ regimen instituitur.

X V I I I.

De maculis in Cornea.

Maculæ in cornea, **UNGUIS**, *pterygium*, *leucoma*, *læ in*
vismus, sive *visus luscus*, alique morbi manuum cornea.
 open

openi requirentes, qui in oculo occurrunt, quomodo tractandi, ex chirurgia nostra, ubi prolixè de iis etum est, videri potest.

X I X.

Myopia, & Presbytopia.

Myopia MYOPIA nonnisi vitris concavis emendatur, & *Presbytopia.* autem omnino nisi ætate majore subinde curatur. §. XI. in PRESBYTOPIA, quæ quoque vix sanari potest perspicilla convexa, una cum medicamentis cephalicis & roborantibus, trageis, essentiis, infusis aquosis, vinosis, decoctis, ut & collyriis confortantibus §. XII. indicatis, adhibenda sunt, ut visus tanto diutius conservetur.

Auditus debilis. Auditus læsiones, & cum primis tinnitus aurium, que auditus difficilis, quomodo curandi, vid. Cap. N. XI. & XII.

X X.

Gustus, & Olfactus læsus.

Gustus, & Olfactus læsus. Gustus, & Olfactus plane aboliti, præsertim ubi causa non patet, vix aut difficillime ut plurimum restituitur; interea tamen §. XII. modo laudata remedia e quantia, resolventia, roborantia, cephalica & anticephalica sæpe haud sine successu adhibentur, quia obfusa vasa & nervos egregie aperiunt. Ubi vero gustus solus depravatus, & causa non adeo obscura, maxime in morbis cognitis, ut febribus, occurrat, sublato morbo præcipuo tollitur & hoc symptoma. Ita sapor acrius in febribus & extra febres, qui bilis copiam in ventriculo indicat, tollitur febrifugis, emeticis, purgantibus, acidis: sapor nidorosus, qui ab humoribus putridis oritur, succo citri, aliisque acidis, addito sublimi evacuante: sapor falsus, aqueis, & præsertim ac mineralibus, atque aqua calcis vivæ: acidus absorbentibus, terreis, salibus alcalicis, magnesia, pulvere sorbente VVedelii &c. imminuitur.

X X I.

in *fœtore corporis*, qui ab humoribus corruptis ortum *Fœtor*
 et, putrilago humorum est emendanda, balsamicis, *corporis*
 scorbuticis, purgantibus, sudoriferis, & speciatim *vel o-*
 cētis radicum & lignorum, horumque essentiis. Spe- *ris.*
 im in *fœtore & putrilagine gingivarum*, tinctura lacc
 nsi. cum tinctura flor. aquileg. maritata, est egregia,
 gingivæ eis sæpius fricentur, itemque myrrha & alu-
 a ustum reliquis pulveribus dentifriciis additum.
 & *sal vulgare* hic egregie prodest, si dentes & gin-
 e eo subinde fricentur.

in *Narium fœtore* ab ozæna, ulcus est curandum, ea- *Na-*
 si a lue venerea orta, vel eam comitetur, vix nisi *rium.*
 curialibus aut ipsa salivatione mercuriali tolli pot-
 Externe hic profunt aqua viridis Hartmanni, a-
 mercurialis, aliaque quæ in nostra Chirurgia cap.
 ozæna videri possunt.

X X I I.

in *stupore artuum*, qui ab obstructis nervis cutaneis *Stupor*
 videtur, præmissis purgantibus, revellentibus, præ- *artuum.*
 m mercurialibus, nervina ac spirituosa externe &
 rne, atque inprimis interne spiritus C. C. liq. C. C.
 in. sal volatile oleosum, externe spiritus formica-
 , lumbricorum, salis ammoniaci, matricalis, item-
 fricationes frequentes partium læsarum; sinapismi,
 praciæ rasæ aut cantharidum applicatio, fustigatio-
 cum urticis recentibus & balnea ex nervinis vel
 mis naturalibus, sicut in paralyfi, conveniunt.

X X I I I.

De Delirio acutarum.

in *delirio febrium acutarum* quid sit faciendum vi-
 potest supra pag. 65. & 66.

X X I V.

in *MANIA*, quæ delirium est cum furore & auda- *Deli-*
 spiritus efferati mitigandi, venæ sectione larga, *rium fe-*
 e subinde repetita; emeticis & purgantibus præ- *brile.*
 m ex helleboro paratis, decoctis aqueis, refrige- *Mania.*
 bus & temperantibus, præsertim herbæ anagalli-
 quod hic ut specificum valde laudatur; vel aqua
 sim-

simplice pura succo citri vel nitro largiter imprægnata, emulsionibus papaverinis cum camphora roborata vel & aliis blandis opiatibus cum humectantibus sive coctis datis; præterea *balneis & pediluviiis*, immo iam subinde in nonnullis *fustigationibus*: quæ ipsa quæque in *amore insano & furore uterino* haud raro conducunt: quo autem ultimo in malo matrimonium conjugum juvene vegeto ut plurimum optime prodest.

X X V.

De Melancholia.

Melancholia.

In MELANCHOLIA spiritus fegnes vel deprægnati (præmissis tamen alvum evacuantibus, & in sanguine Venæ sectione) sunt excitandi, humores crassi difficulter mobiles incidendi & resolvendi: id quod moderato usu vini generosi, motu corporis frequenter infusis herbarum attenuantium, solventium, aromaticarum aut cephalicarum, ut betonicæ, salviæ, lilis, rosmarini, additis cort. citri, vel cinamomi, aliisque similibus, loco Theæ usurpatis, salibus volatilibus, spir. C. C. lig. C. C. succinato, essent. cinamomi, cort. citr. cort. aurant. herbæ & flor. rosmarini, aromatica, spiritu salis ammoniaci vinoso, præsertim oleis gratis cephalicis imprægnato, & inde parato balsamo vitæ, ad modum Scroederi vel Hermannii, speciebus lætific. diamargarit. calid. cinnab. blandis martialibus, aliisque anticachecticis; quæ gratia spectacula & colloquia, musica, ambulationes in hortis amœnis, peregrinationes, aeris & regionum mutationes jucundæ aliæque mentis recreationes addendæ. Nominatim vero in *melancholia hypochondriaca*, primæ viæ & imprimis sanguinis congestio in vasis venæ portæ sunt respiciendæ: hinc sanguinis emissiones, moderata diætâ, infusa calida plantarum laudatarum aliarumque similium attenuantium, veres & essentiæ solventes atque antispasmodici, sunt egregii, vel & *aque minerales* eæque martiales legitime usurpatæ, & præsertim varias ob causas fontes ipsos, si fieri potest, addito & motu corporis frequenter.

quenti, sed moderato, ad humores & spiritus attendendos, corrigendos atque excitandos, sæpe sunt præstantissimæ.

XXVI.

De Incubo, Noctambulis, & Catalepsi.

Qui somniis turbulentis & incubo laborant, itemque Noctambuli sunt, aut catalepsi correpti, quia ab eadem fere causa oriuntur, eodem etiam fere modo, remissis pro rerum circumstantium varietate evacuantur & sanguinis missione, observata probe parca vis ratione, curandi.

XXVII.

De Rabie Canina sive morfu Canis rabidi atque Hydrophobia.

In rabiosi canis morfu, (qui hydrophobiam sæpe Morfus
in aliis gravissimis symptomatibus, brevique tunc canis
plurimum mortem inducere solet) prægressa im- rabiosi
missione in aquam frigidam, si fieri potest, interne & ra-
phoretica, præsertim theriaca cum aceto aut vi- bies ca-
vel essentia scordii cum spiritu vitrioli simpli- nina.
aut dulci parum acuata apta dosi, subjuncto fré-
nti potu aqueo calido, cumprimis infuso salviæ
scordii, & regimine sudorifero mature sunt exhi-
da, sæpius iteranda, diuque continuanda : quibus
m scarabæus majalis contritus subinde interponi
est, qui ut summum specificum contra hoc ma-
a multis laudatur. Externe præ omnibus vulnus
pello mox incidatur atque dilatetur, & vel ore,
modum Psyllorum apud veteres, exsugatur, vel cu-
situlæ ad sanguinem infectum atque venenum ra-
canis in morfu cum vulnere communicatum ex-
endum, applicentur, vel theriaca & aceto calido,
aqua salsa aut forti muria, probe eluatur ; aut,
præstantissimum a multis habetur, ferro candente
atur, ac denique ulterius tractetur, sicut in Chi-

rurgia nostra capite de vulneribus venenatis, docemus. Ubi *Hydrophobia*, sive aquæ aut potus met jam adest, raro malum curationem admittit. Inter laudata sunt adhibenda.

XXVII.

De Vigiliis nimis.

*Vigiliæ
nimie.*

In *Vigiliis* involuntariis *nimis* (§. XI.) quæ multis morbis ægros afficiunt, vel & sine aliis morbis multos misere affligunt, causa nota, si fieri potest, omni modo removenda, & spiritus nimium exaltati atque exagitati placandi ac demulcendi *emulcibus*, præsertim papaveraceis, aut essentia croci cum vino malvat. parata a gutt. XX. sensim ad plures descendendo, vel parca dosi laudani liquidi *Sydenhami* vel theriacæ, vel pilula una aut altera de cynoglossi vel extracto flor. aut semin. papaveris, non neglectis morbis concomitantibus. *Extra morbos* vero curæ meditationes severæ præsertim vesperi, sunt vitanda motus frequens corporis instituendus, nimiaque ventriculi repletio nocturna fugienda. Ubi *dolores in capite* sunt, hi antispasmodicis, temperantibus ac diaphoreticis sunt leniendi, atque causa eorum auferenda, & hæc non sufficiunt, blanda *opiata* his adjungenda. *senum* vero *vigiliis* potissimum curæ & sollicitudinis *nimie* ablegandæ: e contrario tranquillitas animi, sobrietas & spirituositas, & cumprimis modicus usus vini generosi, præsertim vesperi plerisque conveniunt immo & medicamenta *ambrata*, ut spec. diambromoschi, confect. alkerm. completa, theriaca, præsertim cum vino, & similia. Potus vero aquei calidiusculi quicumque, & imprimis Coffeæ, a meridie & vespere, omnibus iis, qui dormire nequeunt, quæ *vigiliis* involuntariis excruciantur, maxime vitandi.

X X I X.

De Memoria debili, & Oblivione.

Memoria debilitati prospici solet victu modico & ro- *Memo-*
 orante, medicamentis roborantibus, carminativis, aro- *rie de-*
 aticis, cephalicis, Tragea aromatica Aug. specieb. dia- *bilis*
 namom. pulv. stomach. Birckm. aliisque similibus, *cura-*
 em spiritu magnanimitatis, sive formicarum compos. *tio.*
 aurenbergii, spir. lavendulæ, rosmarini, balsamo vitæ
 hrœd. & Hoffm. sale volatili oleoso &c. interne &
 terne usurpatis. Præterea & præsertim in senibus,
 nfect. alkerm. completa vel anacardina &c. elæosac-
 ar. cinamomi cum cinnabari nativa, vel antimonii;
 e pulvis aureus Zellenfis &c. his in regionibus usi-
 tissimus: cavendum tamen, ne in usu horum, præ-
 tim ab hominibus calidioribus, copia excedatur, a-
 s hi ægri in febres vel maniam, stultitiam aut fa-
 tatem haud raro incidunt.

In senibus hoc in morbo aliisque capitis debilitati-
 s, medicamentis plerisque *ambra*, si eam ferre pos-
 t, utiliter plerumque admiscetur, adeoque & *spe-*
diambra & *diamoschi* tunc conducunt: ut pulvis,
 essentia ambrae cum fluidis roborantibus aliis: Ex-
 e vero aqua apoplect. Regin. Hung. spirit. lavend.
 sama cephalica, salia volatilia sicca vel fluida &
 uphæ roborantes adhibenda, *vitando simul causas*,
 potionem aut venerem nimiam, vigilias volunta-
 , meditationes nimias, & quæ alia forte huic ma-
 occasionem dederunt.

X X X.

De Apoplexia.

ad sensuum læsiones etiam quam maxime pertinet *Apople-*
lexia, adeoque hic de gravissimo & periculosissi- *xia*
 hoc morbo adhuc acturi sumus. Est vero Apople- *quid*
 generatim morbus in quo ægri sensibus & motu *quatu-*
 subito, nunc sensim privantur. Dividenda igitur *plex.*
 V 2 est

est apoplexia 1. in *levem*, quando prægressa vertigine aut dolore vel gravitate ac debilitate capitis, vel etiam sine his, quidam sensus & motus, vel in totum vel ex parte, reliquis adhuc integris, pereunt: quod in casu etiam sæpe motus linguæ & loquela læduntur. Quando autem in alterutra tantum corporis parte motus vel solus, vel simul sensus & motus læduntur, *hemiplegia* vocari solet. 2. In *vehementiorem* sive *fortiorem*; quando correpti vel prægressis modo dictis malis, vel etiam sine his, sensibus & motu amissis superstitite tamen respiratione & pulsu, ut plurimum cum stertore subsequente, prosternuntur; & denique in *vehementissimam*, quæ est, quando subito & uno quasi momento ægri, sine sensu & motu superstitite, mortui, quasi securi percussi, aut fulmine tacti, procedunt. Ex quibus signis & diagnosi ac differentia sumpta petenda. Quamvis vero *apoplexiam* haud raro *vertigine* præcedat, tamen inde non mox concludendum aut peritimescendum, ut multi faciunt, quasi ex quavis vertigine apoplexia sequeretur: quia multi hac diu laborarunt, ubi tamen nulla apoplexia secuta est; & versa multi apoplexia sunt correpti, quam nulla vertigo præcessit.

X X X I.

*Causæ
apople-
xiæ.*

Causæ antecedentes apoplexiæ sunt variæ; proximè vero *sæpissime* est *ruptura cujusdam vasis* vel sanguiferi vel serosi aut lymphatici in cerebro, unde humores in calvariam effunduntur, qui cerebrum & nervos comprimunt, eorumque functiones vel lædunt vel omnino tollunt: quemadmodum hoc in dissectis cadaveribus quamplurimis observatum est (a). Vel causa proxima quoque esse potest *obstructio vasorum in cerebro* & præsertim corticali ejus substantia, vel a sanguine nimis crasso & viscido, sicut præsertim in phthoricis sæpe contingit, ubi facies & oculi ægri rubicundi & sanguine quasi distenti esse solent; / ab humoribus pituitosis sive serosis viscidis, prout ægris

(a) Qua de re videri potest *Vvepferi* liber de Apoplexia & *Lancisii* aliorumque de Mortibus subitanis

gris phlegmaticis sive frigidis, præsertim senibus, qui
 usmodi humorum abundantia, cum in primis viis ex
 arva diæta, vel læsa ventriculi concoctione, tum in
 asis sanguiferis & toto corpore laborant; ex qua di-
 versitate & fundamento Apoplexia ratione causæ in
sanguineam & *phlegmaticam* vulgo & haud inepte di-
 di solet, quæ divisio etiam in curatione suam habet
 cilitatem. Denique hic morbus etiam a *spirituum* &
erium defectu & inde orto vasorum cerebri ac nervo-
 rum collapsu, oriri potest, id quod præcipue in seni-
 bus, deinde vero etiam in iis accidere existimo, qui
 el studiis nimis vel etiam venere nimia, aliisve de-
 ussis spiritus nimis absumserunt. Priori causæ pro-
 mæ, apoplexiæ scilicet sanguineæ, occasionem si-
 causam procatarcticam sæpe præbet *crapula* sive po-
 s vini nimius, aut spiritus vini aliorumve inebrian-
 am; hinc multos novi, qui inter vel brevi post con-
 via apoplexia correpti & mortui sunt; vel *ira* aut
otus quidam vehementior, &c. quæ omnia ad vasa in
 cerebro perrumpenda satis idonea sunt. *Apoplexiæ* vero
legmaticæ sive pituitosæ causa antecedens sive occa-
 esse potest voracitas sive nimia ventriculi, præser-
 in cibis viscidis ac tenacibus repletio, corporis & in-
 timis capitis refrigeratio; aer frigidus & humidus,
 quæcumque humores serosos viscidos adhuc magis
 gere possunt.

X X X I I.

Ex prædictis jam satis patere potest *Morbium hunc* Prognosis
acutissimum & periculosissimum esse, & qui- sis &
 in quo vehementior, eo majus vitæ est periculum; cura.
 eoque promptissimum exigit auxilium, quod vero,
 causæ diversitate, varium esse debet. In gradu
io sive vehementissimo nulla est curatio, sed in pri-
vel altero, præ omnibus, ad ægros hos excitandos
 nducit omnis generis remedia *volatilia, spirituosæ &*
 orantia naribus diligenter admovere, qualia sunt
 . salis ammon. simplex vel vinosus, spiritus C. C.
 liquor C. C. succin., vel etiam spiritus lavendu-
 , rosmarini aut similes; *salia præterea volatilia*
 plicia & oleosa, sive ea sint fluida sive sicca, vel
 æ spirituosæ, ut aqua Reginæ Hungariæ, analti-
 V 3 na,

na, apoplectica, &c. exhibitis simul interne aquis cephalicis spirituosissimis, & spiritu falis ammon. C. C. liquor. C. C. succin. Bals. vitæ Schrœderi aut Hoffmanni ac similibus; quibus addendæ sunt fricationes capitis, pedum, manuum, immo in malo graviori totius corporis commotio & agitatio, præsertim si æger a duobus aut pluribus personis robustis hinc inde per cubiculum diu multumque trahitur atque retrahitur; quo ipso nonnullos rursus restitutos esse & egredi vidi & alii scriptores testantur. Inter hæc vero in plethorica apoplexia, quam primum fieri potest, *la-*
giter sanguis, modo ex brachio, modo ex pede, modo ex jugulo, immo etiam ex ipsa arteria temporum educatur.

Quando his nondum excitantur, *scarificationes* cucurbitulis etiam in sincipite & occipite, itemque post aures instituantur, quibus ipsis ægri sæpius in altero gradu excitati & a mortis periculo liberati sunt. Quæ omnia vero mature & in principio adhibeantur, quia si tarde hoc fiat, nihil plerumque efficiunt.

Clysteres etiam *acriores* in intestina excitandi & revellendi causa injiciantur, itemque *vesicatoria* forte ex cantharidibus vertici, cervici, dorso ac suris eundem in finem superimponantur, iisque quam solertissime donec excitentur, continuetur. In leviori etiam leniora ex his remedia sunt adhibenda.

X X X I I I.

In *apoplexia phlegmatica*, *frigida* sive *pituitosa* ac *serosa*, præsertim si convivium, crapula aut repletio præcessit, atque æger adhuc deglutire potest, *emeticum* valens est exhibendum, ceteraque omnia hæc nus dicta, sola forte sanguinis detractione omissa, in plethora aut evacuatio sanguinis consulta suppressa si tam externe quam interne sunt facienda. *Ustio plantarum* pedis aut bregmatis a quibusdam etiam valde hic commendatur, adeoque si illa brevi nihil efficiunt, etiam hanc tam in hac quam sanguinea adhibere consultum est. Vid. Chirurg. nostr. Tab. X Fig. II.

X X X I V.

Si *apoplexia a solo virium defectu oriatur*, (quæ interdum etiam magis pro syncope, lipothymia aut animi defectione est habenda) tunc neque missiones sanguinis, neque emetica profunt, sed sola excitantia & roborantia §. XXXII. optime conducunt.

X X X V.

Æger excitatus roborantibus, postea donec vires pri-
nas, quantum fieri potest, recuperet, curandus, quæ *post pa-*
re vero uberius, ubi de paralyfi acturi sumus, pro-*roxys-*
nemus. *num .*

X X X V I.

Quia vero ii, qui semel apoplexia laborarunt, faci- *Præfer-*
denuo ea rursus corripiuntur, in plethoricis *optimum vatio .*
æservans est sanguinis missio, quovis trimestri spatio
stituta; præterea modica & temperans victus ratio,
medicamenta temperantia & blande roborantia, absti-
nentia a studiis, curis & meditationibus gravioribus,
anticulus aut setaceum, & usus aquarum medicatarum
igitimus, remedia sunt præstantissima.

X X X V I I.

De Paralyfi .

Paralysis, quia plerumque apoplexiæ soboles est, e-
sque quasi reliquiæ, eam hic mox subjungemus. *Est*
pro Paralysis morbus, in quo una alterave pars corpo-
s humani & haud raro dimidia ejus pars omni motu
subinde etiam sensu tactus privatur. Quando igitur
tegrum latus paralyfi laborat, apoplexia plerumque
ægressa est; quando vero certum quoddam tantum
embrum & nominatim brachium vel pes, dolores &
tarrhi ut plurimum præcesserunt, partesque paralyti-
e ut plurimum molles, laxæ & flaccidæ tactu perci-
untur. *Linguam* etiam, musculos penis erectores, &
hincteres haud raro quoque paralyticos fieri sæpius
servatur; quo primo casu homines vel difficillime
quuntur, vel prorsus loqui non possunt; in postero-
bus vero vel penem non erigere, vel urinam aut ex-
ementa retinere nequeunt. *Tremor & stupor partium*
paralyseos levioris species mihi esse videntur.

Paraly-
sis quid
est quo-
tuplex .

*Causſa
& pro-
gnofis.*

Ortum omnia hæc mala, me quidem iudice, vel a nervis partium læſarum obſtructis vel nimis quantum relaxatis tanquam cauſſis proximis obtinent. Quod ad *prognofis* attinet, curatu ſane ſemper eſt perquam difficilis, & præſertim in ſenibus, aut quando malum jam inveteratum eſt interea tamen quando adhuc recens eſt, & æger vel puer vel juvenis curationem ſæpe adhuc admittit; quamvis aliquando adhuc ſenes ſexagenarios, immo ſeptuagenarios, ceterum robustos ac vegetos poſt inſultus apoplecticos non ad eo graves aparalyſi pedis & brachii rurfus curatos viderimus.

X X X I X.

*Curatio
eæque I.
interna.*

Igitur quando poſt apoplexiam primi aut ſecundi gradus ægri ad ſe redierunt, verum paralyſis vel alterius lateris vel certarum ſolum partium, pedis, aut brachii, aut linguæ, ſicut ut plurimum fieri ſolet, indelinquitur, ad nervos læſarum partium adhuc obſtructos, aut nimium relaxatos, aperiendos & roborandos *interne aperiencia, roborantia & nervina* ſunt ſuadenda ut infuſum *herbæ ſalviæ* ad modum theæ, aliquoties in die hauſtum, quod admodum egregium hic eſt, vel herbæ betonicæ, roſmarini, chamædryos aut chamæpytyos aliarumve herbarum cephalicarum vel per ſe vel cum herbâ baſilici, flor. roſmarini, ſalviæ, lavendulæ, vel & cinamomo mixtæ, præſertim ægris frigidioribus & phlegmaticis, ubi humores pituitofi & viſcidipeccant; cum quibus infuſis etiam *balsam. vitæ Schradæri* vel *Hoffmanni*, vel bonum quoddam *ſal. vol. oleum Syvii*, aut aliud ſimile, vel eſſentiæ aut tincturæ quædam aromaticæ, item ligni aloes & ambræ, apta quantitate iis commode exhibentur. Horum loco, præſertim in ægris *calidioribus*, ſpiritus C. C. vel liq. C. C. ſuccin. vel mixtura roborans aut tonica, ex ſpir. C. C. & tinct. tart. parata recte dantur. *Aqua ſalviæ* tam ſimplex, quam inprimis cum vino deſtillata, etiam hic valde ſalutaris eſt, ſi ſubinde vel ſola ad cochl. j. vel ij. exhibetur, aut remedia laudata cum hæc aqua loco vehiculi porriguntur. *Elaeoſaccharum cinamomi* vel caryophyllorum per ſe, aut cum cinabari, mangaritis, & ambrâ in pulverem redactum, atque roborandi cauſſa, ad ʒſſ. vel ultra ſenibus & frigidioribus

aliis

quoties in die datum, egregie prodest; quam ob
 ussam *pulvis cephalicus*, *Zellenfis* dictus, qui pro ar-
 no ibidem venditur, atque ex his constare videtur,
 am in Saxonia nostra valde celebris & frequenti in
 a inter Magnates est. *Specificum* quoque *cephalicum*
 ich. & pulvis March. tanquam diu usitata ac lauda-
 nervina sæpe egregie profunt, iisque etiam si ægri
 abram ferre possunt, aliquot grana ambræ, immo
 ei quoque cinamomi & caryophyllorum, prout res
 igit, cum fructu addi possunt. Ita etiam *species de*
am. optime roborant & obstructions a viscido ortas
 solvunt atque aperiunt. In quibus vero ægri calor
n. percipitur, iis pulveres temperantes cinnabarini,
 antispasmodici & temperandi & resolvendi sine pro-
 pt. In nonnullis *cautus mercurialium usus* ad obstru-
 ones has pertinaciores tollendas efficacissimus est;
 mo & *aquarum medicatarum* vel tepidus vel calidus
 as contra hæc mala multis egregie jam profuit. Qui-
 s omnibus vero, prout res exigit, subinde evacuatio
 alvum & in plethoricis Venæ sectio aut cucurbitu-
 ficæ & cruentæ interponendæ,

X L.

Externe *litus & fricationes spirituoſi* ac nervini ad-
 bendi ex spirit. lumbric. formicar. C. C. serpilli, roſ-
 rini & lavendulæ, aut ex aqua Regin. Hung. &
 haltina, vel *pro pauperibus* spirit. vin. aut simplex
 rectificat. aut & juniperin. in quibus frustum sapo-
 veneti vel hispanici aliufve boni dissolutum est.
 l partes læsæ fricari apte possunt *unguento nerv. oleis*
 till. nervin. & aromat. imprægnato, ut ol. destil.
 cini, salv. roſmarin. lavendul. organ. majoran. &
 ilibus. *Balnea* denique tepida ex ejusmodi herbis
 ata, eaque *formicis* injectis roborata, ad nervos
 fructos referandos eosque nimis laxos roborandos va-
 tiſſima quoque sunt, sicut & *balnea ex thermis* na-
 alibus, vel aquis medicatis martialibus tepesactis &
 sat longum tempus usurpatis, quibus poſtea frica-
 nes modo laudatæ adhuc superaddi possunt. *Verbe-*
ones membrorum læſorum *cum urticis* recentibus ad
 mulandum atque alliciendum spirituum ad partes
 as influxum in quibusdam etiam valde condu-
 cunt;

2. ex-
 terna.

cunt; itemque *cucurbitule* siccae & cruentæ, immo & *vesicatoria* & rubefacientia iisdem partibus adhibita.

X L I.

Paraly- Speciatim in *paralyysi lingue*, præter commendat
sis lin- generalia, elæosach. cinam. vel caryophyllorum in lin
gue aut gua detinendum & liquefactum sensim deglutendum
penis aut *Aqua salviae cum vino* destillata & sæpius in ore de
sphincte- tenta linguas has egregie roborat. *Masticatio* frequen
ris. cinamomi, caryophyllor. cubebæ. aut rad. pyrethri &
similium valde quoque hic prodest, & basis linguæ est
tus sub mento spiritibus & unguentis illis nervinis §. XII
sæpius in die probe fricanda.

In *paralyysi musculorum penis* indeque nata coeundi
& generandi impotentia, quia erigi nequit, itemque
in *paralyysi sphincteris vesicæ* aut ani, latera radicis pen
nis, regio pubis & perinæi, non neglectis internis, im
dem externis sæpius inungenda: quibus in casibus etiam
iam balnea modo laudata tam artificialia, quam naturalia,
valde proficua sunt.

X L I I.

*De Syncope, Lipothymia, & Animi defectione
sive deliquio.*

Quid Sub his nominibus omnibus illud malum intelli
sint hæc gitur, quando homo vel ex virium defectu, præ
mala. tim ex hæmorrhagiis, vel ex subitaneo & vehementi
terrore, horrore aut meta, immo & visu alicujus
sibi adversæ, ut v. gr. aspectu sanguinis humani, v
neris, venæ sectionis, aliussve actionis chirurgicæ
læsionis paulo gravioris, sensibus & motu, vel ex p
te vel in totum privatur, cum faciei summo pall
instar mortui, pulsu vel summe debili, vel nullo; (C
ubi vero vel vellicationibus & commotionibus,
medicamentis volatilibus aut spirituosis aliisve rebus
mili

(a) Quidam Stahliani mira de animæ habitu in
morbis sibi fingunt, numquam probanda.

libus ut plurimum excitantur; & rursus ad se re-
ant, quo ipso hæc mala ab Apoplexia potissimum
tinguntur.

X L I I I.

Duplex ejus gradus commode statui potest; nimirum *levior*, vel *gravior*. *Levior* mihi dicitur, quando
in pallore faciei, visu turbato, vel & aurium tinni-
immo & quandoque vertigine, vires ita vacillant,
ægri sensibus magnam partem privati, procident;
vel mature decumbant, vel ab adstantibus susten-
tur, vel mox roborante remedio vel ori & nari-
bus, vel ambabus simul admotis aut ingestis reficiantur.
Gravior vero, quando per aliquod tempus sine o-
mni sæpe sensu, immo & sæpe sine omni motu de-
cumbunt, respiratione etiam & pulsu valde debilibus,
tamen remediis spirituosis naribus admotis faci-
s quam in apoplexia, perceptionis sensum manife-
nt.

*Diversi-
tas sive
gradus.*

X L I V.

Causæ pleræque jam §. 41. indicatæ sunt: quibus
nunc addi possunt morbi hysterici; dum fœminæ mul-
hoc morbo laborantes sæpissime animo, sine alia
assa manifesta, linquuntur; id quod a spasms pro-
pire videtur. Nonnullæ vero tantum vel plerumque
oc, quando rerum fragrantium suaveolentium odores
tribus hauriunt, ut rosarum, liliorum, tuberofarum,
rum aurantiorum, ambræ, moschi, zibethi, benzoes
censæ, vel styracis, aliorumque similium: atque hæ
orthymia hysterica vocari solent. Nonnulli vel nimis
diis vel nimia venere delassati, vel inedia quoque
hausti hisce malis corripuntur.

Causæ.

X L V.

Diagnos ex §. XLII. & seqq. peti potest. Quod *Diagno-*
to ad *prognosin* attinet, ut plurimum ea plus terro-
quam periculi habent, nisi forte ex nimis sangui-
profusionibus, præsertim vulnerum, aut viribus
n ab alio morbo prorsus consumptis, aut vehemen-
tissimo terrore ortum ducant; dum plerique ægri cir-
instantem mortis horam, si forte ad lectum emen-
ndum, vel aliam ob causam eleventur & in sellam
locantur, animo linquuntur, ubi sæpe mortem in-
stan-

*Diagno-
sis &
progn-
sis.*

stantem indicant. Reliquæ & præsertim leviores animi defectiones minus sovent periculi, & solo plerumque remedio quodam roborante, ore assumpto, vel naribus quoque tantum admoto, resuscitantur.

X L V I.

Curatio
levioris.

Itaque si cui lipothymia incidit, quando vena inciditur, aut ab aspectu sanguinis, vulneris, ulceris, fracturæ, aliufve morbi cujuscumque, vel in conspectu operationis chirurgicæ, præsertim gravioris & horridæ, ut amputationis mammæ, brachii, femoris, oculi sectionis, &c. quæ species lipothymicæ ab horrore & metu, immo sola imaginatione haud raro proveniunt, dum nonnulli venæ sectionem sine lipothymia aspicere nequeunt; sæpe sola & matura mutatio oculi vel loci clausi cum aere libero, dum quis lipothymiam accedere sentit, remedio est. Illi vero qui jam gravius affecti, ut ambulare adeoque & locum mutare non amplius possint, solo odore aquæ Reginæ Hungaricæ aliufve similis aquæ vel spiritus; vel & vini aut aëti fortioris, immo & sola conspersione aquæ frigidæ faciem, vel & haustulo vini generosi plerumque recipientur; vel & aquæ cinamomi vel cedronellæ (a) cum vino paratæ, aliufve cardiacæ similis; quarum plurimæ sunt in officinis; & præservari, si ante venæ sectionem aliquid assumunt, & curari ab ejusmodi malis horrificis ut plurimum possunt; præsertim si homo cui vena secanda, antequam sectio instituatur, super lectulum deponitur, vel mox, si ex pallore inusitata faciei & sudore faciei animi defectionem instare intergimus, super lectulum vel scamnum, aliumve locum aptum promovetur.

X L V I I.

Curatio
gravioris.

In gravioribus animi deliquiis, ubi modo laudatiora cardiacæ sæpe parum sunt, valentiora adhibere convenit; ut sunt spiritus salis ammoniaci aquosus vel vinosus, qui naribus, temporibus & pulsibus extus cum

(a) Multi hanc herbam melissam Turcicam, a Moldavicam appellant, unde aqua cardiaca fragrantissima & efficacissima parari potest.

in fricatione sunt admovendi ; vel sal volat. oleos.
vii eadem ratione usurpatum ; immo & intus hæc
media ad gutt. XL. vel L. per intervalla exhibenda,
spiritus iis excitentur, augeantur, ac roborentur .
agendæ his sunt aquæ spirituosæ, ut cinamomi aut
aurant. aut cedronellæ, aut cheiri cum vino, vel
haustulus vini generosi, itemque vellicationes & fri-
ctiones extremorum, nasi, aurium, capitis, pillorum,
donec exsuscitentur & ad se redeant. Spiritus quo-
e C. C. & liquor. C. C. succinat. eadem, ut modo
aliis spiritibus diximus, ratione, cum fructu adhi-
i possunt ; immo & elæosaccharum cinamomi, vel
e cum cinnabari paratus pulvis cardiacus cellensis
ingestus, cum vel sine vehiculo spirituofo, multos
animi deliquiis resuscitat & vires reddit ; id quod
Bals. vitæ Schræderi vel *Hoffmanni* aliaque similia
estare solent .

X L V I I I.

Si fœminæ & præsertim eæ, quæ alias jam *hysteri-* *Curatio*
passionibus obnoxia fuerunt, lipothymiis corripun- *hysteri-*
, quæ tunc *hystericæ* vel *uterinæ* dici solent, vitan- *cæ lipo-*
omnia suaveolentia, & potius omnis generis fœtida *thymicæ.*
ibus sunt admovenda, & cumprimis castoreum, assa-
tida, pennæ perdicum accensæ, corium, cornu vel
ten accensum, vel & spirituosæ fœtida, præsertim
malo graviori, ut spir. C. C. liq. C. C. succin. spir.
tor. comp. Pharmacop. Londinensis, Essentia Casto-
vel assæ fœtidæ, quæ ultima etiam gutt. XXX. ad
vel LX. intus in his malis danda, non omiſſis vel-
licationibus & fricationibus partium prædictarum, §.
VII. qua de re etiam jam actum supra p. 185.

X L I X.

Si a sanguinis fluxibus nimis, sive vulnerum sive a. Si a san-
tum partium, hi ex chirurgia sunt compescendi, guinis
risque talia exhibenda, quæ cito ad vasa nimis eva- fluxibus.
ta transire eaque mature rursus replere possunt : ut
cula, lac, emulsiones, gelatinæ, quibus aquæ spiri-
osæ & haustulus vini generosi ad spiritus augendos
inde interponenda, donec hæc mala præterierunt .
æ remedia etiam optima sunt, quando animi deli-
ia in morbis quibuscumque, ubi vires valde detri-
tæ,

ta, a spirituum & humorum bonorum defectu ortu trahunt.

L.

De Epilepsia.

Epilepsia quid suum externorum internorumque subitanea plerumque & ejus abolitio, cum prostratione corporis & motibus musculorum, partiumque his nexarum, totius fere corporis violentis & invitis, alternatim facta contractione & remissione, a causa quadam cerebrum aliasve partes nervosas vehementer pungente vel irritante. Accedunt convulsiones, dum ægri corripuntur, ut plurimum polliculi intra manum & digitos contractio arctissima, terribilis sæpe vociferatio sive clamor inconditus, spuma, immixtus quandoque simul sanguis ex ore prorumpit, oculi, artus mirifice quandoque convertuntur aut inflectuntur, caput & brachia sæpe terræ vehementer allidunt, pedibus calcitrant, ventrem & pectus arcus in modum vel alia sæpe ratione, more quasi gesticulatorum, convertunt, linguam sæpe mordendo perfrangunt & anxie atque profunde respirant; quæ mala tamen omnia quibusdam, immo in eodem ægro, sæpe nunc sunt leviora nunc graviora, atque etiam in aliis, pro causa sive irritationis forte natura aut vehementia, fortius aut leviora. Neque etiam semper adsunt, sed per accessiones, post incerta temporis intervalla, nunc breviora, nunc longiora, affligunt ac redeunt: immo inter illas accessiones quoque nunc breviores, nunc longiores sunt. In pueris quoque ut plurimum omnia sunt violentiora, quam in adultis. Quando ejusmodi paroxysmus remittit, ægri iis fere sunt similes, qui ex profundo somno, post gravem præsertim crapulam, evigilant, caput ipsis dolet, quasi somnolentum, grave ac turbulens est, ita ut reminisci, recte cogitare aut judicare mox nequeant, & vix aut difficulter sciunt, ut sint, aut quid factum sit; totum corpus summe delassatum plerumque ita est, ut mox post paroxysmum surgere & ambulare haud valeant, quia motibus illis

olentis quasi contracti, & vires consumptæ sunt. Quorum horum ægrorum brevi ante accessiōem novum venturum paroxysmum præsentunt, atque tunc, si sapiunt, in super lectum, vel alium locum securum caute se mittunt, ne a lapsu improvise se lædant, & speciatim caput durius ad lapides allidant, vel omnino lapidibus per præcipitia se interficiant; plerique autem furore & sine ejusmodi perceptione, ubicumque sunt, prosternuntur, atque vehementer sæpe caput sibi lædunt, vel lapsu prorsus enecantur: atque ex his etiam ejus morbi *diagnosis* haud obscura erit.

L I.

Epilepsia varias habet differentias, est enim vel *idiopathica*, vel *sympathica*; recens vel *inveterata*; a causa vel externa vel interna producta; modo in *infantibus*, modo in *adultis*; modo ex vitio *cerebri*, modo ex *ventriculi* aut *intestinorum*, modo uteri. *caussa*. Differentiæ epilepsie & causæ.

caussa proxima, ut mihi videtur, est semper *causa quædam irritans*, pungens, vellicans, sicut id vel sola fecula ossis acuta cerebrum pungens, evincit, vel in infantibus dens gingivas urgens; vel in intestinis aut ventriculo vermes nervos vellicantes. *Stahliani* quidem ad eversionem confugere, ejusque prudenti actioni & directioni truculentissimos omnes illos effectus (§. L.) adhibere volunt; verum præterquam quod illi motus omnes, nescia immo & invita anima, contingunt, (namque illi motus sunt involuntarii) stultissima esset illi anima, quæ motus adeo horrendos, enormes, periculosos & sæpe funestos institueret, dum leniori sæpius modo se expedire posset.

Idiopathica sive essentialis rarior est *sympathica*, & vel ab humoribus vitiosis aut a scabie retropulsa, aut ab ulceribus intempestive clausis a cerebrum delatis atque in certa quadam ejus parte hærentibus ac pungentibus; vel ab officulis aliisve partibus p. n. intra cranium excrecentibus, vel & quandoque ab animi quidam affectibus, ira scilicet vehementi, aut terrore, quibus in cerebro gravis aliqua læsio concitari & ejusmodi mala produci possunt. *Sympathica*, vel cum aliis morbis complicata, quæ & *symptomata* dicitur, ab irritatione quoque, sed alia in parte, quam capite hærente,

rente, provenit; adeoque ad causam illam irritantem
removendam in curatione est cogitandum.

L I L.

Prognosis.

Idiopathica, morbus plerumque est diuturnus, & difficilior plerumque curatur; sympathica quia illius causas speciales in cranio hærentes, tam facile perspicere & eruere, quam hujus, immo sæpe prorsus detegere non possumus. Et si forte etiam quandoque causam sciremus veram, ut v. g. officula aut alia corpora p. n. in cerebro pronata, tamen ea tollere non valemus, quo fit, ut epilepsia sæpe nullis cedat remediis, licet nonnulla pro certissimis *specificis* decantentur, sed *propter insanabilis* sit, immo nullum tale dari existimo nisi ad causam simul respiciatur. Ita quo magis est *veterata*, eo difficilior curationem admittit; quo verius *recentior*, eo major adhuc spes est.

L I I I.

Curatio
idiopa-
thicæ.

In *curatione* igitur *idiopathicæ* & præsertim recentioris, respiciendum ad causam prægressam: quæ si fortè *abundantia sanguinis*, ut in juvenibus, vel *consuetasanguinis hæmorrhagia suppressa*, sanguinis *missio*, immo & *purgatio* sæpe conducit, & postea ille consuetus sanguinis fluxus suis remediis est restituendus, interpositis & subjunctis pulveribus & spiritibus illis cephalicis & nervinis, mox indicandis. Sed si epilepsia *ab ulcere* quodam intempestive clauso, vel *a scabie* præsertim capitis aut faciei, aliisque impuris humoribus retropulsis ortum traxerit, hi a capite rursus sunt revellendi, per cucurbitulas, vesicatoria, fonticulos, purgantia, præsertim ea, quibus mercur. dulc. admixtus, diaphoretica & sudorifera sunt avellendi, & per alia loca evacuandi, eisque epilepsia sæpe curatur. Si *a febre* intermittente *intempestive suppressa*, eadem revellentia & evacuantia ad materiam vitiosam a capite avocandam conveniunt; quibus postea si febris redit, ea, quæ febri rite curandæ supra proposuimus, aliaque roborantia cephalica sunt subjungenda. Si *ab ira* producta est sanguinis detractio, & quæ vehementiorem ejus motum bilisque acrimoniam temperant, ut salia temperata media, nitrum & cinnabaris, pulvis antispasmodicus celebris, specif. cephal. Michael. cum nitro, pulvis epi-

lept. Marchion. vel solus vel cum prædictis mixtus, aque nervina, observata simul animi tranquillitate, inducunt. *Spiritus vitrioli philosophicus*, spiritus nitri vitrioli dulcis, itemque liq. anodyn. Hoffmanni, quoque egregie prosunt. Denique & tam in hac æcie, quam etiam in aliis, ubi humores biliosi alii-
noxii in ventriculo hærent, *Vomitorium* sæpe est ad-
dum salutare. *Sin a terrore* ortum duxit, quo humo-
condensari & ad stasim disponi solent, præter venæ-
tionem, blande dissolventia, ut sunt pulveres anti-
smodici, spir. C. C. liq. C. C. succinat. cum infuso-
eæ aut aliarum herbarum cephalicarum, vel aquis
phoreticis, ut fl. tiliaë, sambuci, acaciar. ceras. nigr.
amomi, hirundinum præsertim cum castoreo præpa-
ta, &c. danda. Quando a *festuca*, *spina*, aliave re
terna pungente oritur, extractio harum primarium
remedium.

L I V.

Si hæc omnia parum sunt, omnis generis *pro speci-*
s habita medicamenta, in quibus nihil noxii depre-
ndimus, (quia semper cavendum, ne, quando pro-
sse non possumus, ægro noceamus) *empirica* etiam
ta, quorum quam plurima laudantur, adhiberi pos-
at: ad quæ referuntur lumbrici terrestres, ungulæ
is, radix pæoniæ, cranium humanum, violenta præ-
tim morte peremptum, cor & cerebrum hirundinum,
talpæ, hepar lupi, ossa in ventriculo vel intestinis
oi reperta. Essentia dulcis Hallensium, *specificum Stab-*
, oleum animale *Dippelii* & alia, quamvis & hæc
alia sæpius frustra adhibita esse sciam. Sunt quæ-
m epilepsiæ, a leviori forte causâ ortæ, verb. grat.
rore vel ira leviori, vel scabie modica productæ,
t quæ a dentitione aut variolis concitantur, quæ sæ-
, ut subito & facile ortæ sunt, ita etiam facile rur-
s cessant, & naturæ vi subiguntur: si jam contra
smodi epilepsiam unum ex similibus specificis dictis
t exhibitum, & epilepsia postea cessat, huic causâ
olata epilepsiæ a nimis credulis & imperitis adscri-
solet, quæ sponte cessavit, vel sola natura sublata
. *Fonticulus futuræ coronali* inustus a quibusdam et-
m huc refertur, de quo Chirurg. nostra videri potest.

*De spe-
cificis.*

Quidam *stercus pavonis* aliaque *stercora* contra hunc morbum etiam commendant; ego vero hæc cum tota pharmacopœja *stercorea* auctoribus suis relinquo.

L V.

Curatio
sympa-
thica.

In *sympathicis* & *symptomaticis* major plerumque a promptior curandi spes est: nam quæ initio *variolarum* oritur, exhibitis remediis temperantibus, cessare solet quæ remedia, non omiſſa *cinnabari*, etiam in *epilepsia febrium aliarum* acutarum curanda optime profunt. Quæ a *vermibus*, medicamentis *mercurialibus*, & quæ ceterum *vermibus* sunt contraria, plerumque superantur. Erat viri cujusdam honorati filia novem annos nata diu *vermibus* & simul *epilepsia* misere conflictata quam, (multis remediis antea a quamplurimis frustra adhibitis) pulveris chin. ʒj. & merc. viv. ʒij. cum conserva & sirupo in electuarium redactis, ac per ſtata tempora, ut in febre exhibitis, ita ut numquam redierit, feliciter proſtigavi. Quando *epilepsia* a *dentitione* provenit, & remedia, quæ ad hanc promovendam alias maxime idonea, frustra adhibita sunt, immo & spir. C. C. doſis gutt. IV. vel V. aliquoties data nihil proficiat, vel *venæ ſectio in brachio* ex *Scdenha* obſervatione, vel *incisio tranſverſa* super dentibus exitum molientibus instituta morbum hunc sæpius tollit.

Si a *lacte* in ventriculo corrupto & acido facto in infantibus lactantibus oritur *epilepsia*, hoc partim purgantibus idoneis est evacuandum, partim terreis absorbentibus est destruendum: quo factum esse existimo ut dum terrea in hoc casu sæpius contingente, egregie proficiunt, postea tam multa ex terreorum familia etiam in aliis speciebus, ab aliis scilicet causis ortis pro specificis declarata sunt, quando forte aliquoties ejusmodi infantes ab *epilepsia* liberarunt; id quod tamen in aliis plerumque non faciunt.

Quoties *epilepsia* a *menſibus ſuppreſſis*, hi sunt reſtituendi, aut ſi cum *hysterica paſſione* complicata hac curata, etiam ejus *epilepsia ſymptomatica* idem antihysterics, vel & haud raro matrimonio tolli ſolet.

L V I.

In *paroxysmo* & speciatim hystericæ epilepsiæ, spiri- *Quid in*
 volatiles cephalici ac nervini & cumprimis spir. *paroxys-*
 C. vel liq. C. C. succin. naribus admoveri, immo *mo.*
 præsertim in infantibus, vertici instillari ac tempo-
 us & pulsibus illini, vel & cum spleniolis imponi
 sunt, donec ad se redeant. Multi manus & polli-
 ægrorum fortiter constrictos vi diducendos esse vo-
 t ac jubent; meo autem iudicio præstat hoc inter-
 tere, eosque ita relinquere, donec paroxysmus præ-
 it, ne natura in hoc actu turbetur: quia alias no-
 accessio citius plerumque & læpe adhuc vehemen-
 , quam antea, redire solet. Superato paroxys-
 , æger quiescat, donec vires sibi satis restitutas
 tuiat.

De ceteris morbis, *convulsivis* dictis, in sequenti ca-
 plura proponuntur.

CAPUT XV.

De Motus læsionibus.

I.

Motus in corpore humano diversimode lædi pos- *Motus*
 sunt: modo enim *aucti* sunt, modo *imminuti*, *læsiquo-*
 lo prorsus aboliti, vel *depravati* aut *inviti*, vitium- *ruptiles.*
 sive causa vel in humoribus sive fluidis, id est,
 sanguine & spiritibus, vel in partibus solidis, sive
 tendis hærebit.

I I.

Causæ motus præter naturam *aucti*, ut convulsionis, *Causæ*
 epiæ, &c. non a prudenti animæ directione prove- *motus*
 at, ut *Stabliani* volunt, dum anima, quod hoc fa- *aucti.*
 , ignorat, immo dum non facit, etiam, quod fa-
 , scire nequit; verum sunt res irritantes quæcum-
 materiales, ut *sanguis* & *humores* *quantitate* vel
itate noxia peccantes, salia peregrina diversa, ver-
 , dentes protumpentes, festucæ ossium pungentes,
 a quibus omnibus, si fibræ aut partes nervæ cor-
 poris

poris humani rudius afficiuntur & irritantur, spiritu quoque vehementius exagitantur, partesque solidæ inde inordinate moventur: qui tamen motus inordinati pro partis & causæ diversitate, valde variant, & inde modo leniores sunt, modo vehementiores. Ita spiritus cum impetu ob quamcumque causam in musculis partes lati, spasmos, convulsiones, epilepsiam, vomitum, diarrhœam, priapismum, sive satyriasmum, &c. inducunt.

I I I.

A quantitate vero sanguinis nimia, vel ab ejus spissitudine oritur sæpe palpitatio cordis, syncope, difficilis respiratio, suffocatio, & præsertim etiam suffocatio uterina, alique ita dicti affectus hysterici. Ab irritatione & cumprimis per acria, pro partium diversitate, ut irritatio fit, sequuntur sternutatio, tussis, singultus, eructus, vomitus, nausea, spasmus, convulsio, epilepsia, fames immodica, sive canina, alique mala.

I V.

Causæ
motus
immi-
nuti.

Causæ motus imminuti vel deficientis sunt & humorum & spirituum vel defectus, vel paucitas, vel rubatio, vel obstructiones nervorum, ut in virium defectu, animi deliquiis, apoplexia, paralyti, universali paralyti; vel læsiones organorum, ut in fracturis, luxationibus, vulneribus & dissectionibus musculorum, tendinum, nervorum. Ita & anorexia a motu ventriculi imminuto, quando cibos vel prorsus non, vel non potest exagitare, comminuere, atterere, digerere, vel expellere potest, ortum sæpe trahit. A turbato sive depravato motu spirituum, vertigo, vomitus, spasmi, convulsiones, epilepsia & deliria proveniunt.

V.

Curatio
genera-
lis.

In CURATIONE horum morborum generatim tendendum ad causas & partem læsam, ne neglecto loco ad symptomata tantum respiciamus: idcirco studendum, ut prius causa rite investigetur ac tollatur, postea simul ad symptomata, præsertim si urgeant, respiciendum. De variis motus læsionibus, præsertim sensus simul læsi, ut apoplexia, epilepsia, animi defectibus, &c. jam capite XIV. egimus; nunc vero de a-

ad-

huc motuum læſionibus, quæ ſuperſunt, & ubi ſen-
plerumque integri perſiſtunt, exponemus. Ut primo

V I.

De Spasmodis & Convulſionibus.

Inter hos primo conſiderabimus *motus ſpaſmodicos*, *Quid*
ſpaſmi, *nervorum diſtentiones*, ſive *convulſiones* et- *ſint &*
n appellantur. *Spaſmi* dici ſolent, quando pars quæ- *ejus ſpe-*
m corporis humani, vi muſculorum præter volunta- *cies.*
n contractorum, vel conſtringitur, vel extenditur &
rumque cum dolore riget, vel & ſingulari eaque
trabili ſæpius ratione intorquetur. Huius ſpecies ſunt
acis vocabulis inſignitæ, *Emproſthotonus*, *Opithoto-*
& *Tetanus*; quibus *ſpaſmus cynicus* ſive *Riſus Sar-*
pius, immo & *Priapiſmus* ſive *Satyriſis*, tamquam
ſmi particulares, addi poſſunt. *Convulſio* vero pro-
e vocatur, quando partes, ut in epilepſia, alterna-
n contra animæ voluntatem eaque prorsus invita,
do contrahuntur, modo extenduntur.

V I I.

In cauſſis *ſpaſmorum* & convulſionum aſſignandis *Stab-* *Cauſſe*
ni rursus ad animam, tamquam ad commune ipſo- *horum.*
n aſylum, confugiunt, eique omnes illos motus,
e horrendos ac periculoſos, ſicuti in epilepſia, tan-
am cauſſæ adſcribunt, quæ magna deliberatione cor-
i ſuo tantas & ſæpe valde ridiculas, nunc vero per-
reſcendas deformitates, in bonum ac ſalutarem ejus
em concitaret. Verum hoc a vero æque alienum in
lepſia mihi eſſe videtur, ſicut id, ubi de hac ſupra
p. XIV. multisque aliis occaſionibus jam innuimus; ſed
ius certos humores vel quantitate vel qualitate pec-
tes, vel etiam ſæpe res ſolidas peregrinas, vel p.
in iis genitas, motus hoſce anomalos & pernicioſos
rumque producere exiſtimamus: qui, *ſi vehementes*,
tum abeſt, ut commoda, ſed potius graviffima ſæ-
mala ac damna, immo & ipſam haud raro mortem
pori inducant.

V I I I.

ſpaſmi aut convulſiones leves, & vel in digitis
ſuris tantum, ut ſæpius fit, incidunt, ſæpe vel *Curatio*
& ſimplicibus friktionibus hærens forte viſcidum aut *ſpaſmi*
levioris.

acré morbosum, quodcumque illud sit, in parte illa rursus promovetur ac propellitur, atque sic simul spasmus curatur. Alias sæpe juvat, si saliva, præsertim hominis jejuni, vel spiritu vini, vel lavendulæ, vel aqua Reginæ Hungariæ aliave simili pars affecta probe fricatur.

I X.

Gravio-
ris.

Quando autem spasmi sunt vehementiores atque haud cedunt, inquirendum, an non nimia sanguinis abundantia in culpa, aut menses, hæmorrhoides, narium hæmorrhagia aliæve consuetæ sanguinis vel naturales vel artificiales evacuationes sint suppressæ, aut neglectæ. His enim perspectis, vel sanguinis detractiones artificiales, convenienti loco & tempore, sunt instituendæ, atque menses vel hæmorrhoides obstructi in ordinem, sicut ut Cap. IX. docuimus, redigendi; ita sæpe his restitutis, omnes spasmi & convulsiones abiguntur.

Sed si his vinci nequeunt, verum vehementiores adhuc & pertinaciores sunt, ad remedia nervina & epileptica valentiora, quæ capite præcedenti §. 53. ad 56. de epilepsiam, secundum causarum diversitatem, curandam commendata sunt, confugiendum, cum epilepsia atque spasmodorum ob causarum similitudinem eadem fere sit curatio. Externe adhibentur sæpe feliciter spiritus nervini, ut formicarum, lumbricorum, C. C. aqua Reginæ Hungariæ, Anhaltina, cum & sine saponamento, si cervici, spinæ dorsi, naribus, partibus affectis fricando sæpius adhibeantur. Si partes nimis rigide sunt, fricationes per emollientia subinde melius profunt; ut unguentum nervinum, dialtheæ, martis, vel pinguedo caponum, leporina, humana, castorei, pedum bubulorum, vel per se, vel oleis penetrantibus naturalibus aut destillatis nervinis, quæ sunt petroleum, oleum destillatum succini, ruta, rosmarini, salviæ, vel similia alia, imprægnata, quibus partes læsæ diligenter fricandæ. Aquarum salutarium usus legitimus; una cum balneis temperatis, conservato simul convenienti victus regimine, vitatisque affectibus animi gravioribus, ira præsertim, mœrore tristitia, in morbis spasmodicis longe quoque valentissimus est; sicut de horum genuino usu mox infra utriusque

is proponemus . Quid in ſpasmis vulnerum ſit facien-
m , e Chirurgia noſtra p. 85. peti poteſt .

X.

De Maxillæ ſpafmo .

In ſpasmis particularibus , ſpecialia quædam adhuc *Spasmi*
ut obſervanda . Ut , ſi ſpasmus eſt in maxilla inferiori *particu-*
ut ægri os aperire adeoque & cibos manducare re- *laris in*
eant , ſicuti ſæpe in vulneratis , ubi peregrina in *maxilla.*
lneribus , aut ubi nervi læſi ſunt , aut ubi acria , ut
riolum , aliave ſimilia ad ſanguinem cohibendum
lneri immiſſa fuerunt , contingit , pro cauſſarum di-
ſſitate diverſo modo ad eas auferendas eſt proceden-
m ; qua vero de re , quia jam in chirurg. noſtris
erat . Cap. LXXVII. præcepimus , ne eadem hic no-
ſint repetenda , L. B. ad hunc locum ablegamus .
od ſi ſponte , ſive a cauſſa interna hic maxillæ ſpaſ-
is in infantibus , ut ſæpe vidi , contingit , ut pluri-
am moriuntur , & vix ullum ſervatum vidi , licet
datiſſima remedia nervina , & antiſpaſmodica inter-
atque externe quam ſolertiſſime adhibita fuerint .

X I.

De Spafmo cynico .

In ſpafmo cynico , qui & Riſus ſardonius dicitur , ſi *Spasmi*
te , ut ſæpe fit , a venenis aſſumptis , præſertim ci- *cynici.*
cæ , aut cœnanthes venenata ſpecie proveniat , hæc
amprimum fieri poteſt , emetico e corpore expellan-
 , & poſtea ad reliquias in ventriculo deſtruendas ,
que ventriculum vi ſua ſumme refrigerante inde læ-
n roborandum , vinum generoſum , ex veterum jam
ſervatione , idque cum primis calidum vel per ſe ,
cum pipere vel Zingibere ſubinde potum , reme-
eſt . Si ab aliis ſpasmorum cauſſis , alia antiſpaſmo-
a & nervina , tam interna quam externa Cap. præ-
l. §. 53. ad 56. laudata , ſunt adhibenda ; & in pri-
is etiam emplaſtrum ex empl. de betonic. & bacc.

lauri cum oleo succini paratum, circa aures & tempora applicatum, egregie etiam hic prodest.

X I I.

De Sternutatione nimia.

Sternutationis.

In *sternutatione nimia*, quæ ab acribus in naribus hærentibus & membranam harum nerveam vellicantibus, oritur, ea lacte calido, naribus sæpius hausto, luenda, temperanda atque demulcenda, donec remittat & denique omnino cesset. Si forte lac deficiat, aqua repida ei substitui, ejusque etiam vapor ad nares cum emolumento admitti potest.

X I I I.

De Tussi convulsiva.

Tussis convulsiva.

In *Tussi convulsiva*, præter infusa & decocta ex speciebus pectoralibus ac nervinis parata, & ad modum Theæ aliquoties in die hausta, liq. C. G. succin. pulveresque ex nervinis & cinnabari compositi, ut spec cephalic. Michael. pulvis epilept. Marchionis, & pulveris antispasmodicus, cum lenibus anodynis, ac præpue massæ pilular. de styrace vel cynoglossa gr. j. v. altero, egregie conducunt, haud neglecta sanguinis missione & alvi expurgatione, si causæ prægressæ aut præsentia ea indicent.

X I V.

De Cordis palpitatione.

Quid sit ejusque differentia.

Hoc malum, quia etiam in motu cordis aucto, tamen invito, & spasmodice quasi vehementius contractio consistit, de eo hoc in loco quoque acturus sum. Motus hic sæpe tam vehemens est, ut e longinquo dici, & ab abstantibus quoque aspectu thoracis fieri videri queat. Quandoque hoc vitium a motu corporis paullo fortiori, præsertim quando homines loca acclimatizantur.

alcentur.

tendunt, & potissimum in *plethoricis* & *hypochondriacis* oritur; quandoque a *terrore*, quo sanguis a partibus ternis subito versus cor repellitur, ita ut hoc, sanguine quasi obrutum, per multiplicatos ictus & concussiones illud nimium sanguinis, quod ei molestum, tumque irritat, rursus a se remove cogatur, quo rursim in ordinem redacto, palpitatio plerumque cessare rursus solet. (a) Quando autem vel motu vel terrore vehementiori, vel causis ob quamcumque rationem sæpius redeuntibus, præsertim in *plethoricis* vel etiam ab aliis occasionibus pars sanguinis in cordis ventriculis vel vasis ejus majoribus, in speciem polypi coit, tum cum cordis ventriculis conglutinatur vel concretur, sicuti quam sæpissime in horum cadaverum sectione inventum est, qui vivi palpitatione cordis diu afflictati fuerunt, palpitatio inde oritur fere continua, quæ vel levior vel vehementior, prout polypus ille minor vel major est, adeoque vel minus vel majus sanguini transeunti obstaculum facit. Quandoque & claudicatio cordis aut huic vicinorum vasorum majorum constrictio, ut v. gr. *aneurisma arteriæ aortæ*, vel ossæ & lapideæ quædam partes, aliæve res p. n. in corde vel vasis vicinis natæ, palpitationis sive motus hujusmodi causæ sunt; quibus vero in casibus morbus hic, præter causas hæc tollere haud valemus, ut plurimum inanimabilis existit. Interea tamen etiam sæpe a sola *femina* sanguinis copia ortum trahit; id quod inde colligi potest, quia in nonnullis sola sanguinis per venarum detractionem morbus hic, ut sæpius observavi, tolli potest.

X V.

Igitur initium curationis, præsertim in *plethoricis*, aut *Curatio* ubi consuetæ sanguinis excretiones, ut menses, i. per hæmorrhagia narium, vel hæmorrhoides suppressæ, aut sanguinis detractiones neglectæ sunt, facienda sunt. *nis missum*.

(a) *Stahliani* hunc morbum etiam animæ directioni ascribunt; verum quia consistit in motu, qui anima invita, ab hac, ut causa efficiente ac dirigente provenire nequit.

dum a venæ sectione; quæ vero, quo in loco vel parte corporis instituenda, ex eis intelligi potest, quod Cap. I. de Plethoræ morbis, itemque Cap. IX. de hæmorrhagiis suppressis restituendis hac de re proposuimus quæ etiam, si malum forte redeat, præservandi cave vere & autumno, immo & haud raro sæpius in anni repetenda; & ubi fluxus mensium vel hæmorrhoidum obstructus, hi idoneis suis remediis, ex eodem capite petendis, sunt restituendi.

X V I.

2. Per Præter hanc remedia temperantia salina nitrosa & c. alia re- nabarina, ac speciatim pulveres temperantes atque media. tispasmodici, dum motum nimium cordis temperant atque sanguinem crassum ac spissum incidunt fluidum remque reddunt, egregie hic proficiunt, præsertim quando hi ægri etiam calore p. n. urgentur: atque hanc ob rationem Wedelius quoque pulverem suum sorbentem sæpius in hoc malo exhibitum, multis locis & præsertim in Opiologia magnopere prædicat. Infusa aquea herbarum theæ, melissæ, veronicæ, flor. p. mulæ veris, vel pomorum citri, dum humores spiritibus & iusto fervidiores diluunt ac temperant, multum quoque hic profunt, præsertim si essentia scordii, cardui benedicti, cort. citri vel aurant., cum pauxilla spiritus nitri dulcis, vel & liq. terræ foliatæ tartari apta copia, mane & circa vesperam eundem in fine simul assumantur. Pediluvia denique temperata, motus corporis moderatus, sed frequens, vectio, equitatio, Etus modicus, potus tenuis & sufficiens, cura feri lactis immo & aquæ medicatæ, præsertim martiales, curatio & præservandi scopo, cum primis hypochondriaciis quam utilissima sunt.

Atque hæc ipsa etiam in polypo recenti vel dissolvendo & curando, aut metuendo avertendo, si quid in Medicina valet, primaria esse remedia existimo.

X V I I.

De Singultu.

Singultus causæ.

Singultus est affectus spasmodicus ventriculi, & mul. septi transversi, a re quadam irritante in eo habente ren-

nte tunicamque ejus nervoſam vellicante, ortus, qui
ro quandoque *levem tantum in victu errorem* pro
ſſa agnoſcit, adeoque vel ſponte ſua brevi ſæpiſſime
ſinit, vel aſſumpto potus hauſtu, ad materiam acrem
imperandam & diluendam, ceſſat. *Interdum vero eſt*
ge gravior, & cauſſam habet vel graviorem quan-
in *ventriculi læſionem*, vel *venenuræ aſſumptum*, vel
lnus aut inflammationem ventriculi, inteſtinorum, ve-
æ, ſepti tranſverſi aut alius cujuſdam viſceris in ab-
mine; immo ex inflammationibus etiam externis &
de nata gangrænâ ac *ſphacelo pedis ſingultum* quoque
quoties *vidi graviffimum*, qui plerumque tunc mor-
m instantem, vel ſaltem appropinquantem indicare,
in & in *febris acutis*, & præſertim malignis, fre-
ens *ſingultus*, ſed ſæpeſſime *funèſtus eſſe ſolet*.

X V I I I.

Pro cauſſarum igitur diverſitate vario etiam modo
ſtituenda eſt *curatio*: ut ſi *ſenes*, vel alii debiliores
ſt paſſum largiorem, præſertim *quando durioribus*
flatulentis cibis uſi ſunt, vel cibos avidius degluti-
runt, ſingultu corripuntur, *haufculus vini generoſi*,
ſpiritus vini, vel *aquæ ſpirituofæ*, anifi fœniculi,
anthæ, vel cort. aurant. aliarumve ſtomachicarum,
m ut plurimum ſanat. Ita & *pulvis ſtomachicus Bir-*
& Tragea aromatica Auguſtan. aliive ejusmodi pul-
res ſtomachales, admixto cortice peruviano, cum
o generoſo ſumpti, egregie hic profunt. Eadem
media, ſi *ſingultus a refrigeratione* quacumque corpo-
, vel potu aut cibo nimis frigido, inceſſu per pavi-
nta lapidea nudis pedibus, ortum ducit, benefa-
nt; ubi ſimul *olea ſtomachica deſtillata* ventriculo il-
i, & *ſacculus ex ſtomachicis herbis*, vel *emplaſtrum*
cataplaſma ſtomachicum ei ſuperimponi apte poſ-
at.

*Curatio
ſi a diæ-
tæ erro-
ribus.*

X I X.

Quando ab aliis cauſſis & ſpeciatiim *ab acidis humo-*
us in ventriculo hoſpitantibus provenit, medicamen-
acidum *abſorbentia*, terrea, itemque oleum tartari
r deliquium dare convenit. *Si febrî acuta*, vel in-
mmationi ventriculi aut alterius cujuſdam viſceris ſu-
rvenit, malum eſt periculofiſſimum. Interea tamen
pul-

*Si ab
aliis
cauſſis.*

pulveres nitrosi, camphorati, itemque spiritus nitri ducis, cum essentia quadam alexipharmaca sæpe dati quandoque juvant; ubi tamen etiam diascordii ʒj. a ʒij. circa vesperam cum fructu exhibetur. Si a gangrena & sphacelo provenit, plerumque, ut §. 17. jam dictum, insanabilis est; interea tamen præter ea, quæ a sphacelo speciatim contraria sunt, ut cum primis e cort. peruvianus, & quæ modo contra inflammationes internas commendavimus, primaria remedia mihi evidenter videntur. Idem & judicandum & faciendum est, si singultus vulneribus partium internarum, vel & calculi aut herniæ sectioni incidat; licet plerumque mors brevi sequatur. Quando a venenis assumptis oritur, acrimonia veneni aqueis multis & lacte est eluenda; temperanda, oleosis demulcenda, & ceteroquin in procedendum, sicuti capite de venenis infra docuimus.

X X.

De Priapismo.

Priapismi.

In priapismo sive satyriasi, (qui etiam in fortiori spasmodica musculorum erectorum penis contractione ab acri, præsertim venereo, ut plurimum inducta provenire solet, idque ut plurimum in juvenibus robustis vegetis, sanguineis) conveniunt contra hoc malum largæ sanguinis missiones, & præsertim etiam ex ipsa venâ penis, purgationes fortiores ex non calefacientibus nec re sinosis paratæ; pulveres temperantes nitrosi, cum camphora & tantillo sacchari saturni, sæpius ex aqua simplicis vel lactucæ aut menthæ dati. Potus sit aqueus acidulus, refrigerans, servata simul diæta tenui, refrigerante, vitandoque omnia calefacientia, stimulantia & bene nutrientia.

Si infectio venerea concurrat, specificis huic malo oppositis, cum primis mercurialibus, hæc expugnanda.

X X I.

De Tremore.

Tremor eſt motus tremulus ſive depravatus & invi-
s, manuum potiffimum & capitis; interdum etiam
dum, immo & quandoque linguæ atque ipſius cor-
. Malum eſt, quod ſenibus frequentius accidit, quam
eris & juvenibus; atque in illis potiffimum a defe-
a ſpirituum provenire videtur. Interdum tamen & in
obſervatur, cum primis ex terrore, atque hinc nato
equali aut non ſufficienti in mufculos ſpirituum influ-
, & interdum etiam ex plethora. Potus etiam nimius
ſſeæ ad tremorem inducendum in multis perquam
oneus obſervatur; in quibuſdam a potu nimio & tre-
enti crapula, in aliis a nimia venere, in nonnullis
his ſimul ortus eſt; a quacumque vero harum cauſ-
um proveniat, curata ſæpe perquam difficilis, immo
iam inveteratus, ut plurimum impoſſibilis eſt.

Quid &
unde.

X X I I.

Interea, tamen qui a tremore liberari, vel ſaltem
rius inde affligi deſiderant, largiorem potum Coffeæ,
pulam & venerem nimiam vitare debent. E contra-
ad nervos debilitatos roborandos utantur quotidie
ba meliffæ aut ſalviæ, loco infuſi theæ, vel & eæ-
m cum china in cereviſia aut vino infundantur, &
paſtu, vel circa illum bibantur. Cum infuſo illo
liſſæ aut ſalviæ aſſumere etiam poſſunt eſſentiam roſ-
rini, & cort. peruviani, vel liquorem C. C. ſucci-
tum, bis vel ter in die, & veſperi pulvis quoque
tiſpaſmodicus uſurpandus, præſertim ab iis, qui cæ-
tem p. n. ſentiunt, aut vino multo uſi ſunt.

Curatio.

Externe cervix & ſpina dorſi ſequenti vel ſimili lini-
ento roborante fricandæ.

℞. ſpir. formicar.

lumbricor. ā ʒij.

ſalis ammon.

Cornu Cervi ā ʒʒ.

vel ℞. Aqu. Anhaltin. ʒvj.

ſapon. venet. ʒj. M.

pro eodem ſcopo.

In

In plethoricis sæpe Venæ sectio prodest, in senibus haustus vini vel simplicis generosi vel roborantibus illis exaltati in pastu; & in mulieribus ad mensium negotium est respiciendum. Pediluvia frequentia, itemque thermæ & aquæ aliæ medicatæ rite usurpatæ, cum sobria victus ratione contra hoc malum etiam valde sunt proficua.

X X I I I.

De Motibus imminutis aut abolitis generatim.

Motus
imminu-
ti vel ab-
oliti.

Motus imminuuntur vel omnino abolentur sæpe vel in toto fere corpore, vel in certis tantum ejus partibus. In toto corpore eos aboleri in apoplexia & animi deliquiis, jam præcedenti capite diximus, & quæ remedia tunc profint, proposuimus; igitur jam de quibusdam aliis adhuc morbis tractabimus, ubi motus corporis imminuti vel depravati sunt, & speciatim de languore, marasmo ac vertigine senili, paralyti linguæ aphonia, sive loquendi difficultate & impotentia virili.

X X I V.

De Languore & Marasmo itemque
Vertigine senili.

Lan-
guor, ma-
rasmus
& ver-
tigo se-
nilis.

Cum hic languor & motus impedimentum a spirituum ac virium decremento ortum ducant, hi omnimodo sunt augendi atque excitandi, analepticiis, stimulantibus, cardiacis, cephalicis, nervinis, & quidem interne, vino mero generoso in pastu, hoc enim propter ea lac senum appellari solet; eoque vel simplici, vel gratis aromatibus imprægnato; vel aquis spirituosissimis, aqua cinamomi vinosa, cort. aurant. vel citri; vel aqua melissæ, florum cheiri, vel lilior. convall. vinosa; aut naphæ, cum vel sine confectioe alkermes, eaque in viris, qui ambram ferre possunt, completa; item succolada, emulsionibus cum aquis cardiacis paratis, gelatinis analepticiis, ovis forbilibus, vel vitellis ovorum in jusculis aut cerevisia calida solutis; præterea speciebus,

, pulveribus & trageis, ut tragea aromat. August. ciebus diacinamomi, diagalangæ, diambrae & diaschi, immo & ipsa china chinæ; præterea essentiis maticis, cinamomi, caryophyll. cardamomi, cube. cort. aurant. ligni aloes, ambræ, balsamo vitæ smanni, elæosacch. cinamomi ambrato, vel pulvere halico Zellenfi, cum margaritis & ambra roborato. Externe naribus, cordi & pulsibus adhiberi apte sæs possunt aquæ spirituosæ, ut aqua Regin. Hung. haltina, vel apoplectica, aut spiritus lavendulæ, spir. salis ammon. vinosus, uno alterove oleo deato suavi cephalico, pro lubitu imprægnatus, vel sal volatile oleosum Sylvii aliudve simile. Nonnubalsama cephalica quoque roborare solent, ut apoticus vel cephalicus usitatus, bals. cinamomi, caryophyll. ligni rhodii, lavendulæ, succini, majoranæve similia. Atque hæc omnia etiam in vertigine, a defectu spirituum dependente, benefaciunt, non in sanguinea, vitando simul curas, meditatione ac studia severiora, animusque ad tranquillitatem dispositus.

X X V.

De Linguae paralyfi, Loquelæ læsione & Aphonia.

quia hæc mala plerumque ab apoplexia oriuntur, præ- Curatio.
a jam ut plurimum sunt ea, quæ in illa utilia aut
ssaria esse solent, & inprimis excitantia volatilia
na & externa, itemque sanguinis detractiones. Quod
ero hæc nondum instituta, aut hæc vitia sine præ-
a apoplexia orta sint, venæ sectio, præsertim in
horicis, in brachio, pede, vel & in ipsa vena ju-
ri, aut raninis recte instituitur. Deinde vero ad-
tus ad linguam alliciendos atque advocandos pro-
masticatio omnis generis acrium aut aromaticorum,
ardamomi, cubebæ, amomi, piperis, rad. py-
ri, nicotianæ, vel feminis staphidis agriæ; vel
saccharum cinamomi, caryophyllorum aut carda-
ni, vel pulvis aureus Zellenfis, aliave istiusmodi
ulantia linguae applicata, ore diu detenta, atque
tan-

tandem deglutita . Cort. peruv. & succus nasturt. quat. etiam hic profunt . Pro potu ad modum heretheæ egregie quoque confert *infusum herbæ salviæ & rosmarini* , bis terve in die cum liq. C. C. succini sufficienti copia sumptum. *Aqua salviæ cum vino stillata* in faucibus sæpe detenta, & loco gargarismatis simul usurpata, valde etiam linguam debilem borat. *Acetum scilliticum* , si ut gargarisma hic adhibetur, & externe etiam sub mento radix linguæ aliquoties in die probe fricatur, valens quoque contra hoc malum est remedium : ubi tamen etiam *spiritus vini* in paralyfi commendati adhiberi cum fructu possunt.

X X V I.

De Impotentia virili.

Impo-
tentia
& ejus
caussa.

Impotentia virilis est vel perfecta vel imperfecta : que denotat generandi potentiam vel magis vel minus læsam, consistens præcipue & ut plurimum in *defectu penis erigendi facultate*, sive *flacciditate* aut *paralyfi musculorum penis erectorum*, quæ plerumque initium & cum primis præmaturum veneris abusus causa agnoscit, quo spiritus ac vires juventutis nec consumuntur, atque muscoli prædicti sic nimis debentur. Interea tamen etiam ab aliis causis impotentia induci potest; ut si cui vel ab *ictu* aut *conquassatione* externa *testiculi destruuntur*, vel ab inflammatione, præsertim venerea, in *schirrum* corrumpuntur, vel *abscedunt* aut tabe dissolvuntur, vel in *celotomia* exciduntur, vel *ictu scopleti* per glandes plumbeas aliove vulnere *testiculi* aut penis omnino auferuntur, vel etiam si *mentulam* non in *glande apertam* habent; quo fit ut cum debito vigore ad uterum & ovula mulieris projici nequeat. Denique qui nimis *phlegmaticum* & *frigidum* habent sanguinem, vel *tristitiæ* & *mærorum* vel *studiis*, curis atque sollicitudinibus nimis indulgent, vi generandi sæpe vel omnino, vel saltem magna parte privantur, præsertim si jam per se debilis & frigida sint intemperiei, unde & hi impotentes jam veteribus *frigidi* appellati sunt.

X X V I I.

In curatione, ubi partes ad generationem necessariae perditæ sunt, quia hæ restitui nequeunt, nulla quodammodo est curatio; interea tamen, qui uno adhuc sacculo instructi sunt, atque erectio & genitura non deficit, ceterumque sani ac vegeti sunt, sæpe admittunt, ut aliquot novi exempla, æque fecundi ac prolixi existunt, quam qui vel maxime duobus instruuntur. Ita e contrario illi, quibus testiculi abscessu vel morbis indissolubilibus corrupti sunt, ut plurimum quodammodo sunt insanabiles.

X X V I I I.

Quibus vero erectio deficit, & malum nondum interitum est, idque vel morore diuturno vel studiis, & sollicitudinibus nimis, victu nimis refrigerant, vel & hujusmodi medicamentis, aut veneris exmittunt, vel aliis in victus regimine erroribus, immo & morbis longis, quibus vires nimis detritæ sunt, ductum est, requiritur primo, ut illæ causæ, morales scilicet, tristitia, studia & curæ nimis vitentur, ubi quibus inducta est, tollantur, atque ab erroribus illis absterneatur, alias omnia medicamenta sunt inane.

X X I X.

Deinde in nimis emaciatis, & iis, qui vires per nimia studia, mororem, nimiam venerem aliasve causas in emaciatis, auferunt, conducunt bona nutrientia, ut omnis generis, muscula roborantia præsertim cum vitello ovi, ovalia, gelatinæ, frequens usus lactis, cum pauxillo alicuius cinamomi, vel ipso cinamomo imprægnati, ipsa ac diæta lactea, potus succuladæ bonæ & leniter aromaticæ, ut & nutriat, & simul musculos languidos adeo stimulet vimque erectionis restituat, ex quodammodo etiam hic laudantur radices orchidis sive irii, & electuaria inde cum aliis roborantibus composita, ac præsertim zingibere, rad. pimpinellæ, nucis chata conditis aliisque similibus cum conf. alkerm. completa; vel & electuarium diasatirii, quod jam dudum hunc in finem a veteribus commendatum fuit, adhuc idoneis remediis pro lubitu roborandum. Vel etiam medicatæ cum lacte haustæ. Ubi etiam in pa-

stu & aliis horis medicis haustus vini generosi vel simplicis vel gratis aromatibus ac roborantibus exaltatis inter quæ & cortex *casçarillæ* atque *peruvianus* meri pertinent, egregie conducit.

X X X.

In cachecticis.

Qui vero non emaciati sunt, sed contra pingues, & *cheectici* aut frigidi temperamenti, & potissimum si in *mia laxitas in toto corpore* ac speciatim in musculis est, *storibus* peccat, *stimulusque ad erectionem deficit*, *stimulantia* spirituosa, acria & aromatica ad spiritus vires suscitandas maxime conveniunt, quæ specifico nomine *aphrodisiaca* vulgo appellari solent; ad quæ præ ceteris pertinet vinum generosum, piper, sinapi, moschata condita, zingibes & rad. pimpinellæ albæ condita. Borax & stincus marinus, sub varia forma assumpta; in primis vero *sinapi* vel *piperis* crasso modo cocti ℥ss. aut ʒj. cum haustu vini generosi, hora aut decubitus tempus sumpta, egregie stimulant. Prosuper his præterea *essentia aphrosidiaca Vvedelii*, vel *essentia aromatica bona*, *essentia ambræ*, immo & *essentia cantharidum* exaltata; vel *spiritus* ita dictus *magnanimus*, vel solus, vel cum modo laudatis essentiis mixtus, quin & cautus usus ipsius *pulveris cantharidum* in frigidis, ubi erectio vel nulla, vel valde languida, in peruribus vel electuariis roborantibus, ad gr. ij. iij. & tandem plura, non est omnino rejiciendus. Vinum generosum martiale cum aromaticis corticeque peruviano compositum & bis vel ter in die ad aliquot uncias haustum magnæ quoque hic est virtutis.

X X X I.

Externa & dietæ.

Externe musculi penis, scrotum & perinæum *spini formicarum*, lumbricorum, lavendulæ, rosmarini, ac anhaltina, sale volatili oleoso Sylvii roboratis; vel *unguentis* nervinis oleis destillatis nervinis imprægnatis aliquoties in die probe sunt fricandi. Immo & *balneum* atque *infusus* ex herbis aromaticis parata; vel & *thermæ* aut aquæ medicatæ martiales hoc modo usurate multum hic prosunt. Dieta in macilentis aut hec sit nutriens, facile digerenda, lactea, ubi & ostræum & limacum frequens esus valde commendatur. In frigidis cachecticis & obesis vero sit magis aromatica

sal.

alsa, quibus & ostreae cum pipere aliisve gratis aromatibus saepe comestae optime conveniunt. *Motus* frequentis corporis & praesertim *vestitio* & *equitatio* his agris quoque egregie conducit.

X X X I I.

De Articulorum rigore.

Quoties junctura ossium alias mobilis *riget* sive motum amisit, quod vitium Graeci *Anchylosin* vocant, *Rigoris* motus hic, si fieri adhuc potest, est restituendus. *causae.* Oritur vero hoc vitium saepe a *fractis*, *contusis* vel *vulneris ossibus*, praesertim circa extrema, ubi ad ea rursus glutinanda quiete diuturna articulorum opus est, quod qua vel a liquore articulorum naturali sensim spissescente ac tandem inspissato, motus articuli imminuitur, vel prorsus aboletur; vel a succo osseo, ex ossibus fractis in juncturam se insinuante extrema ossium hanc conservent.

X X X I I I.

Si *motus difficultas* solum ex longiori quiete & humore articulorum, ob motus defectum sensim aliquatenus concreto oritur, *emollientibus* ac *resolventibus fomentis*, *guentis*, oleis & axungiiis animalium calidis junctura mollior ac dura frequenter est fricanda, & a medico vel ministro flectendo hinc inde probe commovenda, donec motus sensim sensimque restituatur. Quod si haec remedia sunt, *balnea* quoque, tam artificialia ex emollientibus & digerentibus, quam naturalia, sive *theriacalia*, inter quae *Vvisbadenses*, *Aquisgranenses* & *Caroli-* *Cura-* *tio.* *fere* eminent, satis diu sunt adhibenda, ita saepe spissatus in articulo humor rursus dissolvitur & mobilitas ejus naturalis, si non in totum ac perfecte, tamen magna ex parte restituitur. Sed si ex ossium diffinitionum succo, in articulum sensim effuso ibidemque cum concreto ossium extrema conferbuerint, vel nimis vehemens, aut malum, a quacumque etiam causa ortum, jam valde sit inveteratum, vel & ex potestate *nodosa* productum, ut plurimum insanabile est, saltem perquam difficulter & nonnisi iisdem modo

commendatis remediis curatur, aut solum aliqua tantum ratione emendatur.

X X X I V.

Motus Si denique *motus læsio a vulneribus, fracturis, luxa-*
læsus a *tionibus, tumoribus, inflammationibus*, aliisve similibus
vulne- morbis ortum traxit, hæc mala omnia ut in chirur-
re, fra- gia nostra docuimus, rite sunt curanda; ita his, tan-
ctura. quam causis motus læsi restitutis, motus etiam ple-
 rumque redit.

C A P U T X V I.

De ventriculi & intestinorum morbis.

I.

DE variis quidem ventriculi & intestinorum morbi-
 jam hinc inde in antecedentibus egimus, ut de
ventriculi inflammatione p. 120. de vomitu simplici cap.
 XIII. §. XI. & cruento p. 134. de singultu cap. XV. §.
 17. &c. verum cum quidam adhuc haud levioris mo-
 menti, de quibus hætenus nondum egimus, supersint
 atque ab actione integra vel læsa ventriculi magna par-
 & sanitatis & morborum dependeat, operæ pretium e-
 rit, ut de præcipuis reliquis hoc in capite etiam adhu-
 agamus, & quidem primo.

I I.

De Anorexia sive cibi desiderio ablato.

Anore-
xia

quid?
 & *dis-*
feren-
tia.

Anorexia est ille morbus, quando homines cibos no-
 appetunt, vel nullo ejus desiderio afficiuntur; hinc
 latinis *cibi desiderium imminutum* aut *ablatum* vel ap-
 petentia *cibi læsa*, vulgo *appetitus prostratus*, *imminutus*
 vel *destructus* appellari solet.

Anore-
xie es-
sentia-
lis.

Est vero ea morbus vel *per se existens* sive *essentia-*
lis, a ventriculi actione læsa aut ablata proveniens
 & sine aliis morbis ortus; vel cum aliis morbis, ii-
 que quamplurimis, ut symptoma, combinatus. *Quana-*
 ano-

Anorexia per se morbus est, ut plurimum a prava dieta, imia voracitate, & inde natis crudis atque indigestis humoribus in ventriculo hærentibus, coctionemque ciborum impredientibus provenit; qui se sæpe vel pondus ac pressionis sensu in ventriculo produnt, vel flatibus multis, vel ructibus copiosis, nidorosis, aut amaris, vel pituitosis & acidis, vel nausea & conatu vomendi vel variis horum malis simul, immo vomitu sæpe ipso spontaneo se manifestant. Ita etiam in senibus, qui languorem in toto fere corpore persentiscunt, cibi appetentia, vel ob spirituum defectum, vel ob humores effæctos, vel ob vim contractilem & motum ventriculi nimis debilitatum, aut prorsus destructum, sæpe ita defecit, ut nihil quicquam appetant; unde sensim sensimque vires ita minuuntur, ut fere sine alio morbo creant, præsertim si vigilie involuntariæ accedunt, id quod mori sine morbo appellari potest.

I I I.

Longe vero sæpius, ut symptoma, in quamplurimis *Anorexia* morbis incidit, & nominatim in febribus acutis, inflammationibus gravioribus, *asthmate, hydropse, hypochondriacis, & melancholicis morbis, arthritide, podagra, vomitica, dysenteria,* aliisque quamplurimis; ubi vel humores ita corrupti, vel spiritus ita suppressi, sicut in manibus, ut ad cibi desiderium excitandum vel ad ciborum concoctionem perficiendam prorsus inepti sint; natura forte alibi in morbo aliquo gravi superant & expellendo ita occupata est, ut omnes suas vires illuc dirigat, easque interea ventriculo, donec homo superavit, subtrahat. *Hæc anorexia symptomatice ut plurimum non curatur, nisi morbo primario prius acto ac superato; attamen hoc victo, cibi desiderium sponte plerumque redire solet. Igitur de anorexia pathetica sive essentiali curanda præcipue hic actusum.*

I V.

Quando igitur ventriculus cruditatibus repletur, atque materia turgescit, sive conatus vomendi adest, non *Curatio* I. per unicum medicamentum vomitorium hic morbus tolli *eva-*; vel solum aliquod remedium stomachicum ad maci- *cuan-* penitus profligandum illi subjungendum. Si vero *tia.*

eiusmodi conatus abest, primo ad humores illos crudos incidendos & digerendos *salia amara*, ut vel *salia plantarum amararum*, tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, sal digestivum Sylvii, aut similia in forma pulveris per unum alterumve diem aliquoties in die a ℥j. ad 3℥. exhibenda; vel sub forma fluida, liq. terræ foliatæ tartari, ad guttas LX. & plures; hisque post eaidoneum purgans vel ex pilulis amaris, vel ex sale amaro anglicano aut bohemico aliove simili superaddendum.

V.

2. Per
roboran-
tia.

Ventriculo atque intestinis expurgatis, *essentia vel elixiria amara & aromatica stomachica*, ad tonum ventriculi roborandum ejusque vim contractilem restituendam, aliquoties in die ad guttas 50. 60. & plures ægro exhiberi, hisque pulveres stomachici, ut tragea aromatica, August. pulv. stomach. Birckmanni, spec. pro morsulis Imperat. vel species diagalangæ, diacinamomi, vel de tribus piperibus ad ℥j. pro dosi, vel per se, vel cum vehiculo vinoso interponi debent. *Calamus aromaticus* conditus, itemque *Zingiber* conditum, *essentia piperis*, itemque *essentia piperis hispanici* sive capfici, vel & *elixirium vitrioli Mynsichi*, aliave similia, præsertim ubi alcali vel biliosum peccat, ad cibi desiderium excitandum, ut & *infusa radicum & herbarum amararum & aromaticarum cum vino*, sub specie vini absinthitis parata, egregie quoque hic valent præsertim si justus vini generosi usus in pastu accedat, vel & post pastum haustulus cujusdam *aquæ spirituosæ stomachicæ*, quæ vulgo *aquæ vitæ* vocari solent, subjungatur.

V I.

3. Ubi
acidum
peccat.

Ubi cruditates acidæ in ventriculo peccant, medicamenta acidum absorbentia, ut conchæ præparatæ, lapides cancrorum, mater perlarum aut corallia præparata per aliquot dies sunt exhibenda, & postea idoneo purgante, vel ex pilulis aloeticis aut amaris aliis, vel ex rhabarbaro, vel ex sale amaro cathartico e corpore eliminantur. Utrique scopo & acidum absorbendi & evacuandi, *magnesia* etiam valde apta est, si per aliquot dies mane justa copia usurpatur. Cruditatibus

eva-

vacuatis, ad tonum relaxatum instaurandum remedia
 nara & aromatica, præcedenti numero V. commen-
 ta, prodesse apte possunt, verum remedia quoque
 artiaia & cumprimis tinctura vitrioli martis Ludovi-
 , vel tinctura martis cydoniata, aliquoties in die usur-
 ta, vel & croci martis cumprimis aperitivus Stahlii,
 et limatura martis subtilissime trita, cum elæosaccha-
 cinamoni. data egregie etiam hic benefaciunt. Usus
 gitimus aquarum medicatarum martialium utrique sco-
 & evacuandi & roborandi sæpe quam optime etiam
 tisfacit, præsertim si motus frequens corporis accedat:
 nibus plerumque ciborum desiderium quam valentissi-
 e excitari videmus, non neglecto haustu vini generosi
 pastu, vel aque vite cujusdam ante vel post pa-
 am. Vitandus hic est fumus tabaci præsertim copio-
 s, usus spiritus vini nimis frequens & copiosus, præ-
 rtim matutinus, diæta itidem inordinata, alimenta
 ra ac difficulter digerenda, pingua, flatulenta, stu-
 a & lucubrationes nimiae quoque vitanda.

V I I.

De Nausea.

Nausea est ille morbus, quo ægris non solum nul-
 m est desiderium cibi, sed potius fastidium ejus:
 are idem fere est morbus ac præcedens, atque ex
 idem etiam causis oriri videtur, attamen gradu il-
 m superat. Est quoque morbus vel per se, vel sym-
 oma multorum aliorum morborum, atque in curatio-
 quoque parum a præcedenti differt.

Nausea
 quid?

V I I I.

Quando per se morbum constituit, studendum, ut
 tiosi humores e ventriculo ejiciantur; id quod, præ-
 rtim si conatus vomendi simul adest, vomitu excita-
 , si nihil vetat, optime ac brevissima via fieri so-
 t. Sed si quid vomitum impedit, similia purgantia
 lhibenda, qualia §. IV. & VI. commendata sunt.
 is eadem subjungenda stomachum roborantia, cum vi-
 o generoso, quæ §. V. & VI. proposuimus. Externe
 entriculo applicata, & inprimis balsama stomachica ex
 eo Nucis moschatæ & oleis destillatis parata; vel

Curatio
 essentia-
 lis.

emplastra, ut de *crusta panis*, de *tacamahaca*, vel *stomach*. Galeni sæpe etiam aliquid boni hic præstant.

I X.

Symptomata. Si in *featribus acutis*, præsertim *malignis*, *epidemicis*, *petechialibus* vel *petechizantibus*, *nausea* eaque cumprimis cum vomendi conatu adest, saluberrimo consilio atque optimo cum successu *vomitoria* & cumprimis ex radice *hypercacoannæ* exhiberi, supra jam Cap. V. de *Febribus stomachicis acutis* prolixè ostendimus. Ita etiam in principio multorum aliorum morborum & speciatim ab *ira prægressa* ortorum, ubi *nausea* cum conatu vomendi adest, itemque in *dysenteria*, præsertim *epidemica* & *castrensi*, *vomitoria* & *utilia ac necessaria esse*, multis in locis hætenus asseveravimus, subjuncti postea illis remediis, quæ natura illorum morborum eorumque symptomata, resque circumstantes aliæ indicabunt, servata simul diæta tenui.

X.

De Bulimo sive Fame canina.

Bulimus *quid?* *Bulimus* est morbus mox præcedentibus contrarius quo ægri fame fere insatiabili & perpetua vorandi cupiditate afficiuntur, atque nisi cibis potiri possint, sæpe animi deliquiis corripuntur. Vocatur etiam *orexia* sive *fames canina*, *lupina* vel *bubula*.

Ejus causa. Oriri solet vel a vi contractili musculosæ tunicæ ventriculi nimis elastica sive aucta, qua cibi justo celerius expelluntur, atque sic tunicæ nervæ parietum ventriculi fortius inter se atteruntur, unde sensus famis excitatur; vel oritur ab humoribus nimis acerbis in ventriculo hærentibus, quibus eadem tunica justo vehementius stimulat, atque perpetuæ fere famis sensui inducitur. In quibusdam ejusmodi ægrorum os dextrum ventriculi post mortem nimis amplum repertum est quo factum, ut cibi justo celerius expulsi, vel & sponte quasi elapsi sint.

Curatio

X I.

Si hic morbus a fibris ventriculi nimium elasticis sive motu ejus contractili nimis aucto oritur, illæ relaxantur.

ac debilitandæ: id quod fieri potest usu pinguium oleosorum copioso, ut carniū pinguium, lardi, pin-
 edinis porcina, oleosorum, pane calido, butyro,
 guedine porcina vel oleo largiter imprægnato & sæ-
 s comesto; præterea usu lactis & lacticiniorum, præ-
 tim pultium ex farina & lacte, & oryza, milio,
 deo, fagopyro, fabis, pis, lentibus, amygdalis a-
 que similibus farinosis & oleosis cum jusculis pin-
 bus vel lacte paratis. Ita & succoladæ cum lacte
 sectæ potus frequens, additis farinosis & saccharatis,
 pane triticeo cum saccharo cocto, hic multum valet.
 His denique, si parum sint, opiata addenda & spe-
 tim theriacæ ℥j. vel altera singulo vesperi assumpta,
 egie etiam huic malo mederi solent.

X I I.

Quando ab humoribus acribus oritur, præter pingua, Si ab
 osa & opiata, speciatim hic prodest largus usus ab humo-
 entium, terreorum, & sigillatim, si acidum peccat, ribus
 egium remedium hic est oleum tartari per deliquium, acri-
 uttis XXX. ad LX. aliquoties in die vehiculo aqueo bus.
 jusculo assumptum, tinctura tartari aliave similia
 lica, & præsertim etiam limatura martis larga satis
 ta sæpius assumpta. In nonnullis spiritus vini potus,
 a primis matutinus, famem nimiam egregie tem-
 at, ita ut sæpe jam multis anorexiam induxerit.
 us tabaci frequens ad famem imminueudam mul-
 quoque facit. Ubi vero os dextrum ventriculi ni-
 amplum, ut cibos retinere nequeat, malum ut plu-
 um est insanabile.

X I I I.

De Siti nimia.

ami nimix mox subjungemus sitim nimiam, quæ Sitis
 ndoque etiam per se morbum constituit, nunc & ple- nimia
 que est comes aliorum morborum. Quando est mor- causæ.
 per se, vel ab acribus alcalicis, vel falsis aut bi-
 cruditatibus in primis viis, aut ab iisdem in sa-
 & sanguine existentibus, oritur, qui status in-
 eries biliosa sive calida appellari solet, atque ægri
 calo-

calorem & siccitatem p. n. sentire solent; vel & humoribus nimis spissis iisque forte simul salis, ut ore & œsophago pro his humectandis satis secerni nequeant, provenit.

X I V.

Curatio.

Sive autem ab humoribus alcalicis & salis tenuibus sive simul viscidis sitis nimia oriatur, conducit primus potus sufficiens aqueus, nitro præsertim, vel succo citri vel tinctura florum bellidis, aliisque similis, aut spiritus tu quodam acido imprægnatus & sufficienti copia sacchari gratior redditus, ex quibus variæ potus species facile parari possunt. Ita & ex aquæ f. ij. aceti virg. vel destillati ℥j. vel ij. cum saccharo ad gratiam apto aptus potus fieri potest, itemque si loco aceti cremor tartari vel nitrum sumitur, & pro sitis ratione satis bibitur. Aliquando virginem nobilem usu feriæ sitis copiosi, mane & vesperi, cum cremore tartari, hæc acetosæ & acetosellæ parati, a molestissima sitis ardore & siccitate faucium inveterata liberavi. Si febribus acutis, aut inflammatoriis, vel tertianis vehementis sitis ægrum affligat, potus modo laudati aciduli & nitrosi larga satis copia sæpiusque hausti, itemque gelatinæ & julepi aciduli optime prosunt; qui fere tiam in aliis morbis quibuscunque huic scopo optimè conveniunt.

X V.

De Apepsia, & Dyspepsia.

Quid sint, earumque causa. Apepsia & Dyspepsia sunt morbi ubi quidem ciborum desiderium non deficit, verum cibi vix, vel parum, vel difficulter admodum in ventriculo digeruntur; unde doloris & ponderis sensus cum ructibus & flatibus copiosis, ut inde necessario cruditates & humores corrupti in ventriculo generentur, qui aliorum quamplurimum morborum ac symptomatum causa fieri possunt. Oriri solent hæc mala ut plurimum a prædieta, atque speciatim nimia ciborum, præsertim pinguium & oleosorum ingluvie, cum primis si vita sedentaria aut otium nimium accedant; quibus non solum liquores

or gastricus corrumpitur, ac nimis viscidus reddi-
verum & vis elastica ac motus tonicus fibrarum
triculi vehementer relaxantur ac debilitantur, ita
hac ratione ventriculus quamplurimorum morborum
unda fiat mater, præsertim ubi studia severa conti-
& lucubrationes multæ accedant.

X V I.

Ad hos vero morbos curandos, primo *corrupti hi hu-* Curatio.
es, (præmissis præsertim, si opus, per aliquot dies
bus digerentibus) vel vomitu sunt expellendi, vel
quid vomitum prohibeat, purgantibus §. VI. indica-
Postea, *servato moderato victus regimine*, vitatifi-
alimentis difficulter digerendis, omnis generis *sto-*
bica & roborantia (§. V.) ad anorexiam commen-
& hic diligenter adhibenda. *Motus* quoque insti-
tur *frequens*, ambulando, vehendo & equitando, ab-
endumque a nimia quiete nimisq; studiis & cum-
his lucubrationibus, aut mox ante vel post pastum
tutis. *Ufus aquarum medicatarum martialium* legiti-
cum apta victus ratione in his malis quoque quam
tacissimus est.

X V I I.

De Ventriculi ardore.

Ardor ventriculi, quem barbari *sodam* quoque appel-
est, est molesta ardoris cujusdam circa cordis scrobi-
um, sive sinistrum ventriculi os perceptio, qui ar-
inde per œsophagum ad os usque se extendere so-
cum pressionis aut spasmodicæ constrictionis sensu,
do per brevius, modo longius temporis spatium du-
s, & per intervalla plerumque, modo breviora mo-
longiora rediens. *Caussas* huic malo in nonnullis
bent *cibis pingues*, præsertim vervecinæ, ac specia-
, si mox aut brevi saltem post, potus frigidus &
aprimis cerevisia superingeritur; in aliis ab *assum-*
acidis, vel saltem acescentibus producit. In qui-
dam ab *aromaticis* aut spirituosiss, in aliis denique
humoribus biliosis, ac sigillatim in hominibus cho-
cis concitatur. Malum hoc in multis admodum le-

Quid
& ejus
caussa.

ve est, atque plerumque brevi tempore sponte transiit ita ut vix Medicina egeat; in aliis vero longe pernacius est, & tam sæpe redit, ut ægris fiat quam molestissimum, iique propterea auxilium a Medicis efflagitare cogantur.

X V I I I.

Curatio. Adeoque in curatione *ad causam semper probe respiciendum*, & si *ab acido* ipsum induci intelligimus, a *sorbentia* & nominatim lap. Cancror. præp. mater perlarum aut conchæ præparatæ C. C. præp. Crysta montan. præp. aliave similia, admixta quarta vel quinta quasi parte pulveris: nucis moschatæ, ad ʒss. p. dosi vel per se assumpta, vel ex aquis destillatis, v. theæ aut coffeæ aliove calido vehiculo data, egregie profunt. Vulgus etiam *creta* vel sola, vel cum nucis moschata mixta, contra hoc malum cum fructu utitur: sed cavendus usus ejus nimius, quia ob vim spasticam ventriculo & intestinis adversatur, interea tamen *species diacretæ Mynsichti* magnum nomen, promptum auxilium, quod hic sæpe præstant, adeo sunt. *Oleum tartari per deliquium* ad guttas XX. v. XXV. ex thea, coffea vel jusculo aut cerevisia calidum sumptum in momento etiam plerumque ardorem illum extinguit, id quod & tinctura tartari & spiritus C. C. vel utraque commixta ut plurimum egregie præstat. *Si a biliosis humoribus* ortum ducat, spiritus nitri dulcis a guttis XXX. ad L. ardorem & dolorem tollit, si cum aqua, præsertim vero, si cum thea v. coffea assumitur. Quando *a cibis pinguibus* & haustu frigido superingesto provenit, *bastulus spiritus vini boni*, vel aquæ stomachicæ vinosæ eum ut plurimum compescit. *Vitandæ simul sunt causæ*, quæ eum quolibet producere solent, & *purgantia* subinde interposita ad humores vitiosos e ventriculo educendos haud quoque multum, cum præservandi tum curandi scopi profunt. In *sanguineis*, quia congestio sanguinis circa ventriculum sæpe ad ardorem hunc excitandum cit, *missio sanguinis* circa æquinoctia cum moderata vigiliis ratione multum ad eum avertendum facit.

X I X.

De Cardialgia.

Cardialgia est dolor minus vel magis vehemens circumscribendum cordis, cum anxietate, nausea & sæpe vomendi, immo vomitu ipso combinatus. *Causæ* ejus sunt vel *humores vitiosi* in ventriculo hærentes, ventriculum sic figillatim os ejus sinistrum, quod *cardia* appellari solet, vellicantes ac rodentes, tamquam febres intermittentes, quam & sæpe in eis, qui ventriculus ad eos ejiciendos, seque ab illis liberum ad spasmodicas contractiones, plus minus violentas, adigitur, unde non solum hic dolores, verum & nausea atque haud raro vomitus valde molestantur; sæpius tamen cardialgia quoque est sine vomitu. Vel oritur etiam cardialgia quandoque a *flatibus* atque humoribus noxiis ab alimentis non satis concoctis oriundis; vel subinde quod a *vermibus* in ventriculo provenit: vidique scemina, quæ ex hac cardialgia, quæ vehementissima & convulsionibus stipata erat, brevi periit, in cujus ventriculo magnum lumbricorum acervum & cardiam de intus arrosam inveni. Frequenter etiam a *convulsionibus sanguinis circa ventriculum*, in ramis venæ portæ apud sanguineos, & speciatim hypocondriacos hæmorrhoidales hystericas, producitur; ubi subinde vomitum tantum eumque haud raro periculosum post se trahit. Quandoque & in *febris acutis* & præsertim malignis ac *stomachicis* nobis dictis (vid. supra cap. V.) oritur ejusmodi cardialgia, & quidem sæpius cum vomitu aut saltem conatu vomendi molestissimo, quo præsertim a pernicioso humoribus in ventriculo hærentibus se liberare studet.

Cardialgia & ejus causæ.

X X.

Curatio igitur pro causarum diversitate varia est, & loco faciliior, modo difficilior, immo quandoque incertissima aut prorsus impossibilis. Si a ciborum reliquiis paullo acrioribus, aut non satis bene digestis, quodque oriundis *flatibus*, oritur, horis præsertim matutinis.

Curatio.

tutinis, & jejuno adhuc ventriculo, *sepe potui calidæ theæ vel coffeæ solo, vel decocto flor. chamomillæ, aut guttulis aliquot essentiæ corticis aurantiorum vel aliqujuscujusdam stomachicæ simul assumptis cedit; vel etiam si aquæ cujusdam stomachicæ spirituosæ, ut anisi, foeniculi, corticis aurantiorum, cinamomi, carminativæ a vitæ Matthioli cochlear unum vel alterum assumitur. Ita & pulvis corticis aurantiorum zj. vel florum chamomillæ, cum paucis croco in vini ʒj. vel ʒij. calefacti & adjecto pauxillo sacchari assumptus hic valde prodest. (a)*

Quando vero *nimiam ventriculi repletionem & cum primis alimentis difficulter digerendis, aut pinguitudinem factam pro causa habet; vel ubi ira pastum vel percessit, vel mox secuta est, ad hæc e ventriculo per viam brevissimam ejicienda, lenem emeticum dari debet præsertim ubi jam nausea & conatus vomendi adfuerit, cui post temporis aliquod intervallum potus frequens largus aquæ tepidæ subjungendus, ut acria hæcce non solum hac temperentur, verum & viscida ac crassa, fluida atque mobilia reddantur, ventriculus melius ea eluatur, atque vomitus hoc ipso commodè promoveatur. Quando autem æger jam vomit, vomitorium, ne nimius vomitus, qui hyperemesis vocatur hic inducatur omitto, & solum frequentem ac largum potum aquæ tepidæ, ad ventriculum eo melius purgandum vomitumque ægris facilitandum, assumendum impero; qui adhuc magis promovetur, si folia quædam cardui benedicti in illa aqua tepida per breve tempus macerantur, vel drachma dimidia salis cujusdam distillati, amaricantis, ut tart. vitriolati arcan. duplic. absinthii, aliufve similis, in vomitu præsertim in illis, ubi materia vitiosa ob tenacitatem a ventriculo avelli adeoque expelli nequit, semel iterumve exhibitur. His postea ventriculum roborantia, quæ §. V.*

VI

(a) In ejusmodi cardialgia utilissimam sæpe deprehendi seq. potiunculam. R. aq. card. ben. vel mel. iij. aq. vitæ Matthioli ʒj. elæos. macis vel cort. aur. zj. D. cochl. j. vel ij. aliquoties, donec cesset.

laudavimus, una cum motu frequenti & modica
ta subjungenda.

X X I.

si vero *cardialgia* a *congestionibus sanguinis* & inde *Curatio*
is spasticis ac valde dolorificis ventriculi constrictio- *vehement-*
us, sicut haud raro in hypocondriacis ac hysterice *tioris.*
nibus fieri solet, ortum habet, *Vomitoria*, quia
e nihil quicquam mali in ventriculo hæret, *non*
ducunt; sed iis potius hi spasmus ac dolores in ven-
iculo, jam per se atrocissimi, ita interdum exacer-
tatur, ut simul motus convulsivos ac tremores hor-
dos per totum corpus concitent, atque sic *cardial-*
m omnium vehementissimam, qua ægri haud raro
erficiuntur, inducant. Hinc præstat primo *ad san-*
nem hic congestum revocandum & abducendum *lar-*
a satis ejus *copiam per venas extrahere*, mox vero
ul ægro *medicamenta antispasmodica* & cumprimis
veres antispasmodicos, resolventes ac temperantes,
tart. vitriol. nitro, cinnabari, lapid. cancrorum ci-
tis aut similibus, vel cum potu aqueo calido, vel
n aqua fœniculi, melissæ, menthæ sæpius porrige-
quibus etiam spir. C. C. cum tinctura tartari re-
cta, ad guttas L. LX. & ultra subinde aptissime in-
ponitur. His si *enema emolliens & anodynum* inte-
is injectum & *vesica lacte* vel aqua calida, (in
bus florum chamomillæ manipuli duo incocti sunt)
eta ventriculo calide imposita adjunguntur, sæpissi-
hæc *cardialgiæ* species optime mitigatur ac tandem
itur, relicta tamen ut plurimum ingenti virium
ilitate, a qua sæpe non nisi longo temporis spa-
liberari possunt. *Equitatio* tamen multum hic
dest.

X X I I.

n *cardialgia*, quæ in *febris acutis stomachicis*, *Curatio*
itis quinti, affligit, cumprimis, si eam nausea co- *si in fe-*
etur, vel lene *evacuans ex rhabarbaro*, aliove blan- *bribus*
laxante dandum, vel & ipsa *rad. hypecacounæ* mo- *vel a*
dosi exhibenda, hisque deinde remedia temperan- *vermi-*
febris acutis apta, sunt subjungenda. Quando *bus.*
cardialgia a vermibus in ventriculo inducitur, diffi-
ter quidem ea cognoscitur; attamen si vermes hic
adesse

adesse per signa quædam cognovimus, curatio contra hos potissimum erit instituenda, sicut suo loco mon-
docebitur.

X X I I I.

De Flatuum & Ructuum molestiis.

Fla-
tuum
caussa
I.

Flatuum & ructuum copia multis tam molesta est
ut medicam opem implorare cogantur. Ut plurimum
pro causa agnoscunt *debilem ventriculum* non bene co-
coquentem, & *cibos crudos*, ac *flatulentos*, nominatim
fabas, pisas, lentes, brassicam, rapas, raphanos, carna-
duras aut pingues, atque in universum *nimiam ven-*
triculi cibis quibuscumque *repletionem*, quos ventriculi
digerere satis nequit, hinc hi in cruditates ac pitui-
tam, hæ vero in flatus degenerant, præsertim dum tu-
nus ventriculi & intestinorum illa pituita ita debilita-
tur, ut aer vi sua elastica majus spatium affectet, a-
que sic sæpe non sine magno incommodo per os sup-
rius & inferius prorumpat; vel, si prorumpere non
possit, *ægris magnas anxietates*, spirandi difficultatem
aliaque mala inducat.

X X I V.

Caussa
2.

Altera flatuum causa sunt *congestionibus sanguinis*
vasis venæ portæ & præsertim ventriculi atque intesti-
norum, in sanguineis, hypochondriacis atque hysteri-
cis, quibus intestina, dum sanguis venæ portæ hepatis
commode transire nequit, ad motus spasticos irritantur,
a spasmis tandem diuturnis debilitantur, toni
eorum relaxatur, ita ut aer contentus vim elasti-
cam exercent, ventriculum & intestina valde disten-
dat, diaphragma & pulmones urgeat, unde si ob cau-
sam quamcumque expelli nequeant, *angustia atque anxietates*
præcordiorum, *spiritus difficilis*, *dolores colici*
cardialgia, & per consensum ventriculi cum capite
dolores capitis, *vertigo*, *vigilia* aliaque mala indu-
cuntur.

X X X V.

Curatio
prima.

In curatione autem hæ duæ flatuum causæ ac sp-
asmi probe à se invicem distinguendæ; quia ut plurimum id
quod

od in hac prodest, in altera nocet. Igitur in specie
XXIII. quæ a cruditatibus ventriculi oritur, evacua-
tio primarum viarum per idonea purgantia §. IV.
VI. præ omnibus requiritur; sordibus vero evacua-
, *stomachica roborantia*, aromatica, amara & carmi-
nativa §. V. exhibenda, in forma guttuum, pulveris
infusi, præsertim vinosi. Speciatim vero hic *essen-*
carminativa VVedelii, spiritus nitri dulcis, spiritus
minat. de tribus sem. anisi, fœniculi, carvi, sac-
cro obducta, pulv. flaved. cortic. aurant. cum vino
ido, vel & post pastum aquæ spirituosæ anisi, car-
fœniculi, corticis aurantium, menthæ, vel vitæ
atthioli cochlear. j. vel ij. deglutiri cum fructu pos-
sit. Si præterea *modicam servant dietam*, flatulentos,
nimios cibos, una cum *vita sedentaria* vitant, &
tra corpus sæpe exercent, a flatuum incommodis li-
antur, seque etiam eodem regimine ab illis quam
cacissime præservare poterunt.

X X V I.

Quod si vero a congestionibus sanguinis in vasis ve-
portæ §. 24. & inde nata laxitate ventriculi atque
estimatorum flatuum incommoda oriantur, quam mo-
tam hodie *flatulentiam hypochondriacam* appellare so-
nt, & vel consuetæ sanguinis evacuationes naturales
pressæ vel artificiales neglectæ fuerint, illæ, si fie-
potest, restituendæ, vel sanguinis missio instituen-
atque si alvus obstructa, clystere emolliente, vel
ido laxante est aperienda, postea medicamenta an-
asmodica, in cardialgia §. XXI. commendata, dili-
ter usurpanda. Quæ si parum sunt, ad *martialia*
edia secuta, tam ad fluxus suppressos restituendos,
m ad tonum intestinorum ac ventriculi instauran-
a, tamquam ad sacram anchoram, est confugiendum:
r quæ primaria sunt *tingtura vitrioli martis Ludovi-*
tingtura martis helleb. VVedel., præcipue vero *li-*
ura martis subtilissime trita, ad gr. VI. VIII. X. vel
a elæosacch. cinam. vel cum extract. plantarum ama-
m sumpta, vel & crocus martis antimon. Stahlii
n pulveribus stomachicis, aromaticis vel elæosaccha-
diu satis usurpata; vel & *aquæ martiales medi-*
, cum victu conveniente & frequenti corporis

Curatio
in feбри-
bus vel
a ver-
mibus.

motu; quæ in utroque casu fere præstantissimæ, sunt usurpandæ.

X X V I I.

De Colico dolore.

Quid
colicus
dolor.

Post cardialgiam & flatus nunc etiam de colico dolore speciatim adhuc acturus sum, qui est dolor plus minus vehemens, partim in ventriculo, partim in intestinis, atque interdum adeo atrox, ut ægri non solum vehementer clamare cogantur, sed &, sicut in cardialgia §. XXI. diximus, motibus convulsivis subinde corripiantur ac doloris atrocitatem vix perferre valeant, atque iis ipsis quam vehementissime intra breve tempus ita sæpe debilitentur, ut se vix commovere aut erigere valeant, atque diuturnus languor iis inde inducitur, qui paralyfin quandoque post se trahit, & ejusmodi vehemens dolor a Riverio, Sydenhamo aliisque colico Piætonum appellari solet. Quoniam vero sæpe mali sedes est in intestino colo, doloris colici vel colicæ nomen obtinuit.

X X V I I I.

Ejus
caussæ.

Caussæ ejus sunt 1. cruditates pituitosæ una cum flatibus a prava diætâ, sicut de his modo diximus, ortæ humores biliosi acres, in cholericis, vel iis, qui iracundius hementer perciti fuerunt, geniti. 3. congestiones sanguinis in plethoricis, hypocondriacis & iis, qui hæmorrhoidalibus morbis obnoxii sunt, atque ille sanguis per vnam portæ commode transire, vel per hæmorrhoidalem exitum sibi facere nequit, unde hæc colica hæmorrhoidalis vocari solet, hincque spasmi & dolores illi concitantur. 4. inflammatio ventriculi & intestinorum dolore quoque colicos atrocissimos in abdomine producere solet. Occasionem sæpe his doloribus præbet potus frigidus, corpore præsertim calente assumptus; incessus per pavimenta frigida, lapidea ac humida, pedibus nudis fructus horæi frigidi copiosius comesti, sanguinis excretiones consuetæ suppressæ, vel non rite succedentes; hiis sceminæ mensibus instantibus vel suppressis, vel non rite fluentibus, sæpe dolores colicos modo leviores, modo atrociores perferre solent.

X X I X.

In curatione igitur ad causarum diversitatem probe respiciendum: si enim a cruditatibus §.28. ex diætæ moribus natis, aut biliosis vitiatis humoribus orta est, que alvus obstructa, *clyisma* ex speciebus emollientibus & carminativis, addito ol. chamomillæ; nitro & esse injiciendum, quo ipso sæpissime præsentaneum imadvertitur auxilium; postea vel etiam ubi æger *clyisma* admittere nolit, *purgans ex rhabarbaro*, vel *samaro cathartico*, ad noxios illos humores eliminandos, dari debet. Quando autem ægri hi vomitu simul, ut sæpe fit, laborant, ut quicquid detur vel assumant, sursum rursus ejiciant, *clysmata* tunc sunt iteranda, & natura in expellendis humoribus vitiosis potius frequenti aquæ tepidæ, vel infusi foliorum cardui benedicti, aut *florum chamomillæ* est juvanda, quod optimum simul egregium anodynum est. *Opiata* vero, præsertim in principio, sunt vitanda; *sacculi contra vomitum* ex floribus chamomillæ & semin. 4. carminativis vel *vesica aqua vel lacte calido* repleta, in qua flores chamomillæ vel *matricariæ* cocti sunt; ventriculo calide sunt imponendi. Interne postquam prægripurgante, vel vomitu spontaneo primæ viæ purgatae sunt, aquæ carminativæ & spiritus ejusdem naturæ §. 25. indicati, sæpius, donec dolores remittunt, sunt porrigendi, ubi etiam sequens mixtura de utilis est.

Rx. aqu. fœniculi

chamomil. ā ʒiij.

essent. cort. aurant.

spirit. nitri dulcis ā ʒj.

sirup. cort. aurant. ʒiʒ. M.

qua detur quavis hora, & dolore paululum remittente, quovis bihorio cochl. j. vel ij. spiritus salis amariaci anisati, vel essentia millefolii cum essentia aleutica ad guttas L. vel LX. data, hic etiam sæpè egregie profunt: ita infusum quoque *florum chamomillæ & millefolii* loco theæ sæpius haustum in doloribus hisce leniendis valentissimum est. Corpus simul aere, quia perniciosissimum hic est, semper probe detur.

Curatio
biliosæ.

Quando dolores colici ab humoribus biliosis concitati sunt, ut plurimum perquam atroces esse solent: quod igitur in casu, præter remedia evacuante, præsertim ex *rhabarbaro* parata, & clysmata sæpius injecta, *vena sectanda*, ac *pulvis antispasmodicus* ex aquis aut infusis modo §. 29. laudatis, cum fructu sæpius exhibetur, atque *spiritus anticolicus de tribus*, aut liquor anodynus mineralis Fr. Hoffmani subinde dati, hic egregie bene faciunt. *Oleum amygdalarum dulcium* recens fibras valde irritatas ac spasmis contractas potenter quoque demulcet, si ad ℥j. vel ℥ij cum vehiculo calido aliquoties per intervalla datur.

X X X I.

Ejus,
quæ a
congestionibus.

Sed si a congestionibus sanguinis oritur, & vel merum vel hæmorrhoidum negotium turbatum est, studendum ut hoc suis remediis in ordinem redigatur. Qua de re videatur Cap. IX. Ut vero interea, dum restitutio illorum fluxuum, (nisi forte instent) non tam facilis est, ægris dolores leniantur, atque malum tolerabilius reddatur, *opiata* atque *narcotica* ab hos dolores tollendos hic minime adhibenda; quia hæc obstructions illorum fluxuum adhuc peiores ac pertinaciores reddunt, atque ægros vel in gravissimos alios morbos, vel in ipsum vitæ periculum conjiciunt; neque *carminativa calidiora*, ut *spiritus vini*, *aquæ carminativæ* inde paratæ, *essentiæ calidiores*, *olea destillata carminativa* aut *aromatica*, danda sunt; quia stimulante & calefaciente virtute dolores manifesto augentur, atque intestinis inflammationes facile inducunt; verum potius *venæ sectio* est instituenda, *clysmata* §. 29. sunt injicienda, & *pulveres antispasmodici* vel per se, vel in potiunculis sæpius sunt ingerendi, atque externe quoque quæ §. 29. commendavimus, ventri applicanda. *Præservandi gratia* iis, qui sæpius jam his male conflictati fuerunt, *sanguinis detractiones* postea bis vel sæpius in anno sunt instituendæ, sæpe *equitandum*, ut menses vel hæmorrhoides rite succedant, studendum.

X X X I I.

Curatio
inflam-
mato-
riæ.

Colicus dolor, qui ab inflammatione ventriculi ac intestinorum inducitur, & ex ardoris sensu in abdomine calido.

dolore p. n. pulsu febrili celeri, & siti cognosci solet, & longe peior est illo, qui a simplici congestione ortum trahit, atque omnium fere atrocissimus atque periculosissimus, minusque adhuc opiata aut carminativa calidiora curantur; sed potius requirit venæ sectionem largam, ut eræque graviores inflammationes internæ, eamque quod raro semel iterumque repetitam; quia viscera afflicta, hac omiſſa, facile alias in gangrænam & sphacelum mortiferum abeunt; & deinde eadem remedia, æ pag. 120. ad inflammationes internas curandas proposuimus, sunt adhibenda.

Olei amygdalarum dulcium vel olei lini usus (§.) ad dolores hosce atrocissimos leniendos ab ℥j. ad ℥ss. subinde exhibitorum, quamplurimis etiam quam maxime prodest. Miror hanc speciem satis frequentem a multis auctoribus Medicis silentio prorsus esse prætermiſſam.

X X X I I I.

De Vermibus sive Lumbricis.

Vermes sive *lumbrici* ventriculi quoque & intestino- *Ver-*
rum morbum peculiarem faciunt, quo sæpe gravissi- *mium*
inducuntur symptomata, dolores scilicet ac ro- *sympto-*
res ventriculi atque intestinorum atroces, convul- *mata.*
siones, epilepsia, atrophia, & haud raro mors: at-
que frequentius in infantibus ac pueris observantur,
quam in adultis, quamvis & in his sæpe negotium
essent.

X X X I V.

Quos adesse dijudicamus ex frequenti dolore roden- *Signa*
& pungente in abdomine: ægri plerumque palli- *ver-*
di aut livescientem faciei habent colorem, (quam- *mium.*
& hic in quibusdam sit sanis simillimus) infantes
omno sæpe terrentur atque expavescunt, plerumque
voraces & pane delectantur, spiritus male olet at-
que peculiarem prorsus eumque adversissimum obtinet
rem; adest sæpe nausea, quasi vomendum ipsis es-
set, atque os multo phlegmate subinde repletur; haud
vertigine etiam afficiuntur, atque in naribus digitis

sæpe scalpunt : venter in infantibus plerumque tumidus est, & per alvum multum pituitæ tenacis albican-
tis interdum rejiciunt ; quidam epilepsia, alii febricu-
la, quam *verminosam* appellant, corripuntur ; certissi-
me vero omnium, quando homines ægri vermes ve-
per os, vel per alvum semel aut sæpius jam rejece-
runt, eorum præsentia dignoscitur.

X X X V.

Ver- Tres præcipue dantur eorum species : quarum prim-
mium illa est, quæ lumbricorum terrestrium similitudinem
species. obtinet, & quæ hinc proprie *lumbrici*, vel & *verme-*
teretes appellantur : alteram *vermes plani* sive *lati*, quæ
ex multis quasi juncturis sive partibus planis constant
feminibus cucurbitæ aliquo modo similibus, constituunt
quos propterea *lumbricos latos* sive *planos* itemque *cu-*
curbitinos appellant, atque decem & plurium ulnarum
quandoque longitudinem habent ; (a) tertia species
vermiculis in caseo obviis haud absimilis est, & ut plu-
rimum tantum in intestino recto deprehenditur, ubi
ægris molestissimum pruritum ac tenesimum sæpe con-
citare solent. Interdum & aliæ adhuc *insectorum a-*
vermium species in corpore humano observatæ sunt
quæ per os & anum excretæ fuerunt ; quos vero Me-
dici ad peculiaria vermium genera, qui usum, for-
nullum præstat, nondum, quod sciam, retulerunt, se-
tantum ut insolita & rara insecta corporis nostri annu-
tarunt. Ita & nos de modo, quo generentur, & qua ra-
tione in corpus humanum perveniant, non hic dispu-
tabimus ; sed potius modum, quo interficiendi atque
ex eo ejiciendi sint, in usum ægrorum iis afflictorum
considerabimus.

X X X V I.

Curatio Utrumque præstant primo omnis generis *amara*, ve-
i. per a- mibus plerumque adversa : ut *absinthium* & *cumprim-*
mara. ejus atque *centaurii minoris* summitates, præterea he-
ba *scordii* & flores *tanaceti*, itemque semen *cine* si-
lantonicum, *cortex peruvianus* & *casscarillæ*, quæ cer-
vi-

(a) Vid. *Spigelius* de lumbricolato, *Andry* de la G-
neration des Vers, & *Clerici* Hist. Lumbricorum, v-
eorum figuræ & longitudo videri possunt.

isæ aut vino, præsertim malvatico vel canariensi in-
andi, & aliquoties in die aliquot cochlearia, vel ab-
dultis aliquot haustuli sumi debent. Eodem modo &
edic. *filicis* & *filipendulæ* cum successu usurpari pos-
unt. *Aloe*, *myrrha*, semen *cinæ* & *corallina* valentissi-
a quoque adversus omnis generis vermes corporis
umani sunt remedia, quæ vel in pulvere ex aqua
raminis, fumaricæ, scordii vel absinthii, vel si ægri
pulveres adversantur, cum *melle* in forma boli aut ele-
uarii bis vel ter in die sumenda. *Succus nasturt. a-*
nat. rec. matutino tempore per aliquot dies, larga
tis copia sumptus, vermibus quibuscumque & specia-
m *planis* maxime adversatur.

X X X V I I.

Præterea *martialia* & sigillatim *limatura martis* lum-
ticos & ascarides exturbant, si larga satis copia ægris
er aliquod tempus exhibentur. Ipsæ etiam *aquæ mar-*
ales, & speciatim *Pyrmontanæ*, vermes quoscumque
pellere solent. *Acida* quoque *remedia*, ut spiritus vi-
oli, vel sulphuris, Elixir. vitrioli *Mynsichti*, Eli-
r. propriet. *Paracelsi* & similia vermibus etiam valde
nt inimica, si per aliquod tempus apta quantitas æ-
is ex aquis laudatis exhibeatur: immo & ipsum *vi-*
um merum ægris his, tam adultis, quam pueris, in
astu datum, vel etiam cum laudatis vegetabilibus in-
sum, & horis medicis haustum ad vermes destruen-
os conducit.

2. Per
martialia &
acida.

X X X V I I I.

Denique & remedia ex *hydrargyro* parata vermibus
nt insensissima, & cumprimis commode adhiberi pot-
t, postquam uncia dimidia vel integra in aquæ gra-
minis, absinthii, fumaricæ, aut scordii, vel etiam vul-
aris, libra una, in vase vitreato per horam quasi di-
midiam coquitur; agitando interea sæpius hoc hydrar-
gyrum bacillo ligneo, quæ aqua postea in vitro ser-
anda, & infanti vel puero aliquoties in die cochlea-
e unum, adultis vero duo vel tria danda, quod de-
octum adhuc valentius redditur, si ei sirupi de ci-
hor. cum rhabarb. ℥i. vel ij. adduntur. Eandem et-
am virtutem obtinet *hydrargyrum*, si eadem ratione
is vel tre in die cum lacte decoquitur, atque infanti-

3. Per
mercu-
rium.

bus ac pueris, qui lacte delectantur, mane a meridie & circa vesperam, adjecto pauxillo sacchari, aliquot unciae calide devorandæ exhibeantur. Præterea supra jam cap. XIV. monui, me *electuario ex cortice peruviano mercurio vivo*, conserva quadam & sirupo parato puellam a vermibus & epilepsia satis jam inveterata & ubi multa frustra prius adhibita fuerunt, liberasse. Denique & *æthiops mineralis* ad aliquot grana sæpe datus, & qui hoc adhuc præstat, *mercurius dulcis* præstantissima sunt anthelmintica, cujus ultimi granulum dimidium vel unicum infantibus, adultis vero granum unum vel duo, cum pulveribus supra laudatis vel etiam cum extractis amaris in forma pilulæ unius vel plurium, bis in die dari commode possunt; atque sic sæpe fit, ut ab omnibus illis laudatis remediis vermes & teretes & lati non solum interficiantur, verum etiam quandoque integri vel destructi expellantur: ad quod igitur in usu horum attendere debent ægri adulti, in infantibus vero & pueris eorum parentes vel ancillæ.

X X X I X.

4. Per
purgan-
tia.

Si vero nulli vermes ab his remediis expelli observantur, opus est, ut *tertio vel quarto quovis die purgans* quoddam illis interponatur: pro quo autem talia eligenda sunt purgantia, quæ simul vermibus sunt adversa. Huic igitur scopo *mercurius dulcis cum aloe*, vel *scammonio* aut *diagrydio*, aut *resina jalapæ*, aut *trochiscis albandali*, vel in pulveris vel pilularum forma, aptissimus est, observando, ut cuilibet ægro, pro ætate & virium ratione, apta horum quantitas exhibeatur. Ita etiam aliquoties observavi, quod, dum ægris, tam pueris, quam adultis, de quibus, an vermibus laborarent, ignoraveram, ob alias causas & morbos pilulas ex mercurio dulci, resina jalapæ & extracto panchymagog. Crollii paratas, per aliquot dies continuos exhibuerim, magna copia lumbricorum, immo integri eorum nidi expulsi & rejecti fuerint.

X L.

5. Per
remedia
externa.

Externa quædam remedia quoque his in malis non prorsus rejicienda sunt, præsertim quia infantes & pueri occurrunt, qui nulla remedia interna assumere volunt.

Huic

hic igitur scopo inserviunt *fel bubulum*, quod ventri-
terve in die calide probe inungendum, vel hujus
oleum colocynthid. vel unguent. de arthanita five
cyclamine, vel ol. absinth. coct. cum ol. destillat.
anthii & tanaceti roboratum, vel & *succus recens*
cicis cyclaminis, qui a veteribus valde hic commen-
tur: quibus interne *decoctum mercurii cum lacte* com-
de addi potest, quia hoc non ut medicamentum,
ut alimentum assumunt.

X L I.

De Ascaridibus.

ascarides in intestino recto nidulantur, id quod *Ascari-*
molestissimo pruritu circa anum & in intestino re- *dum cu-*
ut & ex tenesmo five frequenti desidendi stimu- *ratio.*
quam maxime vero ex observatis & visis ejusmodi
folis, vermiculis in caseo generatis similibus, in
orum excrementis dignoscitur, ad eas interficiendas
expellendas conducunt *primo laudata martialia* §. 37.
urgantia mercurialia §. 39. ac deinde *clysmata in-*
a ex anthelminticis, ut decocto ex herb. absinth.
cinæ, myrrhæ & hydrargyro in aqua parato,
olei absinthii cocti vel alterius olei $\zeta i s s$, vel $\zeta i j$.
& in anum tepide injici potest. Vel & *clyster*
olo oleo olivarum vel lini, vel amygdalarum, a-
e simili paratus aliquoties injiciendus, qui omnes
rides interficit, dum nulla ejusmodi insecta olea
erre aut in iis vivere possunt, sed ab iis cito in-
ciuntur.

X L I I.

De Tenesmo.

tenesmus est molestus ac sæpe dolorificus desidendi *Tenes-*
alus in intestino recto, quo tamen parum vel *mus.*
per alvum excernitur. *Excitatur sæpe ab asca-* *quid &*
us in hoc intestino habitantibus; vel ab acri *caussa.*
in dysuria aut stranguria, vesicam & intesti-
num

306 *Caput XVI. De morbis ventriculi, &c.*
num rectum, ob arctum nexum vehementer stimulant
vel & a calculo in vesica; vel ab acri materia quæ
dysenteria intestinum rectum irritat ac rodit, & der
que in hæmorrhoidum negotio, quando sanguis noxi
vel abundans in hoc intestino congeritur, vasa ibide
valde distendit atque exitum ibi molitur, quo, præ
dolorem, tenesmus sæpe inducitur molestissimus.

X L I I I.

*Ejus cu-
ratio.*

Quando *tenesmus* ab *ascaridibus* oritur, tunc sublat
& enecatis iis, ut §. 40. docuimus, & hic tollitur
Si ab acri urina, hujus acrimonia, ut Cap. XII. §. 1.
dictum, est temperanda. Si a calculo in vesica, ne
curatur nisi hoc ablato; imitigatur tamen externe cly
matibus emollientibus & lenientibus cum lacte paratis
vel suppositorio ex butyro non salito, in anum sæpi
demisso. Interne simul ea sunt exhibenda quæ ad ca
culi vesicæ dolores mitigandos supra pag. 176. com
mendavimus. Si ab hæmorrhoidibus cæcis vel instam
bus, eadem enemata & suppositoria, quæ modo laud
vimus, conveniunt, vel & oleum amygdalarum du
aut liliorum alborum, aut verbasci, vel unguentum
linaria aut nutritum, quæ dolentibus partibus illine
da; vel *fotus emolliens & leniens* ex foliis hyoscyam
vel flor. verbasci cum lacte coctus ano imponendus.
in dysenteria incidat, calor eum optime lenit; hi
quoties alvus exoneranda, aut tenesmus urget, *vas*
qua calida impletum iis supponatur; vel *clyisma em*
liens cum lacte paratum, adjecto oleo olivarum, li
papaveris albi, verbasci, hyperici vel liliorum alt
rum cum vel sine theriaca, subinde applicetur;
& splenium decocto herbæ hypocyami vel altheæ, a
florum verbasci & chamomillæ cum lacte imbutum
ano superimponatur, & pro doloris modo sæpius re
teretur.

CAPUT XVII.

De Morbis sexus fœminini præcipuis.

I.

Unt, præter morbos hæcenus propositos, sexui u- Morbis
trique plerumque communes, quidam adhuc mor- bi quo-
sexui fœminino, & quidem 1. virginibus, aut fœmi- tuplices.
non gravidis; vel 2. gravidis; vel 3. parturienti-
s; vel denique 4. puerperis *propriis*: quorum quidem
nullos jam supra variis in locis exposuimus; ve-
m sunt adhuc quidam mulierum morbi, de quibus
hæcenus nondum egimus, & qui seorsim adhuc hic
considerari merentur.

I I.

In virginibus, viduis, & mulieribus non gravidis fœ- Men-
menstrua deficiunt, aut obstruuntur, siue supprimun- struorum
, vel non satis, & tunc sæpe cum dolore excer- vitia.
untur, vel non debito tempore & tardius veniunt;
nimium fluunt, aut etiam justo citius redeunt;
de omnis generis mala eaque sæpe gravia sympto-
mata oriuntur: quæ si ab obstructione aut non satis
iporum fluxu proveniant, ut capite IX. p. 141.
cuius, emmenagogis, venæ sectione in pede, pe-
luviis, balneis, fricationibus pedum frequentibus, ac
potu, &c. curanda; sin vero nimis fluunt, fluxus tem-
perantibus aliisque idoneis remediis est moderandus;
emadmodum hac de re capite VIII. pag. 133. jam
tum est: sicut & de hysterico malo p. 169. de chlo-
i pag. 192. & fluore albo pag. 221.

I I I.

De Sterilitate mulierum.

Sterilitas fœminarum, quandoque non harum, sed vi- Sterili-
rum subinde culpa contigit, quando ejusmodi vitia in tatis fœ-
s observantur, de quibus supra, Cap. XV. §. 26. di- minarum
ximus; causæ.

ximus; sed si talia absunt, ut plurimum causa est mulieribus, & dependet vel a mensibus ob causas quamcumque non rite succedentibus; vel ab iisdem mensium & perpetuo fere fluentibus; vel a cachexia, fluore albo, aliave corporis aut uteri prava constitutione vel a vaginæ vitio, quando hæc vel nimis arcta, aut concreta, vel tumore, membrana morbosa, aliave in loco obsita vel clausa est. Potest etiam oriri ex ore uteri interno coalito, aut tubarum Fallopii, vel ovarii vitio, aliave uteri malo interno, atque in sensus non intercurrente; quæ propterea ut plurimum nec cognosci nec curari queunt.

I V.

Curatio
ejus.

In curatione igitur ad causas probe respiciendum est, nam si a mensium anomalia, hi secundum methodum Cap. VIII. & IX. propositam, in ordinem sunt redigendi; sin a fluore albo aliave malo corporis habitu hæc vitia sunt curanda, ut Cap. VIII. proposuimus, ubi inprimis pilularum Beccherian. diuturnus usus, cum decocto ligni sassafras aut guajaci, cum ess. succini ac scordii, vel & aquæ minerales ac thermæ, interne & externe adhibitæ, multum sæpe præstare solent, si legitime usurpantur.

Quando vitium adest in uteri vagina male constructa, sive ea sit nimis arcta, sive concreta, aut carunculis vel tumore obsita, arte chirurgica hæc vitia sunt tollenda.

Si vitium simile in ipso utero, ovario aut tubis Fallopiæ, quia nec visui nec manibus accessus datur, plerumque est immedicabile. Aquæ medicatæ tamen tam frigidæ, quam potissimum thermæ, sæpe tam in mensium anomaliis, quam fluore albo, & malo corporis habitu, quam & in malis nobis prorsus occultis corrigendis, ut modo dictum est, multum haud raro boni præstant, & mulieres multæ, ut experientia sæpe docuit, post earum usum conceperunt, quæ diu antea fuerunt steriles.

V.

De Gravidarum noxis.

In gravidis vero multis quam plurima quoque occurrunt symptomata; quorum pleraque, primis potissimum mensibus, ex sanguine menstruo retento, atque inde nata plethora, mihi oriri videntur: ut cibi retentia læsa aut imminuta, vulgo appetitus prostratus, aut depravatus, quem picam & malaciam vocant, inque nausea, & vomitus frequens, in aliis animi deliquiis, dyspnœa, hæmorrhoides, hæmorrhagia uteri, & artus, &c. Alia vero ultimis mensibus, a mole sive magnitudine fœtus, secundarum, & aquarum, quibus fetus innatat, sensim incrementum, variasque corporum actiones lædentium, proveniunt: inter quæ, præenarrata, tumores pedum, varices, tensiones abdominis, spirandi difficultas, obstructio alvi, flatuum molestia ac tormina, hæmorrhoides dolentes aut fluentes, difficultas urine & alvi fere præcipua sunt: quæ omnia mechanice rationibus deduci, atque ex eis satis commode explicari possunt.

V I.

In curatione igitur symptomatum primorum mensium, cumprimis nausea, vomitus, anorexiæ, vitandus vitiosus inordinatus ac nimius; & e contrario, conducunt quæ primis mensibus. Vita modica, potus tenuis, motus moderatus, at frequens, blanda roborantia, stomachica, carminativa & cardiaca, cum blandis acidis, ut essentia cortic. aurant. gentianæ cum spiritu nitri dulcis, elix. viscerale Hoffmanni, vel etiam in calidioribus & biliosis, spir. nitri dulcis solus, vel elixir. vitrioli Mynsichti. Contra in paullo frigidioribus, aqu. cinamomi, cinam. cydon. aliave cordialis, & in pastu haustulus vini generis confert.

In animi deliquiis, dyspnœa, hæmorrhagia uteri, &c. Sanguinis in brachio instituta, hæc symptomata curare solet; quæ vero in valde plethoricis, si res pergit, post aliquod tempus semel iterumque interdum repetenda. Nonnullis etiam in primis mensibus, præfer-

sertim si victus inordinatus præcessit, aliave *signa ac sint cruditatum in ventriculo*, lene medicamentum *avum ducens*, immo & si vomitus indicia adsunt, *emeticum* etiam blandum conducit, & roborantia postea his subjungenda. In appetitu depravato, si terrea appetunt, hoc acidum peccare in ventriculo indicat: hinc terrea, attamen securiora sive blandiora, ipsis sunt danda; contra si acida, alcali aut calor peccat, adeoque acida ipsis etiam modice sunt concedenda & suadenda. Denique si *salsis* aut *aromaticis* delectantur, pituita in ventriculo abundare hæc significant; hinc præmissis lenibus & aptis *purgantibus*, qualia sunt pilulæ Beccherianæ aliæque similes, vel rhabarbarina, vel aquæ aut *salia amara* laxantia, &c. vel etiam pro indicantium ratione, blando *emetico*, *salia media*, medicamenta amara & aromatica, ad cruditates has viscidas destruendas, ipsis sunt exhibenda, observata simul apta victus ratione.

V I I.

Quæ mediis & ultimis. In symptomatibus, *quæ mediis & ultimis mensibus* a mole & magnitudine fœtus atque uteri & sæpe simul adhuc a plethora proveniunt, ac speciatim in tempore pedum ac varicibus, ut & dyspnœa ac palpitatio cordis, in sanguineis conducit maxime *missio sanguinis* in brachio, deinde blanda diaphoretica & diuretica quotidianæ *fricationes pedum*, motus moderatus, se frequens corporis, diætâ modica, atque antea §. VI. indicata *remedia roborantia*, vitando simul otium, necessaria sunt; in *pituitosis* vero venæ sectio omittenda.

V I I I.

De Alvo obstructa Gravidarum.

Alvi obstructio. Speciatim propter *alvum obstructam*, præ omnibus *potus sufficiens*, aqueus vel tenuis, ut theæ, coffeæ cerevisiæ tenuis, vel aquæ cum paucis vino est commendandus, ac præterea *victus mollis*, humidus, leniens, vitando siccum, adstringentem, durum, flatulentum, necessarius est; & si hæc ex fonte diætetico desumpta forte non sufficiunt, *clysmâ* emolliens subinde adhi-

ibendum, aut lenissimum remedium alvum ducens, modo *laxans* dictum, ut *Potiuncula* ex tamarindis, fœnæ & manna vel *magnesia*, vel *pilulæ* blande rientes, ut *Beccherianæ* aliæque similes, vel *sal quo-amarum* purgans modica, attamen sufficienti copia exhibendum.

I X.

De Flatuum molestiis.

in flatuum molestiis, & inde sæpe natis *torminibus*, *Flatus*. *tetatibus* aut *dyspnæa*, præter victum modicum, & rationem alimentorum flatus inducentium, modoque VIII. dicta aperientia ac laxantia, *stomachica* & *carminativa* antea §. VI. laudata atque imprimis essentia *cortic. aurantiorum*, essentia *carminativa* Wedelii, *spiritus nitri dulcis*, vel *carminat. de tribus*, aqua *emmonum*, *cort. aurant.* vel *carminativa* quantitate modice subinde sumpta, egregie conveniunt.

X.

De Urinæ difficultate.

in urinæ difficultate, elevatione ventris gravidæ, quia *Urinæ difficultas*. *us cervicem vesicæ comprimit*, plerumque succurri potest; ut, & præsertim si hæc non sufficit, *cataplasmate* ex *chærefolio* & *cepis assatis* pubi imposito, aqua liq. terræ foliatæ tartari, vel tincturæ tartari vel & subinde solius aquæ petroselinæ aut *chærefolii* vel *emulsionis* ex nucleis persicorum vel amygd. r. cum aquis his paratæ, potu prodesse possumus; *medicamenta vero fortiora*, quia facile sanguinem nimis agitant ac fœtum pellunt, sæpe nocent. In malo casu graviore, *cathetere* potius urinam e vesica emperat.

X I.

De Ventris tensione.

Dolor abdominis. In tensione & dolore cutis atque musculorum abdominis, a foetu & utero vehementer extensorum inductis, atque hinc multis perquam molestis, externe ad *hæmorrhoidum vitia.* partes emolliendas ac leniendas, pinguia, oleosa & emollientia, ut unguent. dialth. vel ol. amygdal. dulc. aut liliorum alborum, butyrum recens, aut *pinguedines variae* blandiores, ut caponum, anserum, medulla pedum vitulinorum aut bubulorum, abdomini sæpius calide inlita, optime profunt.

X I I.

De Hæmorrhoidibus dolentibus.

Hæmorrhoidum vitia. Hæmorrhoidum cæcarum dolores & tumores pulveribus temperantibus aut antispasmodicis & potui tenui, quoso interne; sed externe sanguinis missioni, applicatisque eis, quæ pag. 181. ad hæmorrhoides inflammationes aut dolentes commendavimus, ac speciatim etiam decocto foliorum hyoscyami vel sem. lini cum lacte aliquoties applicato, egregie cedere solent. Sed si hæmorrhoidum adest fluxus, hic similiter moderandus laudatur pulveribus temperantibus, venæ sectione in brachio usu moderato infusi herbæ & flor. millefolii ac quies corporis: qua de re uberius consilium ex pag. 131. peti potest.

X I I I.

De Uteri hæmorrhagia, & Abortus metu.

Uteri hæmorrhagia, & abortus. Hæmorrhagia uteri, & inde metuendus abortus, periculosissimus gravidarum affectus, vel a plethora & orgasmismo sanguinis; vel ab ira aliisque affectibus animi gravioribus, vel a solutione placentæ ab utero, lapsu saltu, ictu vel alia quacumque de causa, sive inter-
sive

ve externa facta, dependet, ubi sanguis sæpe tam
 erga copia ex utero profluit, gravidæque haud raro
 re vi tam insigniter inde debilitantur, ut sæpius, ni-
 in tempore adhuc auxilium feratur, ob sanguinis
 unc fluxum enormem pereant. Igitur *si ab orgasmo,*
el plethora, vel etiam ab ira oriatur, conducit præ-
 annibus quies corporis & animi, pulveres vel mix-
 træ temperantes, sanguinis missio in brachio, aer
 potus moderate frigidus, & abstinencia ab omni-
 is calidis & calefacientibus aut spirituosus, ut & ab
 a ac venere. At *in malo graviori,* potio Sylvii ad-
 tingens, pulv. stypticus Heurnii, immo alumen i-
 um ad modum *Mynsichti & Helvetii* paratum, a-
 ve adstringentia & opiata moderata, qualia supra
 g. 128. de fluxibus sanguinis nimis comendata sunt,
 nveniunt, quibus ipsis etiam tunc *abortus sæpe præ-*
vetur.

X I V.

Si vero ab his hic sanguinis fluxus non remittat, *Curatio*
acentam ab utero solutam esse indicat, quæ huic nul- *chirur-*
 ratione rursus agglutinari, adeoque nec medicamen- *gica.*
 fluxus hic cohiberi potest: hinc, quia gravida sem-
 r inde redditur debilior, & quidem, ut aliquoties
 n observavi, brevissimo subinde temporis spatio, at-
 e hoc in statu metuendum, matrem cum fœtu bre-
 esse perituram, sicut plura ejusmodi novi exempla,
us una cum secundinis, sive vivus adhuc sit sive
ortuus, perita manu mature & caute *educendus,* quo-
 mque etiam gestationis tempore hoc fuerit, sicut in
 iurgia nostra peculiari capite (a) id uberius do-
 mus; quo solo sæpe mulieres hæ, si justo id ad-
 c fiat tempore, servantur; nam alias mater & fœ-
 s simul certo pereunt; vel si feliciter adhuc res
 o matre cedit, & sanguis ac dolores partus fœ-
 m immaturum expellunt, *abortus fit,* atque fœtus
 tit.

X V.

De Abortu facto.

Quid facto abortu facientium. Abortus vero jam factus nullam admittit curacionem, dum fœtus, isque ut plurimum jam mortuus in uterum refundi nequit; verum quia mulieres a prægressa eaque sæpe adhuc durante sanguinis per uterum profusione, præsertim si secundæ in utero restiterint, valde debiles sunt, & adhuc magis debilitantur, ita ut cum sanguine animam simul haud raro emittant, a hunc fluxum compescendum & vires resarciendas oportet primo, si secundæ haberi possunt, eas extrahere; deinde ut strenue in lecto, in loco moderate frigido, conquiescant; postea ut analeptici, aquis scilicet roborantibus atque modice adstringentibus, & nominatim aqua cinamomi cydoniata, aq. melissæ, vel emulsionib. cardiacis, aut pulveribus temperantibus cum coraliis aut spec. de hyacintho; itemque tinctura coralliorum, infuso millefolii, jusculis nutrientibus, haustulo vini cumprimis rubri, reficiantur.

X V I.

De Abortu præcavendo.

Quomodo abortus præcavendus. Quando alia, quam hæmorrhagia uteri, indicia gravidis abortus metuendi aut futuri, per vehementia tormina aut dolores partus spurios, nulla adhuc apertura uteri oris interni præsentem, in ventre ac lumbis se manifestant, intus carminativa, extus aqua embryonum vel in pauperibus spiritus vini ventri cum splenio aut pane mellito calide, dum ægra super lecto decumbit imponenda, atque clysmata emollientia & carminativa una cum quiete corporis adhibenda sunt. Si hæ mulieres sunt plethoricae, etiam venæ sectio hic conducit. Si causa horum malorum est ira, temperantia & nervina cum quiete profunt; si a passione hysterica, antihysterica & antispasmodica danda. Quando a tussi vehementiori metuendus abortus, tussis curanda, contra quam

tu pilulæ de styrace vel de cynoglossò ad pauca gradatæ, proficiunt. Febrès acutæ etiam sæpissime sunt ætus causæ; ubi vero raro præcaveri potest, & cum hic maxime remediis febri debitis, ut minimè, mater fervetur, quæ alias sæpe simul cum fœtù perit. Ubi vero jam uteri adest hæmorrhagia, id est §. XIII. agendum præcepimus, est faciendum. Ad præcavendum vero, quæ jam semel aut sæpius abortum passæ sunt, abortu præcavendas, quia hic sæpissime a nimia sanguinis copia, exitum moliente provenit, graviditate facta circa finem secundi aut tertii mensis, quando foras antea abortum fecerunt, sanguis e brachio mitis, & temperantia, una cum modicis adstringentibus, ut coralliis, per aliquod tempus adhibenda; quæ postea singulo trimestri, vel in valde sanguineis, solo bimestri spatio, iteranda, servata modica diæta vitæque calefacientibus, motibus quibuscumque & studiis animi vehementioribus. Abortus etiam inquitur fit ex nimia vel gravidæ, vel fœtus debilitate; in casu causæ debilitatis investigata removenda, atque internis & externis alimentis ac medicamentis roborantibus §. XV. & modo laudatis, præcipue vero aqua cassiæ ac cinam. vel aqua embryonum interne & externe ægris his succurrere, & si morbi alii hujus debilitatis causæ sunt, eos prius vel simul curare oportet. Cachexia quædam abortus frequentioris causæ, hæc antibus, cachexiæ cuilibet contrariis, & speciatim in aquis medicatis aut thermis, quæ hic præstantissimæ sunt, curanda.

X V I I.

De Partu difficili.

puerperis *partus difficilis* potissimum occurrit, qui *Puerperarum* matris, vel obstetricis, vel infantis culpa contingere potest ac solet. *Matris culpa*, si apertura uteri facta mala. *tu rite sito, vires tamen ac dolores ad partum seu* expellendum necessarii, ei deficiunt vel prorsus non sunt, præsertim si aquis jam ruptis omnes dolores etiam robustis cessant, fere semper partus difficilis &

situs fœtus p. n. est metuendus; præterea si vitium in partibus ejus genitalibus adsit; vel si parturiens vires & nisus ad expellendum fœtum, ut quandoque ob varias causas contingit, adhibere nolit. Haud raro etiam alvus adstricta partum reddit difficilem.

X V I I I.

Si dolores & vires deficiunt.

In virium ac dolorum naturalium defectu, quando fœtus in situ dispositus est naturali, & apertura ris interni uteri adest, id quod ab obstetrice vel Medico digito est explorandum, (a) exhibenda sãpi sunt corroborantia, analeptica & leniter pellentia, ut sunt primo haustulus vini generosi, cum vel ne cinamomo aut mace, vel frigidus vel & pro nata, calidus, semel iterumque, si negotium non succedit, repetendus; vel aqua pulegii, melissæ, liliorum alborum, cinamomi, florum cheiri, lilior. corwall. perlarum &c. cum pauxillo elæosacchari aut rupi cinamomi vel caryophyllor. aut confect. alkermes incompleta; vel cum talibus aquis, si major stimulo opus est, detur apta dosis pellentis medicamenti, ut hepatis anguillæ pulvis, vel boracis, cinamomi, myrrhæ, aut antherar. liliorum alborum; nec neglecto potu conveniente, eaque post horam unam vel alteram, si partus non sequatur, semel iterumque aut sãpius repetatur: naribusque spiritus aut quæ roborantes cephalicæ subinde admoveantur, nec tandem partus sequatur. Cavendum tamen abusu aut largiori calefacientium ac pellentium liquorum usu, quia eis puerperis febres acutæ ac purpuratæ sãpius inducuntur, adeoque caute cum iis medicandum. Clysteres stimulantés etiam subinde, præsertim alvo obstructa, multum hic valent, adeoque fortiori stimulo opus, & hi non omittendi. Manus obstetricis vel Medici periti in vaginam uteri immitti & ossis coccygis repressio, multum ad dolores extirpandos & partum promovendum facere quoque potest. Ubi vero dolores veri sunt vegeti, & situs fœtus bonus, res naturæ relinquenda.

Quantum

(a) Vid. Chir. nostræ Institut. Tab. XXXIII. fig.

Quando puerpera vires ad expellendum fœtum adhibere Si eas
it, vel precibus atque exhortationibus, vel interdum, adhibere
immorigera, minis etiam ad officium suum est adi- re no-
da. lit.

X I X.

Si vitium in partibus mulieris genitalibus, & os uteri Si vi-
nimis angustum vel durum, ut sæpe solet in pri- tium in
paris, præsertim senioribus, vel nimis siccum, fo- parti-
as vel linimentis emollientibus, butyro vel oleo bus ge-
ius inungendum, vel vapore balnei relaxandum, nitali-
tisque & manibus prudenter immixtis sensim di- bus.
endum ac dilatandum, eisque fœtui exitus promo-
dus. Sin tumor, caruncula, membrana vaginam clau-
s, vel coalitus in vagina adsint, manu chirurgica
scalpello hæc curanda.

X X.

Sæpe quoque obstetrix est causa partus difficilis, præ- Obstet-
m quando gravidas parturientes præmature, tempo- tris
nimur graviditatis nondum expleto, nullis adhuc vitia.
s partus doloribus præsentibus, & cumprimis nul-
tiam adhuc facta apertura oris uteri interni, digitis
oranda, (qua sola dolores veri a falsis certe distin-
tur) ad labores impellit aut cogit: unde solum,
umma diu & frustra ad pariendum adhibita, mu-
s vires consumunt ac debilitantur, & tamen, na-
invita, suis conatibus nihil efficere possunt; eo-
ipso & fœtus & mater, culpa imperitarum ejus-
i, quam sæpissime interficiuntur, vel saltem in va-
morbos & vitæ periculum conjiciuntur. Hinc,
modo dicta partus requisita & cumprimis justa a-
ra oris uteri nondum adsunt, a laboribus potius ab-
ant, & præsertim si justum etiam pariendi tempus
um adsit, nulla pellentia danda, sed quieti ejus-
i mulieres gravidæ committantur; deinde analepti-
carminativis, aquis præsertim roborantibus §.XVIII.
aqua melissæ menthæ, embryonum, cortic. au-
vel cinamomi, cum vel sine vino, vel jusculis
n reficiantur, tempusque partus naturale ac debi-
& gravida & obstetrix cum patientia expectent;
tiumque hoc non præcipitent. Natura enim hic
duci, non cogi.

*Fœtus
vitia.*

Si fœtus caussa partus difficilis, isque vel ob caput nimis magnum, vel ob monstruosam figuram, vel quod frequentissimum, ob situm ineptum sive præternaturam, tunc medicamenta pellentia non modo sunt frustanea, sed omnino noxia: quia periculosa sanguinis profluvia, inflammationes internas & febres acutas præsertim purpuratas, ut supra jam diximus, §. XVII. sæpe concitare solent; verum plerumque fœtus tunc per pedes perita manu, sive vivus sive mortuus sit, mature ac prudenter invertendus & educendus, sicut in Institut. chirurg. nostr. Cap. de Arte obstetricia, abunde docuimus. Si vero integer haberi nequit, antequam putrescat, per frustra potius quam cautissime, ne mater lædatur, extrahendus.

Post partum quemvis laboriosum puerperis, quia plerumque valde sunt debiles, & animi deliquiis sæpe tunc afficiuntur, haustulus vini aut cerevisiæ calidæ, aquæ analepticæ §. XVIII. est exhibendus, atque, ut opus, semel iterumque repetendus.

X X I I.

De Fœtu in utero mortuo.

*Quid
cum
fœtu
mortuo
facien-
dum.*

Quando fœtus in utero mortuus est, studendum, antequam putrescat, & mulieri hoc ipso gravia mala inducat inde ejiciatur. Si tamen extra partus tempus membranis fœtus nondum ruptis, & aquis nondum confusis, moritur, naturæ res relinqui commode potest, quia fœtus membranis integris, & aquis adhuc intactis, ob aeris denegatum accessum, non putrescit: nam suo tempore sponte partus dolores veri oriuntur, quibus peregrinus ille hospes tandem expellitur. Si vero in partu moritur, postquam membranæ fœtus jam ruptæ sunt, accedente aere cito putrescit, & mala præsumma, nisi brevi emittatur, concitat. Ita si in situ naturali, & partus dolores adsunt, hic cardiacis prudenter sustentandi, donec his ipsis vel sponte, vel obstetrice juvante protrudatur. Sin vero hi dolores desint, vel etiam fœtus est in situ p. n. optimum consilium est.

t, ut quam primum vel *manibus*, vel ubi hæ non
fficiunt, *ferramentis*, de quibus videnda est Chirur-
a, educatur.

X X I I I.

De Secundis relictis.

Si post *foetum editum secundæ* non mox sequantur, *Secun-*
as tamen obstetrix tunc ut plurimum apte educere *dæ re-*
test ac debet, sed adhuc in utero hæreant, puerpe- *lietæ.*
, antequam hæc ediderit, non facile e sella dimit-
nda; sed vel conatibus & nisibus parturiendi conti-
natis eas expellere studeat, obstetrice ejectionem ma-
bus leniter adjuvante: vel si hæ sic foetum brevi
on sequantur, sicut tamen sæpe fieri solet, & partu-
enti adhuc vires sunt, *manu* mox, in uterum, *juxta*
foetum funiculi umbilicalis ad placentam usque immis-
, eaque prehensa, vacillando ac blande motitando,
utero solvenda, & si fieri potest, caute educenda:
e vero nimis arcte utero adhæreat, ut sine vi ac lace-
tione earum aut uteri inde solvi nequeat; vi haud
ellendæ aut dilacerandæ, quia *evulsio violenta* sæpif-
ne inflammationem & *gangrænam uteri* & *febres pes-*
nas & cumprimis etiam *purpuratas* hisce puerperis in-
icit; verum potius per aliquod tempus, horulam
tte dimidiam expectando, manum vero in utero, ne
ejus se claudat, servando, sponte ab utero separa-
r, ut sine vi tandem educi queat. Ita & si mox post
rtum nimis debilis sit puerpera, prius potu, jusculo
l aquis roborantibus, refocillanda, & quies aliqua
si concedenda, donec vires aliquas recuperaverit, ubi
nc, si sponte interea sub doloribus post partum non
odierint, manu & digitis blande motitando solven-
& protrahenda. Sed si foetu nato *secundæ solæ* ob
operitiam obstetricis intus remanserint manumque mox
ea, sicut fieri debuisset, eductæ non sint, uteri-
æ os jam denuo clausum sit, ut manui aditus
on amplius pateat, eadem *medicamenta*, *quæ menses*
et partum promovent §. XVIII. (quia hæc & secun-
as pellunt) & hic adhibenda, ubi cumprimis etiam

pilulæ Beccherianæ singulo vesperi sumptæ valde profunt, eisque secundinæ emolliendæ : id quod subinde feliciter adhuc obtinetur ; sæpius vero ob neglectam earum maturam extractionem in utero putrescunt, febres aliaque mala accedunt & puerperæ inde moriuntur, vel minimum in istiusmodi febres, præsertim inflammatorias & purpuratas, incidunt periculosissimas.

X X I V.

De Doloribus post partum.

Dolores post partum. Si doloribus post partum corripitur puerpera, qui sæpe vehementes sunt, & vel a parte secundarum vel intergris etiam secundis relictis, vel a magnis frustis sanguinis in utero concretis, vel a partu difficili prægresso vel a lochiis non rite succedentibus, vel etiam a flatibus concitari solent, præsertim si venter mox a partu fascia idonea vel longo mantili, non probe fuit ligatus vel frigori qualicumque se exposuit, ligato prius decenter ventre, conducit potus diluens, aqueus, calidus, ut thea cum croco, infusum flor. chamomillæ vel seminis carvi, loco theæ haustum, vel juscula cum semine carvi cocta, vel flores chamomillæ aut absinthii aut flav. cort. aurantiorum ʒj. cum jusculo calido aut cerevisia cocti ac hausti, quod primum Foresti fuit specificum, vel & essent. florum chamomillæ, essent. cortic. aurant. cum spiritu nitri, vel essent. carmin. Wedelii, aliaque ejusmodi cum infuso aliquo prædictorum calido sumpta, corpore contra frigus probe defenso. Oleum amygd. dulc. ad ʒj. vel ʒij. ex vehiculo calido subinde usurpatum, multis optime quoque conducit. Si calor p. n. simul sentiatur, detur sæpius pulvis temperans, ex lap. cancr. cinnabari, nitro & croco; vel potiuncula temperans, non omissis in malo vehementiori pro re nata, clysmatibus emollientibus & carminativis, ut & sacculis carminativis, aut vesica aqua vel lacte calido, in quo flores chamomillæ cocti repleta, ventri imponendis. Ceterum præstat primis diebus alvum esse obstructam, lochiis rite fluentibus quam nimis laxam, quæ valde hic suspecta est adeo-

leoque & purgantia fortiora hic vitanda : blanda tamen, ut pilulæ Beccherianæ ac similes non nocent. Haud raro etiam hi dolores oriuntur post violentam secundarum ex utero evulsionem, ita ut uterus inde inflammetur, & febres acutæ pessimæ hac ratione induuntur. Sed de his mox §. XXVI. plura.

XXV.

De Lochiorum vitiiis.

Quomodo lochiorum nimius fluxus eorumve suppressio tractanda, Cap. VIII. & IX. jam docuimus. Lochia
Hoc solum hic adhuc addo, quod si cum febre acuta. peccantia.
lochii fluant cum doloribus, hæc ut plurimum uteri evulsionem, præsertim a placenta vi evulsa, indicare, nam inflammatio, gangræna uteri & mors sæpe sequuntur.

XXVI.

De Febris acutis Puerperarum.

Quando vero ex suppressis lochiis, ob frigus admixtum, vel animi affectus, ut sæpe fit, vel & ex evulsis secundarum vim, febres acutæ, purpura puerperarum, inflammatio febris miliaris, inflammationes internæ, ut pleuritides, peripneumonia, phrenitides, anginæ, hepatis, ventriculi, uteri, mammarum, aliarumve partium nobiliorum inflammationes, oriuntur, conducunt, ut in aliis febribus acutis & inflammationibus, pulveres temperantes, resolventes, diaphoretici, acido citri saturati, cinabarini, nitrosi, essentia diaphoreticæ, ut scordii & opii, diluentia aquea, potus largus aqueus, potiuncula diaphoreticæ & moderate cardiacæ, aliaque in febribus continuis & inflammationibus internis supra commendata. Sæpius etiam lene emeticum ex hypecacoan-
Febres acutæ
si causæ, ut ira prægressa, aliæve id exigant, uti-
ter exhibetur. Clysmata quoque ano, fomentationes
per ope vesicæ aqua vel lacte calido repletæ, partibus
tenditibus aut inflammatis, vel cataplasmata in uteri
inflammatione ad gangrænam præcavendam ex rad. præ-
fer-

sertim symphyti, sigilli Salomonis & althæa, in lixivio fortissimo aut vino coctis, eidem calide sæpius applicata profunt (a); atque in *plethoricis*, præsertim *ubi lochia suppressa* sunt, in principio *sanguinis missio in pede* est instituenda, & lochia leniter pellentia, ex succino aut myrrha temperantibus sunt addenda.

X X V I I.

De Febri lactaria.

Febris lactaria. *Febris lactaria*, quæ circa tertium vel quartum diem, lacte ad mammas congesto, oriri & per unum alterumve diem durare plerumque solet, vel sponte solius naturæ actione, ope sudoris transit, vel diaphoreticis quoque & diluentibus aqueis, præsertim calidis, modo §. XXIV. indicatis, ac regimini diaphoretico ut plurimum cedit, præsertim si simul diæta servatur tenuis, & infans mammis sæpius admoveretur. Quando autem puerperæ non lactant, tenui diæta & diaphoreticis res potissimum est expedienda, lac simul, si quod adest, leniter subinde, ne subsistat & coeat exprimendo.

X X V I I I.

De Mammarum inflammatione.

Mammarum tumor. *Mammarum tumor & inflammatio*, qui a lacte stagnante, primis plerumque post partum diebus, immo & haud raro tardius oriri solet, interne, iisdem remediis diaphoreticis, quæ §. XXIV. commendata sunt externe vero, resolventibus, maxime spiritu vini cum linteis, calide sæpe applicato, vel empl. diachyl. simpli vel

(a) Hoc cataplasma in Actis Nat. Cur. vol. II. pag. 329. & a Cel. Werebosio in doctiss. suis obs. de febril. pag. 294. contra uteri gangrænam valde laudatur; produm est tamen quoque hic cataplasma ex flor. chamomilæ, meliloti & sambuci in vino vel lacte coctum.

vel de sperm. ceti, addita camphora, aliisque in Chirurgia (a) laudatis, sæpe resolvitur, cumprimis si lac ubinde vel ab homine vel caniculo exsugitur, vel manibus leniter exprimitur. Si vero inflammatio jam ad *suppurationem* spectat, tumor quantocyus emollientibus, vel cataplasmatibus, vel emplastro diachylo cum gummi- nis, maturandus, postea aperiendus, pus ejiciendum, abscessus unguento digestivo depurandus, & tandem balsamicis, ac nominatim balsamo peruviano aut de Meccha, rursus consolidandus.

X X I X.

De Papillis dolentibus & fissis.

Papillæ dolentes & fissæ lactantium curantur vel bal- *Papillæ*
amicis, ut oleo ovorum & ceræ, vel mucilag. sem. *fissæ.*
sydon. sæpe illitis; vel sæpius insperso pulvere gummi
arabici; vel aqua Reginæ Hung. superimposita, aliisve
in Chirurgia nostra laudatis.

X X X.

De Lactis abundantia & defectu.

Lactis abundantia nimia, præsertim ubi foetus mor- *Lactis*
uus, vel puerperæ lactare nolunt, minuitur victu te- *vitia.*
tui, parco, sudoris largi tolerantia, eaque lenibus su-
loriferis sustentata, itemque purgantibus ac lochia pel-
entibus, ut pilul. Beccher. & Elixir. propr. quibus ad-
li potest lap. galactites in dorso appensus.

Defectus vero lactis curatur victu humido multo ac
bene nutriente, ut omnis generis bonis sorbitionibus &
usculis, lacte, præsertim cum flor. sambuci cocto, ovis
orbilibus, gelatinis, emulsionibus, cerevisia calida cum
vitellis ovorum & saccharo, stomachicis quoque & di-
gestionem promoventibus atque cumprimis pulveribus

ex

(a) Cap. de Mammarum inflammatione.

ex *seminibus carminativis*, anisi, foeniculi, carvi & saccharo, sæpius assumptis; *frictione* quoque *mammarum* frequenti, appenso lapide galactite, aut mercurio vivo ad mammas: quæ ultima tamen, si quid præstant, stimulo magis siue blanda irritatione ad mammas, quam alia quadam occulta facultate, id efficere videntur.

X X X I.

De Urinæ incontinentia post partum.

Curatio. Hoc malum a læsione, laceratione, debilitate, relaxatione vel paralyfi cervicis vesicæ oriri solet, & malum est molestissimum atque simul ut plurimum per medicamenta curatu difficillimum. Interea tamen *roborantia*, & *traumatica* principio sæpe aliquid proficiunt, ut infusa herbarum traumaticarum, Essent. traumaticar. Wedel. tinct. terræ japon. chinæ & cascarillæ, immo & tincturæ martiales; item externe *fotus herbar.* illarum cum vino rubro, vel aqua ferrariorum facti, sæpius applicati. *Balnea* etiam & *cumprimis thermarum*, vel ex *aquis martialibus* parata, egregia sunt; quæ tamen simul & interne hoc in malo usurpari cum fructu possunt. Quod si vero hæc omnia parum sint, *machinis chirurgicis* vitium hoc adhuc leniri sæpe potest: qua de re videantur Instit. chirurgicæ.

X X X I I.

De Mulierum morbis chirurgicis.

De ceteris morbis mulierum, quæ manum vel scalpellum chirurgi requirunt, quales sunt *vagina uteri concreta*, *procidencia uteri*, *partus difficilis ex situ fœtus p. n. fœtus mortuus*, *secundæ fœtum sponite non sequentes*, *calculus vesicæ*, *cancer mammarum*, aliisque in chir. Instit. nostris satis prolixè egimus, sicut etiam jam supra Cap. XII. de Cancro medice tractando præcepimus.

MONITA PRACTICA

Circa Morbos Mulierum.

1. In morbis mulierum semper quærendum, *an menses rite fluunt*, & secundum horum constitutionem curatio est instituenda.

2. In *fæminis extra matrimonium viventibus*, & de pudicitia aliquo modo suspectis, cavendum, ne, dum de mensus obstructione conqueruntur, & consilium desiderant, eis forte gravidis per medicamenta pellentia, vel venæ sectionem in pede abortum concitemus.

3. Idem observandum in *mulieribus gravidis*, ne modo dictis abortum ipsis procuremus.

4. *Gravidis ad abortum pronis*, bona diæta, & missio sanguinis matura in brachio, magna ad eum averendum sunt remedia.

5. *Ad roborandum fœtum & gravidam debilem*, conducit subinde haustulus vini generosi, vel aquæ melissæ vel cinamomi cum vino, aut embryonum, cochlearum vel alterum; atque in hysteriis, aquæ hysteriæ vel epilepticæ Langii.

6. *Contra diarrhœam & tormina gravidarum*, a quibus abortus sæpe metuendus, eadem modo dicta, & vesperi parum theriacæ aut diascordii conducunt.

7. *Tussi gravidarum*, præter alia contra tussim laudata pectoralia, M. P. de styrace paucis granis noctu data, medetur.

8. *Dolores partus veri* a spuriis apertura oris uteri interni optime distinguuntur.

9. *Parturientibus nulla pellentia danda*, nisi os uteri internum percipitur apertum, & fœtus sit in situ naturali; alias nocent.

10. *Frigus quodcumque & parturientibus & puerperis est pestiferum.*

11. *Si fœtus per tres quatuorve dies in partu hæret*, ut plurimum mortuum est, præsertim si fœtet, aut cuticula a cute recedere observatur.

12. *Puerperæ, ut graviter vulneratæ tractandæ*: hinc quie-

quiescant per 8. vel plures dies in lecto, tenuem servant diætam, vitent calefacientia & carnes, primis præsertim diebus: ita a multis morbis se præservabunt. In fine lenis purgatio conducit.

C A P U T XVIII.

De Morbis Infantum ac Puerorum & I. de morbis a meconio retento, torminibus, vigiliis, ictero, epilepsia, &c.

I.

Infantū recens natorum mala a meconio.

Infantes recens nati, ob meconium, pituitam, aliasve fordes in primis viis hærentes, nisi mature ejiciantur, sæpe torminibus sive doloribus ventris & inde concitatis perpetuis fere clamoribus, singultu, ictero, vigiliis, inquietudine, pavore, terrore, & sæpe convulsionibus atque epilepsia ipsa corripiuntur: quibus malis multi infantes, nisi tempore ipsis succurramus, pereunt: quapropter, quia omnia hæc mala plerumque ab eadem hac causa dependent, eadem etiam potissimum ratione, expurgando scilicet retentum hocce meconium, curari sæpe possunt. Ad quod vero expellendum, egregie conducit primum illud lac tenue sive aquosum puerperarum recentium, si ipsæ lactant infantem, quod *colostrum* appellatur, si illud infantibus sugendum conceditur, quod instar feri lactis ad illud expurgandum optime confert; vel si hæc mulieres non lactent, dum, ut ditiores solent, vel lactare nolunt, aut non possunt, jejunium duodecim circiter horarum his infantibus convenit, & interea *semel iterumque exhibitum lene alvum laxans*, ex pulveribus jalapæ gr. ij. aut rhabarb. gr. iij. aut iv. cum vel sine granulo, pro malorum diversitate, mercurii dulcis, vel in forma pulveris, vel cum sirupo rosarum solutivo, vel sirupo de manna, aut de cichor. cum rhabarb. aliove simili, in forma linctus. Vel horum loco *vinum dulce* etiam cum melle dari apte potest, quod infantes quoque purgare, atque sic meconium evacuare solet; & si hæc forte non sufficiant,

nt, atque infantes clamare pergant, auri fulminan-
gr. j. & clysmate e sero lactis, vel decocto avenæ;
m melle & sapone parato, harum sordium exitus est
omovendus.

Nonnullis in locis in hunc scopum infantibus olei
ygdal. dulc. ʒss. cum pauxillo sacchari penidii exhi-
at; cui vero priora, tamquam valentiora, præfero.

I I.

De Morbis Infantum ab alvo obstructa & flatibus retentis.

Si infantibus post hæc successu temporis, ut sæpe *Mala*
atingit, *fæces alvi fiant duriores*, atque inde *alvi ob-* *ab alvo*
ctio & flatuum retentio ejusmodi, qualia modo enar- *obstru-*
imus, concitet symptomata, vel profunt clysmata *cta.*
ollientia & carminativa, vel & eadem (§.i.) laudata
media, donec alvi sufficiens sit facta evacuatio, &
tea subinde ad *acre sive acidum a lacte corrupto* or-
n, obstructionemque haud raro producens, corrigen-
n atque absorbendum, pulvis aliquis absorbens ex
chis vel lapidibus cancrorum, aut matre perlarum,
n pulvere feminis anisi, quod hic egregium, mixtus,
dica copia ipsis sæpe porrigatur, quibus varia &
fima illa mala, *ab acido lactis corrupti* plerumque
venientia, ut plurimum optime curantur. In malo
ementiori etiam matres lactantes, vel nutrices, ex-
gari & postea medicamentis acido & flatibus con-
iis, quæ modo commendavimus, aliisque morbo
erfis uti, atque ab acidis in victu quoque, ut & a
ulentis cibis abstinere debent. *Vitanda vero* quam
time in infantibus, & præsertim his in malis sunt
ta, (nisi magna ob doloris vehementiam urgeat
essitas, & præmisso clysmate aut purgante) itemque
la quæcumque, quæ etiam a matre lactante vel a
rice, ut modo diximus, tunc serio sunt fugienda;
a omnibus in morbis infantum, tam ratione victus
m medicamentorum, simul ad nutricem est respicien-

I I I.

De Morbis a lacte corrupto.

Morbi a lacte corrupto. Infantes præterea, quia lac fugunt, aut & simul ut multis in locis mos est, cibis vel pultibus nutriuntur lacteis, a lacte in ventriculo ob quamcumque causam corrupto, coagulato & acido reddito, & modo diæta & varia adhuc alia sæpe patiuntur symptomata. *fæces enim alvi fiunt virides, acres, acidum spirante & subsequuntur inde frequenter vomitus, tormina ventris sævissima, alvi fluxus, inflationes abdominis, anxietates, clamores, metus suffocationis, convulsiones, pavores, epilepsia, aliaque:* quæ vero mala optime rursus curantur, primo per evacuationem & postea per correctionem cruditatis sive materiæ corruptæ, acidæ. Illud fit 1. idoneis *purgantibus* §. I. eisque si opus per intervalla repetitis; 2. medicamentis *acidum absorbentibus*, ut terre s & *carminativis* blandis, modo §. I. laudatis; 3. *clysmatibus* antea §. I. quoque jam indicatis; 4. *oleo amygdalarum dulcium* interne subinde dato; 5. *oleis & sacculis carminativis* externe abdomini adhibendis. Quibus ipsis etiam *epilepsia* in hac ætate & ab eadem causâ tunc sæpe proveniens, optime præstigiatur; quam ob rationem *pulvis Marchionis* forte *specif. cephal. Mich.* cranium humanum, ungulæ alcis aliaque adhuc multa acidum destruentia sive absorbentia, tantum inter medicamenta antepileptica nomen adepta sunt, quia ob virtutem acido contrariam, illi in his casibus destruunt, præsertim si pulveribus prædicti *pulvis lumbricorum terrestrium* admiscetur, & sic, destructa causâ, etiam curatur epilepsia: atque hanc causam *spiritus C. C.* ad gutt. iij. iv. v. quoque haud raro valde prodest, & inter præcipua antepileptica habetur.

I V.

De Pavore in somno.

Speciatim pavores infantum prodromi sæpe sunt epile- Pavoris
 æ, atque convulsivi motus, a causa irritante, in- curatio.
 cti esse videntur. Oriuntur sæpissime in somno, at-
 que valde suspectum est symptoma; si tamen in vigi-
 liis incidunt, adhuc peioris esse solent indolis. In
 minoribus infantibus ut plurimum a lacte corrupto & aci-
 de vehementiori in ventriculo mihi oriri videntur; in
 maioribus vero etiam a vermibus induci possunt.
 Quando igitur a lacte corrupto, iisdem remediis, quæ
 III. modo commendavimus, curanda; sin vero a
 vermibus, hi ut mox infra §. XXIX. & seq. docēbi-
 mus, tollendi.

V.

De Vigiliis nimis Infantum.

Hæ vel a torminibus, vel ab alvo obstructa, & fla- Vigilia-
 tus ac doloribus inde inductis, ortum ducunt; & si- rum.
 cuti sanitas infantum præcipue ex bono ac tranquillo
 somno dijudicatur, ita contra ex perpetuis vigiliis,
 stratu & clamoribus eos ægrotare haud temere cre-
 dere possumus. Vigiliæ igitur vel ex corrupto lacte in
 ventriculo & intestinis oriuntur, vel si alvus simul est
 obstructa, etiam sæpe a flatibus. In his malis igitur
 e omnibus semper alvus aperta, an clausa sit, vi-
 dendum, & si clausa vel adstricta, clystma iis primo
 deinde adhuc purgans exhiberi debet, prout supra
 diximus §. I. & III. postea, purgatione facta, ad
 simoniam lactis corrigendam, & flatum dissipandos,
 sorbentia & carminativa antea laudata §. III. ac
 speciatim pulv. sem. anisi sæpe danda, adhibitis simul
 æthere ventri oleis carminativis; & nisi tormina hinc
 manant, ut quiescere possint, clysteres repetendi.
 Aliisdam post purgationem oilum amygdalarum dul-

cium ad zij. aliquoties datum egregie benefacit, & tormina, vigiliarum causas, demulcet; in malo graviore, si hæc parum sunt, & convulsiones metuuntur, aquæ epilep. Langii pauxillum, vel spiritus salis ammoniaci anisatus, vel spir. C. C. vel liq. C. C. succin. solus, aut cum pauxillo ess. castor. mixtus ad guttas V. vel VI. subinde est exhibendus. Ad opiata vero & theriacalia non facile accedendum, nisi necessitas tandem ea urgeat. Nutrices sibi caveant ab acidis & flatulentis, itemque a frigore: e contrario purgantia & carminativa, ut essent. carmin. vel spiritus salis ammoniaci anisatus & antispasmodica, potius iis sæpe sunt porrigenda.

V I.

De Singultu infantum.

Curatio
singul-
tus.

Hoc malum etiam sæpe vehementer infantes affligit ac debilitat, atque ex pituita acris & potissimum acida circa ventriculi orificium superius hærente, atque hoc una cum diaphragmate per consensum irritante, provenire videtur. Ad hoc vero acre corrigendum atque hac ratione singultum tollendum, absorbentia terrea sæpius data conducunt; & speciatim ex Joeli commendatione, in quovis singultu pulv. ex corall. præp. & C. C. usto, addito vel pulv. anisi aut ol. anisi vel caryophyllorum, aut macis gutt. j. vel ij, vel & in malo vehementiori, circa noctem pauxillo theriacæ, egregie prodest. Quod si vero malum sit pertinacius, pituita illa acris, rad. hypecacoann. gr. j. aliove idoneo emetico ejicienda.

V I I.

De Aphthis.

Aphthæ
quid.

Aphthæ sunt crusta quædam albicans, os vel ex parte vel totum intus, labra scilicet, gingivas, genas, linguam, palatum & fauces obducens immo per cæso-
pha-

lagum & intestina omnia ad anum usque sæpe se extendens, ubi vero periculosissimæ sunt & infantes eorumque consumunt. A multis cum *Celfo* pro ulcibus habentur, atque in adultis quoque haud raro servantur. *Earum natura & causa* mihi nondum satisfactæ esse videntur; interea tamen a vitiosa morum constitutione eas provenire verisimile est. *Etis nutricum vitio* hoc malum plerumque adscribitur; sed vidi infantes, qui dum matres lactare non poterant, neque nutrices ipsis dabantur, pituita potu & cibis mollissimis alebantur, & tamen aphæris correpti ac mortui sunt. Linguae motum, lactis mammis suctionem & deglutitionem difficilem reddunt; hinc infantes mammas sugere recusant, & inleteri sunt; forte ob dolores, quos infantulis movent. *Color p. n.* etiam ac *respiratio aucta* in eis ut plurimum quoque percipiuntur, qui de calore interno sive febris testantur. Si paucæ sunt, sæpe adhuc tolluntur; si copiosæ, difficile sanantur.

V I I I.

Interea tamen in curatione fervoris humorum & a- Curatio.
moniae correctioni atque evacuationi erit studendum, cum in finem infanti dari potest sirup. de cichor. & rhabarb. ℥ij. cum pulv. jalapæ gran. ij. vel iij. & mercur. dulc. gr. j. aut ij. Postea quotidie *manu animæ rhabarb.* exhibeatur cochleare unum parum, & postea *pulveres & mixtura* vel & julepi *aperantes* pro febricula & calore p. n. interno modo porrigendi.

Externe commendatur *raparum* in aqua decoctarum *us* expressus, addito tantillo sacchari vel mellis, tertim rosati, quo ope linteoli ac digiti aliquo in die os intus abstergatur, quod & aqua salviae rosarum, addito melle, commode fieri potest; aut melle rosarum solo, vel cum sirupo mororum mixto cui parum spiritus vitrioli, ut efficacius reddatur, addendum, sæpius mundetur; vel *melle rosarum* mucine *seminis cydon.* soluto, ope penicilli vel linteoli probe extergatur. *Oleum myrrhæ* per deliquium,

addito pauxillo sacchari vel mellis, eodem modo usurpatum, quandoque benefacit.

Nutrici, præmisso purgante, *anima rhabarbari* largiter danda ac simul *absorbentia*, acido citri vel aceto saturata, itemque essentia alexipharmaca ratione fabriculæ cum infuso theæ aut cum cerevisia tenui exhibenda.

I X.

Aphthar. Adultis, qui aphthis laborant, interne quoque *an*
curatio *ma rhabarbari*, essent. trifolii fibrini, tinctura antimo
in adul- nii aliaque diaphoretica & antiscorbutica sæpius dan
tis. da. Externe, pro gargarismate & ore colluendo ipsi
conducit *decoctum veron.* vel alterius similis herbæ vul
nerariæ cum vino, addito melle rosato, & pauxilli
spiritu vitrioli ad lenem acorem; vel *serum lactis* cum
lap. prunellæ, & postea partes affectæ melle rosato cum
spiritu vitrioli largiter imprægnato sæpius illinendæ.
Sunt qui os sæpe his in malis *colluendum* vel abster
gendum suadent *aceto* vel simplici vel *destillato*; a
melle rosato imprægnato, quod etiam quibusdam be
nefacit.

X.

De Intertrigine infantum.

Intertri- Est *excoriatio partium genitalibus vicinarum, ingu-*
ginis cu- num præcipue ac *scroti*, ut & in rimis sive plicis co
ratio. li, sub axillis aliisque subinde locis, ab *acrimonia urinæ*
ac sudoris producta, infantibus ingratum pruritus, im
mo dolores, clamores, vigilias atque inquietudines
concitante. *Ad hoc vitium tollendum*, partes ita affe
ctæ abluantur aliquoties in die aqua tepida, & po
stea inspergantur pulveres exsiccantes, ut farinæ ve
latis in sartagine ferrea parum tostæ & probe exsic
catæ; vel cretæ, C. C. usti, lap. alabastr. & cum
primis tutiæ, lapid. calaminaris & cerussæ, qui ne
dulo ex linteo paulo laxiori inclusi locis affectis sæp
inspergantur.

Si malum est gravius atque vera exulceratio adest

præ-

ædictis pulveribus addatur aliquid sacchari saturni ,
 l loco horum unguento de cërussa camphorato par-
 læ inungantur. Ita etiam si parum *vitrioli albi*
 aqua simplici vel plantaginis solvatur , eaque inter-
 go ulcerata aliquoties abluatur , egregie eam ficit
 sanat.

X I.

De Naribus obstructis infantum.

Nares infantum sæpe a *muco crasso* ita obstruuntur ,
 difficulter *respirare, sugere ac deglutire* queant ; cum
 has actiones rite perficiendas nares apertæ & aeris
 per eas transitus requirantur : hinc infantes *inde*
de fiunt inquieti & clamant, quia hoc ipsis est per-
 m molestum ; ad quod vero *vitium curandum*, præ-
 idoneum *purgans*, revellendi causa datum , solutio
 ioli albi gr. ij. vel iij. in aquæ majoranæ ꝑ. post
 ationem cum linteolo naribus per intervalla immit-
 ar, vel loco hujus

℞. aq. majoran. ʒj.

vitriol. albi

elater. ā gr. ij. M.

odem modo applicetur : quæ mixtura *liquor errhi-*
est Wedelii, humores viscidos sine sternutatione e-
 ie liquans & educens . Si simul externe oleum
 gdal. dulc. oleo destillato majoranæ imprægna-
 , *radici & alis nisi illinitur*, resolvuntur inde
 es narium , & respiratio tandem libera rursus red-
 r.

X I I.

De Achoribus, Favis, Crusta lactea.

intelliguntur his nominibus *exanthemata scabiosa ca-* *Vitia*
 in infantibus, & si ea sunt in facie , speciatim *hæc*
 a *lactea* appellari solent, quæ impurum & acrem *quid*
 uinem pro causa habere videntur , quem natura *sint*.

hic expellit, & qui, antequam erumpit, sua irritatio-
ne haud raro epilepsiam inducit. *Subinde a vitio ma-*
tris vel nutricis oriuntur, vel ab horum prava diætâ
vel etiam a victus erroribus ipsorum infantum, præser-
tim jam paullo adultiorum, quando pluribus alimen-
tis, & sæpe mali succi, obruuntur, quam commodè
concoquere & subigere possunt. Si hæc mala vel spon-
te vel ineptis remediis, præsertim externis repellent-
bus, tractata recedunt, aut nigricantem induunt colo-
rem, res est periculosissima: quia, infantes gravibus
malis ac præcipue asthmate vel epilepsia corripiuntur
& inde ut plurimum moriuntur.

X I I I.

Curatio. In *curatione* igitur hic naturæ ductum sequi deb-
mus: adeoque præ omnibus vitandum, ne medicamen-
ta externa, præsertim repellentia, adhibeantur; se-
potius internis agendum, quæ sanguinem corrigunt &
temperant, noxiumque per diaphoresin sensim expe-
lunt. Hinc, *expurgatis prius primis viis,* pro hoc sco-
po exhibenda & nutrici & infanti essentia alexiphar-
maca, vel ess. fumar. lignorum & tinctura antimonii
bis mane, & a meridie pulveres aliquoties ex lapid-
bus cancrorum vel conchis præparatis cum antimonii
diaphoretico, succino & cinnabari; quibus, si suspi-
cio impuritatis venereæ subest, mercurii dulcis exigua
portio addenda, interpositis subinde lenibus purgant-
ibus, præsertim si alvus non respondet. *Quando hi-*
mala retrocedere videntur, vel re ipsa jam retrocess-
runt, aut nigrescunt, quod pestiferum esse modo dix-
imus, liquore C. C. succinato ex vehiculo calido sæpè
assumpto, dataque essentia alexipharmaca nutrici, effi-
ciendum, ut rursus expellantur; ubi simul *frigus evi-*
tandum, & infantes calore probe fovendi, donec ru-
sus prodeant.

X I V.

Externe omnia omittere ac negligere præstat, quæ
incongrua, & præsertim unguenta *e sulphure* vel me-
curio parata, aut lotiones repellentes ac frigidas adhi-
bere: quia his ad viscera interna repelluntur, & vi-
cers vel alii morbi graves his ipsis concitantur.

tamen

men tandem, mundantibus internis diu usurpatis, eterne aliquid desideratur, *oleum ovorum recens*, vel *styrum recens* non salitum, vel *medulla ossium vitulorum*, vel *cremor lactis* ad emolliendas crustas & ulcera sananda adhiberi optime possunt. *Malum saepe est* *urtinax*, atque patientia tunc & parentum & Mediorum indiget; *nutrici* vero tunc subinde purgantia loque, quotidie autem per satis longum tempus alexipharmaca & sanguinem purificantia danda sunt, visque bonum regimen servare debent.

X V.

De Tussi & Respiratione difficili cum catharro.

Ex frigore vel pravae aeris constitutione infantes saepe malis afficiuntur, quibus serum faucium, bronchiorum, & asperae arteriae vel acrius vel spissius redditur, quae haec ipsa symptomata concitantur; quibus plerumque etiam *coryza*, immo & *febricula* juncta sunt. Igitur a frigore & transpiratione laesa plerumque untur, in curatione studendum ut abundans materia per alvum primo educatur, postea transpiratio phoreticis restituatur, & *lymphæ* vel *sacris* vel spissioribus corrigatur.

X V I.

Igitur primo idoneum purgans & infanti & nutrici, desertim si & haec tussi laboret, detur; deinde infusionum specierum pectoralium cum saccharo canto, ut thea, liquae aliquoties in die exhibeantur; praeterea Elixir. pectorale Wedelii, vel spiritus salis ammoniaci anisati, vel utraque mixta, vel & essentia alexipharmaca apta copia cum hoc infuso assumantur. His interantur subinde pulvis pectoralis ex sperm. ceti recti (quod hic prestantissimum) pulv. bez. aut Marononis cum flor. sulphuris, vel etiam lapid. tantum cerorum, rad. irid. florent. & saccharo canto paratus, qui vel cum thea vel aqua aut julepo pectoraliendus. Aut loco hujus pulveris linctus quoque pectoralis

ralis ex sperm. ceti, oleo amygdalarum dulcium recente, liq. C. C. succinato & sirupo pectorali confectus sæpius exhibeatur. In *graviori* pectoris *catarrho* *asthmate* & *ronco pulmonis*, spiritus salis ammoniaci vel liquor C. C. succinatus solus, repetitis sæpe vicibus, ad guttas V. VII. vel plures datus, haud raro huic malo tollendo sufficit; qui & *nutrici* tunc optimo cum successu exhibetur. Immo in *nimia pituita copia* in pulmonibus, & inde nato *suffocationis metu* etiam lene *emeticum*, ex tartari emetici, vel sulphuris antimonii quarta parte gr. valentissimum est, & prodeploratis fere habitos ex orci quasi faucibus jam sæpius eripuit; cui *clysteres* quoque deinceps apte subiungi possunt. *Pulvis* denique *feminis anisi* & iridis florent. cum saccharo canto ac pauxillo sperm. ceti recentis, cui & olei anisi guttæ aliquot commode admiscuntur, sæpe exhibitus, hic etiam valde prodest.

X V I I.

De Diarrhœa infantum.

Causa
& cura-
tio.

Hac in diarrhœa, æque ac in adultorum, natura aliquid supervacanei, vel acris & noxii, quod intestina nimium irritat, expellere satagit. Oritur hoc vitium sæpe a *nimia aut frequentiori lactis ferosioris & acrioris* suctione; vel *ob læsam a frigore transpirationem*, atque ad primas vias translationem. Ergo hi alvi fluxus minime mox adstringentibus aut opiatibus cohibendus, sed potius vitiatorum humorum excretio evacuantibus primo juvanda ac promovenda, deinde roborantia & modice adstringentia his subjungenda. Utriusque scopo, ut in diarrhœa & dysenteria adultorum Cap. XIII. §. X. & XIV. *rhabarbarum* vel in pulvere, vel in essentia, apta dosi datum, omnium optime convenit, & cum primis essentia sive *anima rhabarbari*, per aliquot dies mane & circa vesperam danda, donec alvi fluxus remittat. His interponi apte possunt pro acrimonia, quæ hic ut plurimum a lacte corrupto acida est, corrigenda, *absorbentia terrea*, &

præ-

æsertim subadstringentia, ut corallia, C. C. usum, ystall. mont. præp. &c. quæ simul tunc diaphoreticum virtutem exerunt, quæ & *nutrici exhibere* consilium est. In malo graviore, ubi hæc parum sunt, vel pulveribus illis aliquot grana pulveris *corticis cascarillæ* di, vel decoctum hujus aut etiam *corticis peruviani* recte, vel extracti horum part. j. in aquæ plantaginis, menthæ aut cinamomi cydoniatæ part. iv. soluti, ad tinas l. lx. vel cochlearis unius parvuli singulo trihorio vel quadrihorio danda. *Externe balsama stomachica* oleo nucis moschatæ expresso, oleis destillatis carnativis & stomachicis imprægnato, ventriculo totius abdomini calide sæpius inungenda. *Nutrix* a frigore ac nimio potu abstineat, atque modica ac temperante utatur diætâ.

X V I I I.

De Urina suppressa, ejusque difficultate.

Urinæ difficilis excretio aut ejus omnimoda *suppressio* *Causæ* infantibus (a) ab humoribus viscidis, lactis vel aliorum rerum vitio ortis, & renes obstruentibus, vel *effectus.* vesicæ tono relaxato, vel sphincteris ejus spasmodica constrictione oriri videntur: unde dolores, convulsiones & alia mala sæpe proveniunt. Quare humores spissi ac viscidi incidendi & fluxiles reddendi, portio vesicæ laxatus roborandus, atque ad constrictionem citandus ac stimulandus, & spasmodica cervicis vesicæ constrictio antispasmodicis & emollientibus relaxanda.

X I X.

Præstare hoc possumus primo *salibus mediis*, ut tartaro vitriolato, arcano duplicato, &c. vel per se ad ℥. datis, vel cum *semine lycopodii* æquali copia, aquam diuretico & antispasmodico in pueris præstantissimi.

Curatio.

(a) De adultorum jam supra p. 251. egimus.

tissimo, quæ ex aqua petroselini, cheræfolii, vel alkekengi data, & si opus, post temporis intervallum repetita, optime profunt: atque his subinde haustulus solius aquæ petroselini aut ceterarum laudatarum aquarum interponendus, quibus haud raro solis sæpius usurpatis urinæ fluxus restituitur. *Emulsio ex amygdalis amaris ex nucleis persici* cum aqua petroselini aliave simili facta, est quoque hic valde egregia. *Pubis regio* infantibus his frequenter *calide fricetur* oleo scorpionum, oleo juniperi, succini & anisi roborato, eique postea *cataplasma ex cepis assatis* superimponatur calide; vel ex cepis, allio, herba cheræfolii & petroselini; quibus etiam oleis renum regio, quando forte caussa in his latet, calide fricanda; atque hæc etiam remedia in calculis parvis expellendis, valde proficua sunt. Si denique hæc omnia parum sunt, & symptomata urgent, cathetere apto urina e vesica est emollienda; id quod longe facilius fit in puellis quam pueris. Plura de *urina adultorum suppressa* vid. supra Cap. XII. §. XIV. p. 201.

X X.

De Atrophia sive Tabæ itemque Rhachitide infantum.

Causæ Hi morbi ut plurimum apud infantes *ex chylo* & *sedes.* *sero viscido*, in mesenterio congesto, glandulas mesenterii obstruente, atque ne chylus ad sanguinem rite pervenire queat, impediende, oriuntur: hinc venter partim a *tumore glandularum mesenterii obstructarum*, partim a *laxitate intestinorum*, a multa pituita indurata, plerumque vehementer intumescit, reliquæ autem *partes tabe quasi consumuntur*. Quoniam vero de his morbis supra pag. 150. & seq. jam actum est, plura hic de iis non proponemus.

XXI.

De Dentitione difficili.

Mense sexto, septimo & sequentibus dentes ut plurimum infantibus ex alveolis suis per gingivas prodire incipiunt; ubi autem sæpe ob dentitionem difficilem, præsertim quando dentes canini erumpere debent, occurrunt, gingivarum tumor & inflammatio, unde dolores, lacrimæ, vigiliæ, febres, convulsio, epilepsia & sæpe mors consequuntur. Quando igitur ejusmodi symptomata in illis incidunt, arduum profecto sæpe est divinare aut conjectura assequi, unde aut qua ex causa hæc mala oriantur, cum & ex aliis sæpe proveniant, & qua ratione curatio recte instituenda: eoque factum nihi esse videtur, ut veteres jam conquesti sint atque exclamaverint, difficile esse infantibus mederi, quia quid, aut ubi, aut unde patiantur, nobis dicere vel revelare non possunt. Hinc quam sagacissime, quantum fieri potest, ponderanda ac perpendenda sunt omnia phænomena, donec ex iis vel certe, vel verisimiliter minimum, utrum mala illa a detentione difficili, an a lacte corrupto, an alia ex causa ortum trahant, perspiciamus.

Dentitionis
symptomata.

XXII.

Indicantur vero ea mala a dentibus exitum molientibus provenire, si infantes multum clamantes (quo nimirum clamore dolores suos nobis significare solent) digitos sæpe in os intrudunt, papillas nutricum vel digitos alterius personæ intra eorum maxillas insertos, fortiter mordent, si saliva solito largius ex ore effluit, si gingivis maxillarum, ubi dentes primi erumpere solent, tubercula inæqualia & digitis & oculis, itemque calor p. n. & in ore & in toto corpore, ac sæpius in pulsu percipiuntur. Accedit quod simul sæpe subito sine causa externa expavescant, & præsertim in somno, atque ut plurimum alvi simul fluxu laborent; quod ultimum tamen longe melius est quam si alvus, ut hæc haud raro fit, sit constipata.

Signa.

X X I I I.

Curatio.

Quando igitur ex his aliisve indiciis mala illa a dentibus concitari judicamus, ea non melius curantur, quam iis, *quæ dentium eruptionem promovent*, hoc est, quæ gingivas duras, crassas ac tumidas emolliunt & atterunt, inflammationem earum resolvunt, caloremque p. n. blande temperant; ut sunt *interne pulveres & mixturæ aquosæ, temperantes*; *externe vero oleum amygdalarum dulcium cum sirupo violarum, aut papaveris rhœad. vel sirupus florum papaveris, vitrioli spiritu leniter imprægnatus*, si sæpe gingivæ iis fricentur. Interponantur his ea *quæ gingivas atterunt*, ut sunt *corpora dura, glabra, sicut dens lupi, crystallus vel agathus politus, vel frustum matris perlarum læve, aliaque similia*, quæ infantibus sæpe in manus dentur, ut ea in os ingerant, vel ad mandendum ea in os ipsis immittantur. Ita & *frustum cutis recentis lardi* sic usurpatum utrique scopo sæpius egregie satisfacit. Specificè multi hic commendat ac laudant *cerebrum leporis cocti, aut sanguinem cristæ galli recentis* pro gingivis his ipsis illinendis.

X X I V.

De Epilepsia infantum.

Epilepsie curatio.

Epilepsia infantum recens natorum ut plurimum vel a *meconio* non satis expurgato, vel post hæc a *lacte corrupto* & acido, ut jam supra §. I. & III. diximus, vel a *dentitione difficili*, vel ab imminentibus *variolis*, vel a *vermibus* oritur. Si a *meconio*, curanda ut §. I. si a *lacte corrupto*, ut §. II. & III. docuimus; sin vero a *dentitione difficili*, facienda primo ea sunt quæ §. XXIII. modo proposuimus, sed præterea *epilepsiam & convulsiones inde sæpe oriundas* egregie & avertit & minuit, immo sæpe tollit, præmissis & interpositis prædictis, spiritus C. C. vel liquor C. C. succinatus, tamquam egregia *nervina & antispasmodica*, ad aliquot guttas aliquoties in die exhibiti, qui & vertici, cervici, temporibus atque naribus cum fructu sæpe adhibendi; itemque *pulveres absorbentes*, supra §. II. & IV. lau-

audati, ac speciatim pulvis ex lumbricis terrestr. pulvis item Marchionis, & specificum cephalicum Mich. non omittis, præsertim si *alvus obstructa*, lenibus purgantibus & clysmatibus sæpius jam indicatis, eisque alvus semper aperta, quod hic utilissimum est, servetur. Quando vero his symptomata non cedunt, *tumor gingivæ*, ubi dens erumpendus latet, *scalpello*, ad dentem usque subtus latentem transversim incidendus, id quod sine periculo fit & sæpe omnia tollit symptomata; quo etiam in casu, quia inflammatio in gingivis esse solet, *venæ sectionem*, ut efficacissimum & quasi infallibile remedium hic laudat celebris Sydenhamius; quod tamen non semper esse experientia edoctum. Quando *epilepsia a vermibus* ortum habet, vermes estruendi, sicut cap. XVI. § 33. & seq. itemque infra in hoc capite §. 29. proposuimus; ea vero, quæ *imminentibus variolis* incidit, non adeo est pertimenda; quia eis erumpentibus sponte cessat. Adeoque nihil aliud requirit, quam ipsæ variolæ, blande scilicet temperantia & eruptionem promoventia, sicut hac de re uberius supra Cap. IV. & speciatim pag. 67. & 8. proposuimus.

X X V.

Quod si vero illa mala §. XXII. *clamores* nimirum, *Mala & vigilie, febres &c.* non a dentitione oriuntur, plerumque a *lacte corrupto* vel & a *nimia eorum repletione*, præsertim cibus incongruis facta, provenire solent. Si *lacte corrupto*, curatio ut §. II. & III. dictum est instituenda; sin autem a *nimia repletione* ventriculi & auditatibus inde ortis, ex *purgantibus*, ac *clysmatibus* vel etiam, pro malorum diversitate, blandis *emeticis* vacuandæ & postea pulvere seminis anisi, anima rhabarbari aliisque stomachicis & carminativis remediis internis & externis ventriculus roborandus.

X X V I.

De Ophthalmia infantum.

Curatio
interna.

Ophthalmia sæpius quoque infantes affligit, eosque haud raro, vel *suppuratione* inducta, vel *cornea alba* & *opaca* facta, *cæcos* reddit, nisi summa cura tunc tractetur, atque in infantibus varias ob causas numquam periculo vacat. Oritur sæpe a *vitio lactis nutritici*, nimium forte acris, vel & hac ipsa scorbutica aut & quandoque venerea labe affecta. Adeoque in *curatione* tam *nutrici*, quam infanti danda sunt medicamenta idonea, tam *purgantia*, quam *alterantia*, catarrhis, scorbuto aut morbo venereo propria, & quidem purgantia hic cum mercurio dulci semper maritentur. Ex *alterantibus* vero conveniunt ess. alexipharm. essentia & decocta lignorum, infusum herbæ euphrasie cum rasura ligni sassafras, ad modum theæ sæpius haustum, pulveres diaphoretici ex lap. cancror. succino præparato, antimonio diaphoretico, radice valerianæ, semine anisi, fœniculi &c. compositi, quibus subinde, præsertim ubi scorbuti vel luis venereæ suspicio est, aliquid mercurii dulcis recte additur.

X X V I I.

Curatio
externa.

Externe oculi defendendi, ne ab acri lymphâ erodantur, & stases sanguinis hic factæ resolvendæ: id quod commode fieri potest *collyriis ex aquis ophthalmicis*, & cum primis euphrasie, flor. cyani, valerianæ, fœniculi, chelidon. majoris, calcatripæ &c. Si uncia uni vitrioli albi, vel sacchari saturni gr. ij. & camphoræ sem. melon. tritæ gr. j. vel spir. vini camphorati ʒj. addantur, eisque sæpe oculi tepide eluantur atque abstergantur. Quidam his aquis *amyli albi*, *tutiae* vel *lapidis calaminaris* præparati aliquot grana addunt, vel & *aliquid aloes*, iisque eadem ratione utuntur. In quibusdam casibus parum pulveris mercurii dulcis addo. Præterea *amuleta* ex radic. imperatoria aut valerianæ cum camphora sæpe etiam hic multum profunt, & in malo pertinaciori *vesicatoria* cervi-

aut brachiis, immo & in paullo adultioribus, ipsi
ritici feliciter adhibendum; vel & si omnia hæc pa-
m sunt, *fonticulus* in brachio excitatur.

Si *adhuc ubera sugunt*, attamen ad annum acce-
nt, vel enim jam superarunt, sæpe eos fere sponte
pertinacibus oculorum inflammationibus curatos vi-
postquam solum a nutrice, licet sanissima visa sit
que etiam revera fuerit, remoti fuerunt. *Dieta* quo-
e hic magni est momenti, adeoque tam a nutrice,
am pueris probe observanda.

XXVIII.

De Maculis oculorum, Nebula, Albugine.

Hæc vitia, de quibus jam cap. XIV. egi, etiam *Curatio.*
e in infantibus ex ophthalmia in tunica oculi cor-
oriuntur, & vel eam comitantur, vel etiam se-
a inflammatione adhuc restant, atque visum vel
parte vel ex integro tollunt. Ita etiam sæpissime
variolis, vel etiam post has, bene licet superatas,
adunt. Si *inflammatio adhuc adest*, iisdem remediis
ernis potissimum & externis §. 36. & 37. est conti-
ndum, *purgantiaque* idonea sæpius interponenda,
etiam externe trochiscos alb. Rhas. ℥℥. in aquæ
usdam ophthalm. ℥iij. solutos, egregios deprehen-
itemque aquam ophthalm. Quercet. ex croci me-
aliquot granis in aquæ ophthalm. ℥j. infusis, para-
a, oculisque sæpius instillando & abstergendo adhi-
m. Si *macule illæ albæ sine inflammatione restant*,
ter aquas has quotidie *pinguedo viperarum* bis vel
oculis ad gutt. j. vel ij. instillanda, vel *pinguedo*
piscis, aut *sperma ceti liquidum*; quibus ipsis sæ-
si non nimis densæ sunt, tolluntur. Quando a *va-*
is ortæ, & adhuc recentes sunt, frequens purgatio
a mercurio dulci instituenda, atque deinceps inter-
& externa modo laudata quam solertissime adhi-
da; si vero hæ *maculæ jam inveteratæ*, vix aut
tolluntur, & acrioribus potius oculus omnino de-
itur, quam emendatur. Sciendum enim, quod ma-
la

Ita hæc sæpe admodum sint pertinacia, quæ moram & patientiam parentum & ægrorum requirunt, qui monendi, ne mox, si malum brevi haud cedat, ad agyr-
tas confugiant, qui vitia hæc sæpe acribus valde me-
dicamentis aggrediuntur, atque vi quasi ea eradica-
re volunt: verum eis oculos sæpe omnino corrumpunt. *Ita nec Medicus mox ad acriora eandem ob-*
causam accedat, sed blandis patienter continuet, vel
& quandoque per aliquod tempus a medicamentis ex-
ternis prorsum absteineat; neque desperet prorsus de
mali curatione, quando oculi fabrica nondum destruc-
ta est: nam tempore haud raro sponte hæ macula
in pueris dissipantur, & præstat tranquilla potestas
quod violenta nequit; *natura enim hic non vult cogi*
sed blande duci.

X X I X.

De Vermibus sive Lumbricis.

Vermes Quando infantes magis adolefcunt & alimentis cras-
quotu- sioribus nimisque copiosis, pane scilicet, farinosis, car-
plices nibus, caseo, saccharatis, crudis & difficulter digerent-
& effe- dis vescuntur, præsertim si debilioris, frigidioris & pi-
ctus. tuitosi sint temperamenti, altero, tertio & sequenti-
bus annis VERMES sive LUMBRICI sæpe in ipso
rum ventriculo & intestinis generantur, iique ut plu-
rimum, teretes, *lumbrici* ob similitudinem dicti, (ra-
rius *lati*, vel *ascarides*) qui plerumque multæ pituitæ
involuti, in ventriculo aut intestinis, cum multis gra-
vibus symptomatibus haud raro hærent. Rarius ver-
in infantibus robustis & vegetis observantur, sed ple-
rumque, ut jam dixi, in debilioribus, frigidioribus, te-
neris, pituitosis. *Efficiunt vero vermes* irritatione sua
rosione ac morfu dolores ventris, *nauseam*, vomitus
diarrhœas, animi deliquia, pallorem, pulsum debilem
inequalem, intermittentem, pruritus narium, tormin-
& clamores, borborygmos, febres, tabem, insultus epi-
lepticos &c. sicuti jam supra cap. XVI. §. 23. & sec-
ubi de vermibus adultorum actum est, indicavimus.

At

At consumptione chyli producunt in infantibus sæpe voracitatem, debilitatem, maciem, alvum adstrictam, immo quandoque ipsa intestina perforant, & abdominis avum ingrediuntur, sicut aliquoties in cadaveribus eorum incisus observavi : quo ipso tumores ventris, atroces cruciatus, epilepsiam aliaque sævissima mala & iterumque mortem ipsam inducunt.

X X X.

Cognoscuntur ex ætate, temperie frigida, pallido ut *Diagnosissimum* faciei colore (quamvis hic sæpe fallat) pal- *sis eo-*
lebris lividis, concavis, pruritu narium frequenti, vo- *rum.*
acitate, terroribus in somno, ceterisque §. 29. enar-
atis symptomatibus, & cumprimis quoque *singulari*
*spiritus sive oris fæto*re aliisque supra cap. XVI. §. 34.
adductis signis ; quam maxime tamen etiam quando
semel iterumque vermes vel per os vel per anum ab
eosis exiisse observati sunt. Quoniam igitur tam gra-
via mala, immo ipsam mortem infantibus & pueris
sæpe inducunt, non negligendi, sed mature efficacibus
remediis sunt curandi.

X X X I.

In curatione igitur pituita, tanquam nidus eorum, *Curatio.*
que simul ipsi sunt destruendi, enecandi atque ex-
pellendi : id quod in adultis optime fieri cap. XVI.
§. 36. & seq. docuimus, variis *amaris, martialibus,*
mercurialibus, ac *purgantibus,* ex quibus vero Medicus
hic seligere studeat, quæ infantibus ac pueris com-
modissime ingeri possunt : ut sunt *decoctum mercurii* in
aqua vel lacte, aliquoties in die ipsis ad uncias ali-
quot datum ; porro *infusum seminis cinæ* vel *florum*
maceti in vino malvatico aut canariensi, ad cochlea-
ra duo vel tria pro dosi aliquoties in die ; præterea
men cinæ cum melle subactum ; vel *mercurii dulcis*
j. cum saccharo aut pulvere quodam grato aut in-
pido exhibitum, quibus simul *externa* cap. XVI. §.
nominata addi, atque *purgantia* §. 38. recensita
binde interponi ; immo & *clysteres ex lacte*, præser-
tim quando purgantia sumpserunt, ad eos deorsum in-
tandos, injici debent, servata semper diæta mo-
ca.

X X X I I.

De Variolis & Morbillis.

Capite quarto, pag. 65. & seq. satis actum est, adeoque lectorem ad illud remittimus. Hic solum adhuc monere volui, quod in infantibus *variola* saepius cum *epilepsia* incipiant, quæ vero hic nihil mali denotat aut intert, sed eis vel sponte vel ope diaphoreticorum erumpentibus, cessat.

DE HERNIIS infantum, ac speciatim *umbilici*, *inguinum* & *scroti*, infantibus & pueris valde frequentibus, de *hydrocephalo*, *calculi vesicæ*, *ani procidentia*, *ranula linguae* aliisque infantum morbis, manuum auxilium desiderantibus, vid. Institutiones nostræ chirurgicæ.

M O N I T A

Quaedam practica circa morbos infantum.

1. *Difficile est mederi infantibus*: primo quia, quid patiantur, quidve doleat, & ubi, dicere nequeunt; deinde quia medicamenta vix aut ægre assumunt.

2. In morbis infantum quibuscumque primorum dierum præcipue explorandum, *an meconium satis sit expurgatum*; quod si non sit, hoc quam primum adhuc est expurgandum.

3. Subsequenti tempore in eorum morbis *ad lac corruptum* & *acescens*, postea *ad dentitionis tempus*, & denique in paullo adultioribus *ad variolas* & *vermes* est attendendum.

4. In infantum morbis semper, *an alvus sit aperta*, inquirendum, & ut sit, probe curandum.

5. *Ad nutricem* semper simul respiciendum, eique & *diæta* & *remedia* morbo præsentis congrua sunt ordinanda.

6. In *febris acutis*, temperantia, ut in variolis, ipsi

si danda, atque aliquid camphoræ appendendum. utrices quoque temperantibus & in victu vegetabilibus utantur; a carnibus vero abstineant.

7. In *intermittentibus*, primæ viæ purgandæ, post-
ess. rhab. sæpe detur: & si hæc intra aliquot dies
n fugatur, decoctum forte cort. chinæ frequenter
hibeatur.

C A P U T X I X.

De Venenis.

I.

7 Venenorum cognitionem eorumque curandi ratio- *Veneni*
nem, quia tam multi eis pereunt, Medico sum- *defini-*
necessarias esse existimo, etiam si hæc doctrina in *tio dif-*
risque libris practicis prætermissa & neglecta sit. *ficilis.*
quid venena sint, aut quid per ea proprie intel-
tur, quamvis plerisque, & cum primis præcipitan-
judicantibus, facile videatur, tamen prudentibus
magnam eorum diversitatem, & cum primis quia
ta, immo pleraque eorum certa ratione atque pru-
ter adhibita, præstantissima etiam sunt, aut fie-
ossunt medicamenta, multa e contrario nobilissi-
medicamenta, sinistre aut imprudenter adhibita,
possunt ac solent venena; definitionem perfectam
, quæ omnibus conveniat, jam dudum atque ad-
hodie multis eruditis difficillimum visum est,
que donec quis forte perfectam exhibeat, sequens
riptio pro aliqua eorundem idea formanda suffi-
poterit.

II.

Intelligo autem per *venena*, corpora naturalia, quæ *Quid*
a mole intra corpus nostrum assumpta, vel alia *venena.*
ne, ut per morsus aut vulnera, aut sub fumi aut
ris specie ipsi applicata sive ingesta, nunc brevi,
tardius, gravia eaque sæpe horribilia symptoma-
principes corporis nostri actiones lædentiæ, inver-

tentia, & mortem ipsam frequenter inducunt. Græci *toxica*, immo & *pharmaca*, sed addito plerumque adjectivo *deleteria*, vocantur: quia *pharmaca* etiam medicamenta significant.

I I I.

Divisio
eorum.

Dividuntur hinc 1. in *celeria* & *tarda*; 2. in *rodentia*, *corrodentia*, sive *caustica*; 3. in *acida* & *alcalica*; 4. in *obstruentia*, vel ob vim vasa minora vehementius *adstringentem*, vel ob qualitatem humores nostros *faciosos nimis inspissantem*, ut per subtiliores ductus arterias & nervos fluere nequeant; 5. in *narcotica* sive *stupescientia* ac *soporifera*; 6. in *mineralia*, *vegetabilia* & *animalia*; 7. quædam etiam horum venenorum, dici possunt *naturalia*, ut plerumque sunt venena *vegetabilium* & *animalium*, atque nonnulla etiam ex *mineralibus*; quædam vero *artificialia*, quæ vel per ignem sive artem chemicam, ut pleraque *mineralia*, vel *mechanica* quadam ratione conficiuntur, ut *adamas*, *crystallus*, aut *vitrum* rudi modo contusa & ingesta, quæ ob spicula sua acuta, pungentia ac scindentia ventriculum & intestina lædunt, vulnerant, ac destruunt vel *apex cultelli*, *culter ipse*, *aciculæ*, aliæve similes *mechanice præparatæ* atque vel imprudenter vel casu deglutitæ. Quædam vero eaque summe perniciofa venena *putrefactione* etiam generantur. Quæ venena *ex regno minerali*, natura vel arte producuntur *acide* ut plurimum sunt *indolis*, ut *spiritus sulphuris*, *vitrioli*, *aqua fortis* &c. magna copia sumpti, mercurius *sublimatus*, *præcipitatus*, *butyrum antimonii*, alia §. VIII. quæ vero *venena regno vegetabili vel animali* ortum debent, ut plurimum *alcalica* sunt *naturalia*: ita ut nullum nunc *vegetabile acidum* mihi succurrat, quod *venenatæ* sit *indolis*, sed *omnia vegetabilia venenata alcalica* sunt, eaque vel *rodentis* sive *causticæ indolis*, ut *aconitum*, *helleborus*, *euphorbiurn*, *tithymalus* aliaque plura §. VIII. recensenda; vel ob vim *inspissantem*, sive *obstruentem* vel *narcoticam* noxia deprehenduntur, adeoque *vegetabilia acidi* sapientis tuto tam in esca, quam in medicamentis adhiberi solent.

8. Veteres etiam a qualitate vel nimis calefaciente & frigefaciente venena in calefacientia & frigefacientia riserunt; quæ divisio, licet a quibusdam ut inutilis fors rejiciatur, certo tamen modo & certis in maretineri potest, dum quædam refrigerantibus, alia eficientibus remediis curanda. Prisci quamplurimis venenis qualitates occultas adscripserunt; quarum venenaturam maxima ex parte hodie satis manifeste monstrare possumus, ut ex sequentibus uberius patet. Quoniam vero omnia illa venena gravia mala & quam sæpissime ipsam mortem concitant, decipuis una cum eorumdem medendi ratione hic acturus sum.

I V.

Antequam vero ulterius hoc in argumento progrediar, diversa hæc venena §. III. adhuc paullo intius hic perscrutanda atque exponenda esse existimo, Naturæ eorum & quomodo agant, melius perspicere in curatione eorum, ad ductum sanæ rationis, eto curatius, ac certius progredi queamus, cum venis varique adhuc recentiores in eis curandis emco fere tantum modo, & sæpius sine omni rationeegerint, & quidquid antecessores contra hoc vel ilvenenum laudaverunt, id & ipsi ad eorum ducommendaverint.

V.

RODENTIA igitur venena sunt corpora acria, Rodentia vel solida, gradu quidem acrimoniæ diversa, tia quomodo agant. ita tamen acria, ut in ventriculum & intestina, modo a sub cibi, potus aut medicamenti nomine delata, gant. etiam casu aut per errorem ingesta, particularum figura acuta, rigida, ancipite, pungente & ente, hæc viscera irritent, pungant, vellicent, it, inflamment, erodant, exulcerent, ac tandem venena & spachelo inductis corrumpant ac destruant. quia in partibus internis fere ut medicamenta ca externa in cute agunt, hæc venena interna rodentia, corrosiva, caustica & adurentia dicuntur. Ita effectus illorum in corpore humano sunt, ut priiritatis, & arrosis ab eis fibris faucium, œsopha-

gi, ventriculi atque intestinorum nerveis, oriantur in hisce partibus ardor, inflammatio, dolores acutissimi, nausæ, spasmi, vomitus, singultus, convulsiones, tremores, fluxus alvi feroci, subinde cruenti, quandoque & purulenti, ac foetidissimi, pro illorum venenorum varietate. Deinde autem, *quando partes eorum in sanguinem penetrarunt*, non solum acrimonia sua, irritando vasa sanguifera, varias in œconomia corporis & præsertim cordis, arteriis, pulsu, respiratione, ac sensibus turbas & febres concitant, verum sanguinem & serum pervertendo, coagulando ac destruendo, gravissimis symptomatibus, doloribus, anxietatibus interitum tandem corpori inferunt.

V I.

Sunt vel acida vel alcalica. ACIDA vel ALGALICA hæc §. V. *rodentia sunt venena*, utraque acerrima, atque eadem fere ratione & solidas & fluidas corporis nostri partes afficiunt tamen, quia contrariam fere curandi rationem exigunt, probe a se invicem sunt distinguenda: dum *acida alcalicis, alcalica vero venena acidis* potissimum remediis destruuntur.

V I I.

Natura acidorum. VENENA igitur ACIDA pleraque, si non omnia sunt *artificialia*, ut *spiritus omnes acidi*, ex mineralibus parati, iusto majori copia assumpti, ut spiritus sulphuris, & qui hujus soboles sunt, spiritus vitrioli & aluminis, item spiritus nitri ac salis, & quæ rursus ex his fiunt, aqua fortis, aqua regia, oleum vitrioli, butyram antimonii. Præterea *sales metallici* ut mercurius sublimatus, mercurius præcipitatus, albus, ruber, viridis, turbith minerale, arcanum corallinum, vitriolum, præsertim veneris, argenti, qui lapis infernalis vocatur, aliaque ex his producta cetera, quæ partes quas attingunt, sua acrimonia laedunt, irritant, erodunt, discindunt, destruunt & precipiatim *sales metallici horrendas nauseas, vomitus, anxietates, tremores, convulsiones, pessimaque alia* inducunt.

V I I I.

Alcalicorum. ALCALICA vero venena sunt partim *naturalia* partim

partim *artificialia*. *Naturalia* in vegetabili potissimum regnoprehenduntur, ut *aconitum* sive *napellus*, *helleborus* uterque, *cicuta* (a) & *œnanthe* succo viroso, croceo (b), *laureolæ* sive *mezeri* baccae, *grana cocci-gnidi* etiam dictæ, *scammonium*, *tithymali*, *euphorbiæ*, *apocyna*, *colocynthis*, *helleboroides* Boerh. *cri-stophoriana*, *ranunculi* & *clematitides* urentes, *nico-tiana*, *fungi* quidam acres venenati, *corona imperia-lis bulbi hyacinthi*, *colchici* &c. Quo & certo modo *arisarum*, *arifarum* atque omnia fortiora purgantia & eme-tica referri possunt, si nimia copia ingeruntur: quia in omnibus his sapor âcris, *sal acré alcalinum* indi-cans, linguam, fauces, œsophagum, immo & ventri-culum & intestina acrimonia sua arrodens & inflam-mans percipitur. Deinde adhuc varia venena sunt al-calica sponte vel arte producta, ut primo quæ putrefa-ctione oriuntur, ex oleis putrefactis olivarum, amygdalar. multisque aliis, itemque ex putrefacto butyro, ardo, pinguedine aliisque animalium partibus ac hu-moribus putredine corruptis, quæ assumpta acerbissima sæpe mala concitare solent.

Deinde quedam venena alcalica ignis vi producuntur, ex sale alcali, (ut cineres sunt clavellati) & calce viva, quæ lapides caustici appellari solent, externe in chirurgia sæpe utiles. Præterea ad venena alcalica etiam pertinent nonnulla animalia, & præsertim infe-sta, ac nominatim *cantharides*, quæ interne sæpe gra-via mala inducunt, ac denique *morsus animalium*, *ve-nenatorum* vulgo dictorum, ut *scorpii*, *apum*, *vespa-rum*, *aranearum*, *serpentum*, speciatim *viperarum* & *canis rabiosi*.

I X.

Tandem ad venena rodentia & scindentia, *mechani-co* *nico-* *rum.* illa §. III, *adamas* scilicet, *crystallus* & *vitrum ru-* *dus* *dius*

(a) De *cicutæ* effectib. vid. *Vvepffer* de *cicuta a-quatica*. (b) De hac vid. notabilis observ. in *Vvie-lili* obs. Med. 43. quæ gustata brevi duobus mortem intulit.

dius contusa, aciculæ, cuspis cultelli & similia etiam referenda; quæ vero quomodo agant, supra jam indicavimus, curatuque sunt difficillima.

X.

Obstruentia venena quæ? Ad OBSTRUENTIA VENENA pertinent *gypsum, calx* aliaque corpora calciformia, *creta, præparata ex plumbo*, ut *plumbum ustum, lithargyrium, cerussa, tutia, lapis calaminaris, minium* & similia, item *saccharum saturni* & *vinum lithargyrio imprægnatum* aliaque ex *plumbo* vel *saturno*, aut & ex *stanno* producta: quæ vasa & præsertim lactea, aliaque in ventriculo & intestinis absorbentia, una cum glandulis harum partium vehementer adstringunt, obturant, eoque ipso dolores colicos acerbissimos, convulsiones, debilitates, paralyfes, animi deliquia, tabem & atrophiam aliaque funesta mala inducunt: immo & *fumus & pulvis plumbeorum* respiratione attracti, asthma, tabem aliave mala metalla hæc tractantibus (a) & figulis (b) concitare solent. Ad obstruentia etiam a nonnullis *mespila immatura* aliaque similia fortiter adstringentia referunt. Deinde corpora illa, quæ vim habent humores nostros nimis inspissandi, ut oscula vasorum minorum & speciatim lacteorum aliorumve absorbentium in primis viis transire nequeant: sicut sunt *fungi quidam venenati*, glutinoso viscido succo abundantes, *viscum arboreum varium, semen psyllii, sanguis tauri* & similia varia.

X I.

Narcotica quæ? Inter NARCOTICA & stupefactiva sive soporifera primum est *opium* adeo decantatum, deinde *hyoscyamus, solanum* & imprimis *furiosum, Bella donna dictum, stramonium sive datura, cynoglossum, mandragora, liliolum, lupulus, cannabis* &c. *spiritus vini* & omnia inebriantia; in quibus sal alcalicum, acre, idque volatile, cum narcotico sulphure prædominatur, quod non tam vi rodendi, ut cetera §. VIII. nocet, verum motus

(a) Vid. *Stocksius* in libello de lithargyrii fumo noxio. (b) *Timeus* in casib. Med. Lib. VII. cas. X. & *Ramazzeni* de morb. artif.

as in sanguine auctos, postea nimios, atque ope hominum primo hilaritatem, vires auctas, stimulum in venerem, tandem soporem, sentiendi facultatem ablatam, deliria, stuporem, spasmos, convulsiones, fatuitatem, aliosque pravos effectus producere videtur; id quod ubique ex curatione horum malorum probatur: dum efficacissima remedia contra soporem aliosque effectus opii, scilicet opii, hyoscyami, lolii & ebrietatis, sive ea vino sive spiritu vini, sive etiam cerevisia inducta fuerit, sunt acida, ut acetum, succus citri, cremor tartari, atque fere quaecumque, larga satis copia assumpta.

X I I.

ANIMALIUM VENENA pleraque morfu potissimum nocent, ut *serpentum, viperarum, scorpionum, tarantulæ, aranearum, apum, vesparum, canis* aliisque animalis rabiosi, quando scilicet ipsorum saliva venenata, dentibus adhærens, cum ipso sanguine per vulnus morfu factum communicatur, quod venenum non acidæ, sed alcalicæ & speciatim saponacæ esse indolis, varia præcedunt phænomena, & præcipua eorum, viperæ nimium & animalium rabiosorum, funestissima inducunt symptomata, immo sæpe mortem. *Cantharides* vel iuniori copia intus usurpatæ, vel extus ad vesicas citandas largius aut diutius adhibitæ, in quibusdam dolore vesicæ, ut ipse observavi, & quandoque ipsum sanguinem cruentum cum gravibus doloribus inducunt; id quod a sale alcalico valde acri ac volatili, quo omnia huiusmodi insecta abundant, deducendum est. *Ovaria* ubi piscis comesta, licet piscis ipse sine noxa assumatur, vehementia tormina, choleram aliaque veneni purgantis fortioris assumpti symptomata inducere quot exemplis ostendit TIMÆUS; (a) id quod & *mytilos* comestos nonnullos quandoque facere, præterea, adhuc nuper peculiari scripto Medicus doctus Ansvvic evicit. (b). *Hirudines* sive sanguisugæ in aqua vel alia ratione forte deglutitæ, œsophago vel

(a) In casib. Med. Lib. III. Cap. VII. (b) *Beatus* in Epist. de Affection. a comestis mytilis, ad cæsarem Welhof. Hannov. 1735. 4.

vel etiam ipsi ventriculo se affigere, hasque partes vulnerare, vomitum cruentum & mortem ipsam inducere possunt. (a) Tacemus nunc multa alia animalia, quæ a veteribus Græcis aut Romanis inter venenata sunt relata; quia apud nos vix vel numquam occurrunt.

X I I I.

Diagno-
sis vene-
ni acce-
pti.

Hominem venenum sumpsisse vel accepisse, ni forte id jam effatu ægri vel adstantium constat, difficillime cognosci potest; quia sæpe sponte in hominibus oriuntur morbi ac symptomata, & cumprimis *cardialgia*, *colica*, *cholera*, &c. qui similibus fere malis stipantur, ac si a sumptis vel datis venenis orirentur. Interea tamen conjecturis probabilibus aliquem venenum accepisse generatim suspicamur; quando quis antea sanus, mox a cibo, potu vel medicamento sumpto, sævis obruitur symptomatibus, ac speciatim viiium subita prostratione, magna cordis anxietate, respiratione molesta, inusitato ac vehementi ardore in faucibus, animi deliquiis, cordis palpitatione aut tremore, doloribus vehementibus ventriculi atque intestinorum, sæpe nausea & vomitu enormi, *cardialgia*, faciei calore livido lingua ac labris, corporis extremis & præsertim unguitibus nigricantibus, vertigine, oculis torvis, deliriis sudore frigido, maxime circa frontem ac tempora & similibus; speciatim a rodentibus sive causticis, *cardialgia*, ardore ventriculi, nausea & cholera enormi subinde etiam *alvi fluxibus* maxime dolorificis, iisque modo serosis, modo cruentis, cum anxietatibus præcordiorum, respiratione anxia & inquietudine, affliguntur, immo & haud raro intumescencia ventris & similibus. Veneni alcalici assumpti signa sunt ardor lingua faucium & ventriculi, calor p. n. sitis vehemens tormina ventris sævissima, nausea, hypercatharsis, singultus, respiratio anxia, gangræna & sphacelus intestinorum, foetor, animi deliquia, & a nonnullis, cicu-

(a) Ejusmodi exemplum videri potest in Timæo casib. Med. Lib. VII. cas. XIX. Plura autem legi possunt in notis Stentzelii ad Liudestolpium de venenis pag. 134.

cicuta, aconito, hyoscyamo, mentis alienatio, sensuum perversio, & convulsiones. *Veneri obstruentis* indicia & effectus præcipuos §. X. jam proposui. *A venenis narcoticis* sumptis delirant, rident, saltant, varias gesticulationes sæpe faciunt ludicras, in soporem profundum incidunt & convulsionibus etiam sæpe tentantur, &c.

X I V.

Pro diversitate vero ægrorum eorumque corporis habitu *non omnes æque vehementer eodem veneno afficiuntur*, sed quidam levius, quidam vehementius, quidam brevi sæpe moriuntur, quidam vehementer ægrotant, alii minus, aut omnino sine omni detrimento, vel saltem uno alterove vomitu evadunt, licet quandoque idem venenum & ex eodem vase assumerint. Hinc patet, *nullum certum aut definitum tempus actionis veneni*, ut quidam existimant & perhibent, *determinari posse*. *Dignoscere autem post mortem utrum quis veneno interfectus*, an ab alia causa mortuus sit, nisi res venenata in ventriculo aut intestinis reperiantur, quoque difficillimum est: *interea tamen in eis, qui causticis interfecti sunt*, ventriculus intus erosus & sanguinolentus conspicitur, & sæpe arsenicum aut mercurius sublimatus, forma pulveris albi in eo reperitur; qui pulvis si prunis injectus allium redolet, arsenici indicium est. Sed cum hæc res ad Medicinam forensam pertineat, hic plura de ea non dicemus.

X V.

Quod ad *prognosin* attinet, si venenum sumptum esse novimus illiusque natura nobis perspecta est, facilius æger ab eo liberatur ac restituitur, quam si illud ejusque indoles, hoc est vera causa Medico occulta sit. Quæ *chemicis artibus* producta, quia *cito erodunt ac destruunt ventriculum*, ex vehementissimis sunt, ideoque ventriculus quamprimum vomitu tepida concitato, ab eis liberandus est. *Qui brevi ab assumpto veneno materiam venenatam vel sponte natura, vel ope tepidæ aliorumve idoneorum remediorum, evomunt*, facilius evadunt, quam ubi manet. *Venena quæ non mature & mox in principio, idoneis remediis expu-*

*Venena
vario
modo af-
ficiunt.*

Prognosis.

gnan-

gnantur, vel insanabilia fiunt, vel morbos lentos ac diuturnos, præcipue languores & paralyfes insanabiles, post se relinquunt. *Quorum ventriculus*, quando venenum accipiunt, *cibis*, iisque oleosis vel pinguibus est *infectus*, minus a venenis rodentibus afficiuntur; *hinc jejuni* plerumque vehementius & celerius inde læduntur, quam bene pasti. Quibus *gangræna* & *sphacelus* a veneno interne inductus est, pereunt. *Infantes*, *pueri* & *gravidae*, præsertim teneriores, plerumque durius a venenis affliguntur robustis; licet quidam contrarium sentiant. Qui a sumpto veneno *sensus* & *motum amittunt*, aut tremore, convulsionibus, & animi deliquiis sæpe tentantur, item quibus externa livent & frigent, cum summa cordis anxietate, respiratione difficili, oculis torvis ac turbidis, periculossissimo sunt in statu. *Mechanica* illa §. IX. & *obstruentia calciformia ac saturnina* difficillime & vix expugnantur, quamvis non cito, sed tarde occidant. *Qui ab animali rabioso morfi sunt*, & tristes fieri atque male se habere incipiunt, lucem fugiunt & humida averfantur, in magno versantur periculo; nam *hydrophobia* tunc ut plurimum instat, qua plerumque moriuntur.

X V I.

Curatio
genera-
lis.

In *curandis venenis*, quia valde diversa sunt, *semper ad veneni*, si notum est, *naturam* §. V. ad IX. *respiciendum*, & secundum illorum naturam ac diversitatem per contrariam curatio est instituenda: ita, si in tempore advocamur, & mox necessaria adhibemus, ut plurimum quam efficacissime ea superabimus. Attamen quia *venena non semper nobis mox patent*, præsertim si ab hominibus sceleratis clam ægris exhibita fuerunt, prudenti symptomatum perscrutatione & conjectura opus est. Quando enim quis ejusmodi insolitis symptomatibus §. X. vel plures simul, qui eodem cibo vel potu sunt usi, iis afficiuntur, quæ veneni suspicionem Medico incutiunt, veneni ingestæ magna est suspicio, adeoque *generalis indicatio hic est*, *venenum*, vel saltem acre irritans illud, quam primum fieri potest, & quidem per viam brevissimam, vomitu scilicet *esse ejiciendum*: id quod optime plerumque fit haustu-
lar.

largo aquæ tepidæ simplicis sæpius & copiose repetita, irritatis simul, si vomitus sponte mox non sequatur, *faucibus ope digiti vel plumæ*, quæ aqua a vetustissimis Medicis jam ut magnum antidotum adversus multâ venena commendata est: dum partim evacuat, partim acre temperat, & expurgat, præsertim si, ubi dolores circa ventriculum adsunt acuti & rodentes, oleosa & pingua, ut *olei olivarum* vel lini, vel amygdalar. dulc. vel butyri uncia circiter in quovis haustu & quoties vomitu rejicitur, ei admisceatur; vel & ubi veneni acerrimi suspicio est, *merum oleum* larga copia detur. Loco aquæ simplicis etiam *juscula vel decoct. hordei aut avenæ*, cum pinguibus illis vel ipsum etiam *lact tepidum*, dari apte possunt, donec omne venenum tam per superiora quam inferiora rejectum sit: id quod *clysteres* quoque ex his; vel etiam lacte & oleo parati egregie promovent. Postea quia ægri ut plurimum his valde debilitati sunt, *roborantia & cardiaca* quædam, tam ex culina & cella, ac præsertim bona juscula atque usus vini generosi, quam ex pharmacia, ægris danda.

X V I I.

Quod si vero *venenum sumptum sit cognitum*, & utrum e rodentium *acidorum* aut *alcalicorum*, an ex obstruentium, *adstringentium* aut *narcoticorum* sit genere, illudque haud adeo diu sit ingestum atque sic adhuc in primis viis hæreat, præmissis vomitu §. XVI. remedia ea præcipue sunt adhibenda quæ *simul naturæ veneni sunt adversa*, ut sic eis illud, quod forte omne ejici non potuit, tanto citius & melius enervetur, atque tandem omnino per contraria sua corrigatur ac destruat, ne nocere amplius queat.

X V I I I.

Igitur, ubi *venena ingesta sunt acida*, ut aqua fortis, Si aciduspiritus, acidi minerales, mercurius sublimatus, præcipitatus, vel alia supra §. VII. nominata, *alcalica aquæ* vel jusculis pinguibus ac sorbitionibus §. XVI. laudatis, sæpeque assumendis, *admiscenda*, vel etiam *his interponenda*; ut oleum tartari per deliquium, vel cineres clavellati, lapides cancrorum, conchæ, corallia

lia præparata, aliaque similia. Speciatim vero *arsenici antidotum* crySTALLUS montana præparata, *mercurii* vero *sublimati*, oleum tart. per deliquium celebratur. **CARDANUS** quinque, qui hunc sumplerant, solo lacte frequenter dato servavit. (a) Vel loco horum olea pura largiter ingeri, vel illis etiam interponi possunt. Si venena hæc etiam ad intestina transierunt, id quod dolores sævi in eis percepti indicant, *clysmata* temperantia, & cum primis ex lacte, melle & oleis parata atque sæpe injecta, evacuandi & temperandi scopo profunt; ubi etiam *potiuncula laxantes*, ex decocto passularum cum manna paratæ & aliquoties sumptæ, egregie conveniunt, qua de re uberius vid. *Wepfer. lib. de cicuta* aquat. Cap. 23. de curatione. Denique ad doloris vehementiam mitigandam ceteris remediis subinde aliquid *theriacæ* interponi potest.

X I X.

Si alcalicum.

Sed si venenum sit *alcalicæ rodentis* & *urentis* naturæ, ut *salia alcalica fortissima*, *helleborus*, (b) *aconitum* sive *napellus*, *œnanthe* succo viroso, *cicuta*, *euphorbium*, *tithymalus*, *colocynthis*, *elaterium*, *scammonium*, *laureola*, & similia, quæ intestina & fauces erodunt & inflammant, atque etiam mentem sæpe turbant; tunc præmisso vomitu, *aquosorum tepidorum* largo potui admiscenda, immo & interponenda sunt *acidia copiosa* & speciatim *acetum bonum* quodcumque, quod cum aqua mixtum *oxycratum* constituit, propterea ab antiquis temporibus jam a tam multis scriptoribus, tamquam multorum venenorum potens antidotum, atque hoc non sine ratione, celebratur; deinde & *succi acidi fructuum horæorum* recentium, præsertim *malorum citrio-*

(a) Lib. de venenis III. Cap. 3.

(b) Præter multos veteres *hellebori antidotum præstantissimum* esse *acetum* vel *succum citri* aut *limonum*. **LISTERUS** quoque in comm. ad Aph. Hipp. Sect. V. Aph. I. docet: unde patet *ejus virulentiam* in sale alcalico caustico consistere.

riorum, limonum, aurantium, ribesiorum, berberis, ratorum acidorum, addito pauxillo sacchari vel mel-
ad gratiam, vel & herbæ acetosæ, granatorum alio-
que similium, vel etiam sirupi inde confecti, ut
etositatis citri, ribesiorum, berberis, granatorum
c. largiter assumpti, donec acre alcalicum omnino
destructum. Loco horum etiam oxycratum cum mel-
vel ipsi spiritus minerales acidi, quo & clyssus anti-
onii, pertinet, immo & ipsa aqua fortis, quæ nihil
ius est, quam spiritus nitri, & quæ largius sumpta
his venena esse supra diximus, his in casibus, si mo-
satis aqua diluta sunt, fiunt antidota; sic ut mi-
ndum non sit, quod veteres quædam pro venenis
bita, ut aqua fortis & spiritus illi acidi, &c. sub-
de tamen antidota contra alia venena commendave-
nt, (a) quod multi olim capere vix potuerunt.
eciatim pro cicuta antidoto DIOSCORIDES laudat
num purum largiter sumptum. In his venenis, quan-
æ gri initio non vomunt, ut vomitus facilitetur,
rtari emetici, vel vitrioli veneris grana ij. vel iij. cum
tupo & aqua multa tepida dari apte possunt. Deco-
tamarindor. cum cremore tartari & manna, item-
e feri lactis potus copiosus, lactis ebutirati, immo
ipsius lactis, hic etiam egregie confert, subjunctis
sine roborantibus & theriaca. Purgantia fortiora ejus-
m fere sunt indolis, eorumque violentia in hyperca-
arsi vel hyperemesi his quoque cohibenda.

X X.

Si venena sunt ex obstruentium, inspissantium sive Si ob-
regulantium classe, ut viscum, semen spyllii, saccha- struens
n saturni, vinum lithargyrio corruptum, hæc diluen- vel me-
, dissolvenda & evacuanda, diluentibus aqueis, inci- chanica.
antibus, attenuantibus, fero lactis, aquis medicatis,
ibus mediis, immo si saturnina, ipsis mercurialibus,
& plumbum solvere & mobile reddere valent. Me-
cha-

(a) Ut Plinius Hist. Nat. lib. 27. Cap. 2. Aconi-

chanica & nominatim *adamas* vix medelam admittunt, præsertim cum ipsum datum esse Medicus haud facile comperiet. Cetera autem vix aliter quam inviscantibus, pinguibus, oleosis, pultibus, ex oryza aut fagopyro, iuiculis, emulsionibus & lacte corriguntur. *Calx* vel *gypsum* assumptum curantur vomitu aqua tepida cum oleo aut butyro excitato, postea diluentibus & mucilaginosus modo laudatis.

X X I.

Si narcoticum. Sin ex *narcoticorum* & *soporiferorum* familia, §. XII ut opium, hyoscyamus, cynoglossum, solana, Bella donna, &c. quæ sensus turbant, atque etiam *alcalico* & *sulphureo narcotico principio* gaudent, præmissis emeticis, §. XIX. & in plethoricis larga venæ sectione, ea quæ excitant, ut extus volatilia & *acetum*, præsertim calidum, naribus sæpe cum spongiola ac pulsibus adhibenda, intus vero sæpe *acetum* quoque calidum aut *succus citri*, *limoniorum*, vel *aurantiorum* & similes §. XIX. cum aqua calida, vel infuso theæ aut coffeæ sæpius danda, quæ valentissima horum, ut & in ebriantium, ac sopore inde orto, sunt antidota, præsertim si ægri sæpius moveantur, atque vellicentur donec expergiscant, non neglectis excitandi gratia *clysteribus acris*: denique in regimine sudorifero aliquandiu continendi.

X X I I.

Venena in sanguinem ingressa. Quando *venena* jam in sanguinem penetrarunt, id quod potissimum patet, si anxietates & palpitaciones cordis adsunt vehementes, & sensus plus minusve læsi, si, tunc præter largum usum infusorum aquosorum calidorum ut coffeæ, theæ, scordii, salviæ, contra venena acida, alcalica, theriaca, vel & spiritus salis ammoniaci, modica, sed sæpius repetita dosi exhibenda contra venena vero alcalica, *acetum* simplex vel compositum quoddam, *succus citri*, *limoniorum* vel *aurantiorum*, vel mixtura simplex & similia, cum regimine diaphoretico; quo scopo etiam *balnea*, a Celso aliisque jam commendata, egregie prodesse possunt.

X X I I I .

Destruēta vero sic tandem veneni violentia, id quod *Postea*
ex symptomatum remissione & sensuum restitutione *roboran-*
potissimum patet, omnis generis roborantia, ut bona *dum*.
juscula, emulsiones, gelatinæ, mucilagines hordei, avenæ,
fagopyri, oryzæ, ova forbilia, theriaca, vinum genero-
sum cum blandis aromatibus, aquæ cardiacæ, quies
mentis & corporis conducunt.

X X I V .

*De Ovis Barbi piscis, Mytulis venenatis, Cantharidibus
& Hirudinibus assumptis.*

Ova barbi piscis §. XII. comesta, si choleram cum *Curatio*
ventris torminibus faciant, sicut in alia cholera, co- *veneno-*
pioso potu jusculi vel aquæ tepidæ, cum vel sine oleo *rum ex*
mixtæ, acrimonia irritans illorum est eluenda atque *regno a-*
evacuanda; postea aliquoties theriacæ ʒʒ. cum vino *nima-*
mero calido, vel cum aqua menthæ aut cinamomi *lium*.
danda, donec symptomata quiescant.

Si qui theriacam metuant, vel ægri eam aversen-
tur, vinum calidum cum pipere vel cinamomo exhi-
beatur. Ita si quis a *mytulis comestis brevi nauseam &*
dolores ventriculi sentiat, proderit mox, sumpto quodam
emetico, superingesta aqua vel mulsa tepida, vomitu
eos e ventriculo expellere, & postea ventriculum the-
riaca ac vino mero calido, tamquam omnium fere ve-
nenorum antidoto, rursus roborare.

Si vero vomitus vel cholera jam adsit, ut in ovis
barbi piscis posuimus, & hæc curanda. Si a *canthari-*
dibus assumptis mala metuuntur, proderit ipsas proti-
nus vomitu, aqua tepida concitato, addito simul oxy-
melle vel simplici vel squillitico, rursus ejicere, vel
& decocto tamarindorum cum cremore tartari per al-
vum expellere. *Sin vero jam ardorem ac dolores in ve-*
sica induxerint, sive intus fuerint assumptæ, sive ex-
tus tantum applicatæ, lac bubulum largiter haustum
præstantissimum eorum est antidotum, dolores brevi le-

niens, vel si in febris acutis id contingat, *emulsion-
es* ex sem. 4. frig. largiter haustæ. Ad *hirudines* sive
sanguisugas a puero *deglutitas* §. XII. interficiendas;
TIMEUS cas. Med. Lib. VII. Cap. XIX. *muriam cum
aloe bibendam*, & simul *decoctum anethi cum oxymelle*
simplici vomendi scopo præscripsit; quæ profecto satis
apta ad hunc usum videntur: interea tamen æger il-
le ex superveniente epilepsia mortuus est. Forte *oleum
olivar.* aut aliud quoddam hujus naturæ largiter as-
sumptum, cum vermes aliaque insecta interficiat, et-
iam has certius occideret, & læsiones inde inductas
reficeret.

X X V.

De Morsibus Viperarum & Serpentum.

Eorum
quæ
morsu
inferun-
tur.

Sequuntur tandem *medelæ illorum animalium*, quo-
rum *punctura sive morsus* venenatus est, ut sunt mor-
sus *viperarum*, quorundam *serpentum*, itemque *scorpii*,
canis rabiosi, aliorumque similibus §. XII. *Viperæ* qui-
dem *comestæ*, ut in medicina *adhibitæ*, nihil quic-
quam mali inducunt, sed *morsu tantum nocent*, (a) &
gravissima brevi mala concitant; atque nisi celeriter
succurratur, læsi inde pereunt. *Curatio* hætenus iis,
qui communem cum viperis patriam habent, consue-
ta & maxime commendata in ejusmodi læsionibus fuit;
ut mox supra vulnus *ligatura* applicetur, deinde vul-
nusculum *scalpello* ampliatur, *sanguis* probe *digitis* in-
de *exprimatur*, vel *cucurbitula* aut ore sani hominis,
ad modum *Psyllorum* extrahatur: deinde vel aqua sal-
sa, vel aceto & theriaca, vel & spiritu vini cum the-
riaca, venenum e vulnere probe eluatur: postea hoc
aceto & theriaca repleatur, splenium vel linteum em-
plastri loco, eodem remedio imbutum, vulneri super-
im-

(a) Ut jam Celsus L. V. Cap. 27. Lucanus Lib. IX. Pharsal. Rhedius, obs. & exper. de Viperis alique docuerunt.

imponatur, ut virus hoc tanto melius destruat, idque primis diebus sæpius renovetur. *Linderus* (a) suadet, ut spiritus sulphuris vel vitrioli gutta, ad venenum hoc alcalicum tanto promptius destruendum, ejusmodi vulneribus instilletur. Interne vulnerato *theriaca quoque cum vini generosi* largo haustu, quod teste *CEL-SO* fere omni veneno contrarium est (b), vel etiam cum aceto, sæpius detur, injuncto postea sudore in balneo, vulnere aperto, qui deinceps promovetur & utiliter conservatur infuso *scordii*, vel *salviae*, (c) addito aceto vel succo citri, sæpius assumpto: id quod per aliquot dies, donec symptomata periculosa præterierint, repetendum atque continuandum, ac denique vulnus balsamo vulnerario glutinatur.

STENTZELIUS post *morsum viperarum & scorpionum*, facta prius vulneris dilatatione & purgatione, commendat ut demorsus *clyssi antimonii sulphurati* quovis hiborio ad gutt. xxx. vel xl. ex infuso *oxylapathi* sumat, ita ipsum ab omni incommodo liberum esse permansurum asseverat. *Serpentum aliorum morsus* eadem ratione curandos præcipiunt.

X X V I.

Sed recentiores, ut de *radice mungos Kämpferi* nunc Novus nihil dicam, qui hanc pro certo contra hos morbos hos cu-
specifico describit, (d) duo alia remedia, tamquam randi
certissima illorum antidota celebrant; quorum alterum modus
est *axungia viperarum*, quam *Clar. Anglus Meadius*
certissimum ad hos morsus remedium, si modo vulne-
ratur, nullaque alia medicina interna opus esse
asseverat. (e) Alterum est *oleum simplex olivarum*, ab
Anglis quoque observatum & eodem modo usurpatum;
D d 2 quod

(a) Lib. de venenis. (b) Lib. V. Cap. 27. num.

(c) Forte & *echii* infusum hic proderit, cum nomen a græco *ἐχis vipera*, cum demorsis a vipera auxilii existimetur. *Tournef. Instit.* 136.

(d) In *Amœnit. exoticis*, pag. 577. (e) Lib. de venenis anglico, p. 29.

quod & toti membro læso illini potest ; sicut id uberius exposuit cel. VATERUS , in diff. de Antidoto novo *adversus viperarum morsus* , Vitebergæ 1736. edita. Magnopere optandum , ut experientia stupendus hic effectus tam vilis , domestici & ubique obvii remedii , uberius confirmetur & extra dubitationem vindicetur.

X X V I I.

De Scorpïi , Apum , Vesparum & Aranearum puncturis , itemque de morfu Canis rabiosi .

In *Scorpïi punctura* veteres contritum scorpionem ad venenum ejus extrahendum cum fructu supra vulnus imposuerunt (a) ; id quod adhuc. facere solent , ubi hæc animalia & læsiones sæpe occurrunt . Alii *oleum scorpionum* cum oleo olivarum paratum , ut certum antidotum commendant , vulneri instillandum eive illinendum , id quod forte *oleum olivarum simplex* modo §. XXVI. ad viperæ morsus laudatum , quoque præstabit , præsertim si certum est , quod serpentum & viperarum morsus tam egregie sanet . Ad *apum* , *vesparum* , & *aranearum* ictus curandos , *acetum* vel *simplex* vel *rutaceum* , aut *cum theriaca* , aut *bolo mixtum* , imponere egregie prodest . Alii commendant ut locus læsus dissecto *pyro* tantum vel *pomo* bene fricetur .

In *morsu canis aliufve animalis rabidi* quid sit faciendum supra jam pag. 290. & in institut. chirurg. pag. 160. docuimus . KÆMPERUS etiam hic *radicem mungos* ut infallibilem prædicat , in brutis æque ac hominibus , multis successibus comprobata , loco modo §. XXVI. citato .

Qui plura de venenis scire desiderat , ex veteribus Dio-

(a) Teste Celso Lib. 2. Cap. 27. num. 5.

Dioscoridem, ex recentioribus MEADIUM, (a) LINDERUM, (b) STENTZELIUM (c) & Lindestolpium (d) evolvere potest.

C A P U T X X.

De Aquarum medicatarum natura & usu.

I.

A Quarum medicatarum natura & Legitimus iis utendi modus, ob frequentem atque maxime salutarem hodie earum usum, & insignem in Medicina utilitatem, Medico probe debent esse perspecta. Hinc scire nosse debet, eas esse vel calidas, quæ thermæ vocantur, ut in Germania Wisbadenses, Emsenses, Aquisgranenses, in Bohemia Carolinæ & Teoplicenses, &c. atque in aliis Europæ partibus aliæ; vel frigidas. Utæque rursus sunt vel aquæ tantum purissimæ, ut ex frigidis Petersvvaldenses in Silesia aliæque, & ex calidis, Teoplicenses in Bohemia, ambæ tamen magnæ in utilitatis negotio utilitatis. Vel blando sale medio, aut calico, & terra alcalica præditæ sunt, ut Selserenses, Antonianæ, sive Tœnnigstemenses, & thermæ variæ; vel simul martialibus particulis, & ipso vitriolo maris imprægnatæ sunt, aquæ martiales inde vulgo dicuntur, ut Pyrmontanæ, Sualbacenses, Egranæ, Wildunenses, Geismarienses, Driburgenses, & multæ aliæ. Ideoque 2. uniuscujusque ingredientia sive elementa sciendum debet, ut tanto melius de ipsarum natura & ageneratione judicare valeat; 3. quibus in morbis convaleant,

Naturæ
aqua.
medicat.
scitum ne-
cessaria.

Dd 3

niant,

(a) Lib. De venenis. (b) Lib. De Venenis, Lugd. Bat. 1708. 12. (c) In Toxicologia sive Lib. de Venenis Francof. 1733. 4. (d) De venenis, (qui idem videtur ac Linderus) cum notis Stentzelii, Francof. 1739. 8.

niant, & in quibus minus; 4. *qua ratione recte usurpanda*, dum a recto usu quamplurimum boni affectus dependent; 5. *que dieta & quodnam regimen in earum usu ægris sint servanda*; & 6. *quomodo symptomatibus in earum usu subinde oriundis sit succurrendum*.

I I.

Elementa ipsarum.

Scriptores, qui de aquis medicatis olim scripserunt, easque obiter tantum examinarunt, ut *Tabernemontanus*, *Thurneiserus*, *Hornickius*, *Sebizius*, aliique plures, præter aquam varia eis adscripserunt elementa, quæ revera iis non insunt: ut nimum *vitriolum vulgare*, ob saporem atramento fere similem, *cuprum*, *sulphur vulgare*, *alumen*, *nitrum*, *ochram*, *succinum*, immo & ipsum *arsenicum*, pessimum scilicet illud venenum in nonnullis inesse, varias ob rationes crediderunt, atque sic multos tam Medicos, quam ægros ab usu earum saluberrimo temere deterruerunt.

Tot autem ac tam diversa elementa, in aquis medicatis saltem Germaniæ, non reperiri, sed eas longe simpliciores esse ac pauca tantum & quidem nulla profus noxia, sed mere salutaria ac tuta eis inesse elementa, recentiorum industria detexit, *aquam* scilicet primo *purissimam*, & *terram subtilissimam*, *alcalicam*, deinde in quibusdam *sal* quoddam *alcalicum* vel *mixtum*, in aliis *martiales* particulas, & *vitriolum martis*, quod spiritum acidum sulphuris aut vitrioli subtilissimum continet, quæ aquæ propterea *martiales* & multis *acidulæ* vocantur, sicut ex infra dicendis uberius patebit. Interea vero sciendum aquas *martiales acidulas* dictas, non ob spiritum acidum, licet revera iis insit, suos effectus, ut multi putarunt, primario præstare, sed potius *ob elementa alcalica*, prout hoc sequentia docebunt experimenta; sic, ut non satis apte *acidulæ* dicantur: præsertim cum experientia doceat, eas in morbis ab acido & viscido oriundis, eisque quam pertinacissimis, optimo cum successu adhiberi, immo plerisque medicamentis aliis palmam præripere. Igitur ad nostram hanc sententiam primo de ita dictis *acidulis* sive aquis *martialibus* probandam, (nam de ceteris minus est dubium) *sequentia notanda experimenta*, quæ

quæ & simul ceterarum naturam illustrant ac demon-
strant.

I I I.

Aquæ martiales vel acidulæ *Pyrmontanæ*, *Sualbacen-* *Experi*
ses, *Egranæ*, *Spadanæ*, *Driburgenses*, *Wildungenses*, *menta*
Geismarienses, aliæque similes, recens ex fonte desum- *cum his*
ptæ, sensibus externis varia ostendunt. 1. *Visu* perci- *aquis*.
pimus gratam *pelluciditatem*, quæ tamen caloris lacte-
scentis vel cœrulescentis aliquid *cum multis bullulis*
continet, quibus a vulgaribus aquis valde distinguun-
tur; quæ vero, si pulvis gallarum eis injicitur, colo-
rem ex atro rubentem sive fuscum assumunt.

2. Si *naribus* ope vitri, recens ex fontibus haustæ,
mox admoveantur, percipitur in eis *volatilis quidam*
vapor, gratam in naribus vellicationem excitans,
quem plerique olim pro *spiritu acido*, volatili, alii
pro *alcalico*, spiritui salis ammoniaci analogo, haberi
voluerunt: quorum tamen neuter hucusque per certa
experimenta demonstrari potuit; sed nil nisi aer vel
æther subtilissimus in iis contentus, qui bullulis illis
inclusus; esse videtur, præsertim quando aquæ hæ ope
vitri puri e fonte subito hauriuntur.

3. *Gustu* percipimus *saporem acriusculum*, gratum ta-
men, ad acidum vini Rhenani generosi aliquo modo
accedentem, quo a simplicibus aquis valde distinguun-
tur. Hinc jam ab antiquissimis temporibus fonte Sual-
bacensem *primarium fontem vinosum* incolæ appella-
runt, præsertim cum & multos bibentes, quando
ejusmodi aquas bibunt, initio quasi ebrios & temulen-
tos sæpe faciant.

I V.

4. Multis, & præsertim iis, qui his aquis non as- *Conti-*
ueti sunt, *sapor vitriolicus* videtur, vel ad *atramen-* *nuantur.*
um aliquo modo accedens, id quod etiam non est si-
ne ratione, nam *revera vitriolum martis* ipsis inesse,
idque saluberrimum, subsequutura experimenta osten-
tent.

5. In aliis supra N. 1. nominatis aquis salutaribus,
quæ *martem haud continent*, hic *vitriolicus* aut *vinosus*
sapor non percipitur, sed plus minus vel *salsus*, prout

magis vel minus salibus alcalicis aut mediis abundant; quemadmodum *id aquæ Selserenses*, atque plerarumque thermarum manifeste docent.

6. Si *chemice examinantur*, & *martialium aquarum* sufficiens copia cucurbitæ immittitur cum alembico, supposito leni igne, prius ascendit vapor, qui in guttas collectus, aqua est pellucida, simplex, sine sapore aut odore notabili, nisi levi empyreumatico, quæ in vase recipiente colligitur. Superficie huius aquæ & alembico se affigit interne *pellicula subpinguis*, varii & ad iridem accedentis coloris; *nullus vero spiritus*, neque acidus, neque alcalicus, ullo modo sic percipi aut colligi potest.

7. Si destillando pergimus, nil aliud nisi aqua, ut antea, simplex semper transcendit, sed remanet in fundo tandem cucurbitæ materia terrea, *flavescent*, & *albicans*, *exigua copia*, in quibusdam tamen majori, in aliis minori, (a) saporis & odoris fere expers, quia maxima ex parte est terra subtilissima alcalica, ex qua nullum alumen, nitrum, sulphur, succinum, ochra aut vitriolum cupri, vel cuprum vel plumbum, vel aliud metallum, multo minus arsenicum, aut simile quid venenati aut noxii extrahi potest; verum accuratiori examine constat, in terra illa hæere sal aliquod amaricans, medium, ut Anglicanum, Ebsonense, vel mirabile Glauberi, in quibusdam rursus majori, in aliis minori copia, (b) & simul, quod caput rei est, *martiales quoque particulas*, quæ verus crocus martis naturalis sunt, atque fusione igne follium in verum martem, quem magnes trahit, redigi potest, *nullum vero sal*

(a) Ex libra una aquæ Egranæ gr. xxxii. Selterensis gr. xxx. Pyrmontanæ gr. xxii. Sualbacensis & Spadanæ gr. x. Confer. *Wagener* de aquis Geismar. p. 64.

(b) In Pyrmontanis in libra j. salis medii gr. vii. ad x. continentur; in Egranis & Selterensibus grana plura; in Sualbacensibus & Spadanis, pauciora.

aut metallum vel minerale aliud. In ceteris vero
 nis medicatis, quæ non vitriolicum aut ferreum, sed
 utum acriusculum, sive salinum continent saporem, ut
 lferenses, & thermæ præcipue, præsertim Emsenses,
 rolinæ, & præterea aquæ amaræ Bohemicæ Seidli-
 ses, præter terram alcalicam, nil nisi sal quoddam
 tinetur medium amarum, ad Glauberianum maxime
 cedens; aliæ vero, ut thermæ Wisbadenses, sal quo-
 e medium, sed magis ad vulgare sive culinare ac-
 dens, continent; Tæplicenses autem non nisi ex aqua
 plici pura, ac levi constant, quamvis calide e ter-
 propullulent.

8. Simulac aquæ martiales igne multum incalescunt,
 vi perdunt illum gratum odorem & saporem, N.
 I. neque a gallarum pulvere amplius tinguntur: im-
 ipse vapor exhalans nullum præbet vel odorem vel
 orem.

V.

Si materia remanens ulterius examinatur, naturam
 m alcalinam sequentibus experimentis manifestat. Ni-
 rum quando ei spiritus acidus, ut spiritus vitrioli,
 anditur, effervescit, & spiritus acidus saporem suum
 dum mutat: unde noscimus terram hanc materiam
 acido contrariam, sive acidum destruentem, hoc
 , alcalicam, ut a Medicis & Chemicis vocari so-
 , a qua virtute & ab aqua magni ac fere præcipui
 etarium fontium effectus merito deducendi.

Alcali
 in eis
 proba-
 tur.

V I.

Ut autem præterea adhuc specialius sciatur cujusnam
 ure sit hæc terrea materia, si sufficiente copia colle-
 & crucibulo indita in ignem fabrorum ferreorum
 s diu, donec fundatur, immittatur, sensim per fu-
 tem, sine alia re addita, mutatur in nigricantem
 cineream massam, quæ in pulverem redacta a ma-
 te attrahitur, sicut limatura martis, & saporem simul
 et ferreum atque subadstringentem: unde constat,
 era martiales particulas quam subtilissimas, hoc est,
 tem, non cuprum, plumbum, aut aliud metallum
 ium his aquis inesse.

Mars
 ostendi-
 tur.

VII.

*Alcali
uberius
demon-
stratur.*

Præterea, quod virtus harum aquarum non acida, sed alcalica sit, uberius docet, si hæ aquæ cum sirupo bono violarum miscentur. Nam si acidulæ recentes, vel saltem nondum corruptæ, (id quod & de reliquis aliquis medicatis valet) ei affunduntur, mox ejus color cœruleus mutatur in viridem; sicut ab aliis alcalicis. Deinde si rosæ, aut violæ, aut flores cyani in hac aqua coquantur, colorem viridem acquirunt, qualem adipiscuntur ab affuso oleo tartari per deliquium tamquam principe alcalicorum. Porro cum affuso spiritu acido & etiam cum vino rhenano effervescent, ut alia alcalica & lac ab iis affusis non coagulatur; sed potius iis affusis diutius a coagulatione præservatur. Ex his & pluribus aliis ejusmodi experimentis satis probatum esse existimo; naturam & virtutem harum aquarum esse alcalicam, id est, acido contrariam, diluentem, resolventem, martialem ac roborantem, aperientem & diureticam, contentaque earum non adeo multa ut veteres putarunt, sed pauca eaque valde esse simplicia easque nihil de metallo noxio, multo minus venenati neque cetera illa salia, sulphura aut mineralia continere quæ vulgo ipsis olim attribuerunt.

V I I.

*In martialibus
inest vitriolum
martis.*

In martialibus tamen fontibus etiam aliquid vitrioli inesse docet sapor vitriolicus, atramentosus, & color nigricans; si gallarum pulveri affunduntur: quod vero non est vitriolum vulgare aut cupri sive veneris quod ventriculo & sanitati valde est adversum; sed vitriolum martis blandum, ex martialibus ab acido sulphuris vel vitrioli sub terra solutis particulis constans idque in modica copia, a quo varii salutares harum aquarum, de quibus infra, dependent effectus. Probatur vero, spiritum ejusmodi acidum his aquis inesse ex eo, quod, si sal ex iis paratum sufficienti copia colligatur, & cucurbita igne arenæ destilletur, spiritus acidus, spiritui sulphuris vel vitrioli simillimus indobtinetur, qui sensim præsertim in calore martem relinquit, alcalicas & terreas harum aquarum particulas ingreditur, atque cum eis sal illud medium, amarum

um, quod in iis deprehenditur, constituit, facitque
c, ut vitriolum, (quod quidam male per calorem
volatile fieri & avolare crediderunt, quasi ferrum vo-
re possit) inde educi queat, licet revera iis infue-
t. Atque huic sapor acriusculus, vitriolicus in recen-
sus & color nigricans, si cum gallis miscetur, immo
ta mixtura, crasis, vis purgans, mixturæ conserva-
o, aliaque debentur phænomena & effectus, quos
ulti comprehendere & explicare non potuerunt: (a)
que propterea tam spiritum hunc acidum quam vi-
olum martis in eis vel prorsus negarunt, vel tam
latilia ea statuerunt, ut a levissimo calore ea avola-
crediderint, (b) quæ tamen minime volatilia exi-
nt, sed fixa & solum transmutantur, eadem scilicet
orsus ratione, ut, quando in præparatione *tartari*
triolati Takentani solutio vitrioli vulgaris & salis tar-
ti, vel cinerum clavellatorum commiscentur, spiritus
adus, quem vitriolum veneris continebat, venerem
inquit, & salia hæc alcalica ingreditur, ita ut vi-
olum postea, quod revera paullo ante adfuit, non
pius, reperiri & ostendi queat, licet non avolave-

I X.

Cognitis sic veris aquarum salutarium principiis, *In qui-*
ratione & experientia concludere possumus, eas ge- *bus mor-*
ratim ad humores crassos, viscidos, tenaces, pitui- *bis pro-*
os, falsos quoscumque & cumprimis acidos, corri- *sint.*
idos, temperandos, fluxiles reddendos, atque ad ob-
actiones referandas valere. Hinc *in morbis*, qui a
guine spisso & viscido, quorum quamplurimi sunt,
ab acido, vel ab obstructionibus viscerum oriuntur,
egie profunt, & imprimis etiam propterea condu-
cunt,

(a.) Conf. Scipp. de Aquis Pyrmont. Wagner. de
uis Geismariensibus, & Diss. nostra de Aquis pyr-
tanis. 1732. edita. (b) Ut Fr. Hoffmannus in
ert. de Aquis medicatis, & Boerhavius, Elem.
em. Tom. II. Proc. 162. magni hi Medici & Che-
ti existimarunt.

cunt, quia vi sua evacuante, diuretica & purgante noxios simul & supervacuos humores ex corpore, vel per alvum, per urinam, blande ac sine omni, si modice & recte usurpantur, virium prostratione expellunt. Ita in universum *etiam iis sunt valde salutare, qui ob vitam sedentariam* multas in corpore & præsertim primis viis cruditates sive vitiosos humores ac flatu accumulunt, omnibusque illis, *qui nimio vini aliorumque spirituosorum potuum abusu*, sanguinem nimis æstuantem reddiderunt, vel aliam ob causam de sanguine nimis fervido conqueruntur: nam his egregium refrigerium præbent.

X.

Speciatim capit.

Speciatim vero egregie conducunt variis *in capitis affectibus*, inprimis *qui per consensum ventriculi* oriuntur; ut in vertigine stomachica & hypochondriaca, cephalalgia, morbis soporosis, comate, caro, apoplexiæ metu, melancholia, mania, epilepsia, memoriæ debilitate, catarrhis oculorum, visus debilitate, tinnitu aurium & auditu difficili, aliisque morbis capitis, qui a viscidis, pituitosis & acidis humoribus oriuntur.

X I.

In pectoris & infimi ventris.

2. In variis *pectoris affectibus*, a similibus causis oriundis: ut in dyspnœa, asthmate, tussi, immo & in ipsa hæmoptysi, ubi nondum adest pulmonis exulceratio notabilis, ac denique in cordis palpitatione.

3. In *affectibus infimi ventris*, ut in stoda seu ardore ventriculi, in cardialgia, vomitu frequenti, diarrhœa, ventriculi debilitate, nausea, appetitu prostrato, pica, lumbricis, malo hypochondriaco, & præcipue in principio obstructionis hepatis aut lienis, vel saltem nondum inveterata; in scorbuto & cachexia nondum nimis inveterata, nimia obesitate, ictero; sic & in sabulo renum & parvis calculis, in doloribus lumborum scorbuticis, in ardore urinæ, sive stranguria, ac denique in colica, e pituita acida, biliosis humoribus, aut flatibus oriunda. In variis præterea *uteri affectibus*, passione hysterica, & uteri suffocatione, in chlorosi, sterilitate, mensibus obstructis vel nimis fluentibus; in hæmorrhoidibus obstructis aut nimium fluentibus.

us. Præterea nec gravidis nocet, sed potius eis multis morbis egregie tam præservandi quam curandi scopo conducunt, si modo paullo parciori copia & circumpecte bibantur.

X I I.

4. In artuum morbis, ut in arthritide tam simplici In artuum
quam vaga scorbutica; in podagra non confirmata, in
doloribus artuum quibuscumque, in paralyticis affecti-
bus, in impuritatibus sanguinis & cutis, ut scabie, pru- & feb-
ritu cutis, gutta rosacea, herpete, serpigine, ulceribus
dum, œdematibus, tumoribus & variis in doloribus
rhiadicis & rheumaticis.

5. Tandem in omnibus febribus intermittentibus egre-
e profunt, quas continuato usu, si modica simul ser-
tur diæta, perfectissime plerumque tollunt & sanant.

X I I I.

Ratione ætatis hominibus mediæ ætatis omnium quidem Ætatis
time conveniunt, nimirum ab anno 18. circiter usque
60. Juniores vero; præsertim ii, qui sunt infra an-
nam decimum, ob teneriorem viscerum compagem,
s, præsertim martiales, minus commode ferunt, sic
senioribus, qui ultra sexagesimum annum, rarius sa-
proficua sunt, nisi forte sint robustiores, & eis ce-
roquin jam assueti. Interea tamen casus & præsertim
etici, ubi etiam pueri juniores eis, maxime Selseren-
bus, aut Emsensibus aliisve similibus & cumprimis
m lacte remixtis, optimo cum successu sæpe usi sunt
adhuc uti possunt, verum copia longe minore quam
ulti.

X I V.

Verum raro proficiunt in ulceribus inveteratis pulmonum, Ubi mi-
phthisi; aliisque symptomatibus, ab ulcere tali pen- nus pro-
ntibus, cumprimis martiales fortiores; attamen si ulce- sunt.
nondum sint inveterata, & calidæ atque cum lacte
imperatæ bibantur, tam Selserenfes quam martiales, e-
egre sæpe profunt. Sic & in ulcere renum aut vesicæ, mo-
rate & calide adhibitæ, valde conducunt, atque in pri-
is hic ab HEERIO & Fr HOFFEMANNO, experientia
octis, Spadane potissimum laudantur, si diu usurpantur.
In hæmoptysi, præsertim si ab exulceratione pulmonis
ori-

oritur; aquæ medicatæ & sigillatim martiales, *frigide ut plurimum nocent*; *calidæ* vero, ut thermæ blandiores, v. gr. Emfenses, & aquæ Selseranæ, cum vel sine lacte, tepide haustæ multum *proficiunt*.

Abstinendum etiam a martialibus in dysenteria, in calculo renum & vesica majore, itemque in hydrope confirmato. *Selserenses* vero in dysenteria proficua sunt. In *œdemate* vero pedum & leucophlegmatia sive *hydrope leviori* & martiales & thermæ, sæpe egregie profunt. In *affectibus venereis* & *gonorrhœa*, morbum quidem non sanant: attamen corpus ad faciliorem sanationem disponunt, ideo cum fructu hic etiam præparationis causa adhiberi possunt. In *gonorrhœa* vero *benigna* a laxitate partium proveniente, post multa incassum sæpe tentata, vi sua roborandi multum præstare solent.

XV.

Modus
eis uten-
di.

Omnibus, qui aquis medicatis legitime uti volunt, & *plethorici sunt*, suadendum, ut aliquot dies *ante usum* earum, *sanguinem mittant*; ita enim aquæ hæ tanto facilius vasa intrare & postea reliquum sanguinem melius corrigere possunt, præcaveturque ne vasa ab aquis nimis distenta, nimio sanguine jam quasi infecta, postea morbum aliquem producant, & deinde, ut mox dicetur, *idoneo purgante* utantur.

Si vero non sunt plethorici, venæ sectione non est opus; attamen sicuti illis, quibus sanguis prius fuit missus, ad *cruditates* in primis viis *evacuandas*, quæ effectum aquarum impedire possunt, maxime ubi vita sedentaria vel prava diæta prægressa est, *idoneum purgans est præmittendum*, v. gr. ex pilulis nostris polychrestis, vel tartareis, Quercetani, Schrœderi, aut Bontii, vel balsamicis gr. XIII. vel XV. ad XX. cum regimine. Vel ex *salinis*, tartarus vitriolatus, tartarus solubilis, aut cremor tartari ʒj. ʒiſſ. ad ʒij. cum aqua, vel cum ipsis aquis medicatis assumpta; quibus salibus, si ægri sint robustiores, grana aliquot pulveris jalappæ addi possunt, vel quod hodie usitatus, *salia amara cathartica*, ut Anglicanum, Seidllicense vel mirabile Glauberi, ab ʒiſſ. ad ʒj. exhibendum.

Si

Si potiuncula desideretur, purgans Sydenhamii vel anagettæ, aut nostra sequens apta erit.

℞. tamarindor. ℥ss.

fol. fenn. el. ℥iij.

crem. tartar. ℥ss. ad ℥j.

all. per momentum in f. q. aquæ simplicis,

Colatur. ℥iij. adde

mann. calabr. ℥j. M.

tur mane una vice cum regimine, vel

℞. fol. fenn. el. ℥iij.

rhabarb. ℥j.

passul. min. ℥ss.

sem. anisi ℥j.

tartar. vitriolati ℥ss.

ande in f. q. aquæ simplicis tepidæ, stent per no-

m in loco calido, mane leviter ebulliant, colaturæ

℥iij. add. sirup. de cichor. cum rhabarb. ℥j. aquam

amom. ℥j. M.

Fugienda hic sunt omnia drastica purgantia, inprimis nola, scammoniata, helleborata, &c.

i indicationes ad vomitum adsint, ut dolor & gravi-ventriculi, amarities oris, nausea, conatus vomem-

aut qui alias facile vomunt, illis etiam aliquot

us ante usum harum aquarum lene emeticum egre-

cum successu datur: ut tartar. emet. gr. ij. vel rad.

ecacoannæ ℥i. aut gr. XXV., vel etiam aq. bene-

Rul. ℥ss. aut ℥ij.

X V I.

Tempus anni, quo aquæ medicatæ optimo cum suc- *Tempus.*
bibuntur, sunt Junius, Julius & Augustus; ve-

si necessitas urgeat, jam mense Majo, vel etiam

embri adhuc, inprimis tempestate calidiori; com-

e usurpari queunt, immo in certis casibus etiam

ne & autumnio iis uti possumus.

Tempus diei aptissimum est matutinum, hora nempe

ma, immo si tempus favet sexta, ut hac ratione

operationem suam ante prandium commode ab-

ere possit. Non autem probamus morem illorum,

hora quinta vel quarta jam ad fontes currunt, ob

m plerumque tunc adhuc nimis frigidum, nebulo-

sum,

sum, transpirationi adversum, tusses aliosque pectoris & capitis morbos facile inducentem, ut & ob somnum non sufficientem, & præmature abruptum.

Nonnulli etiam a meridie hora quarta aut quinta, eodem modo, ut matutino tempore *has aquas bibere olim consueverant*; verum hic mos apud nos hodie exolevit: nam corpus inde nimis defatigatur, & sic incommoda potius quam comoda corpori infert, inprimis vero, qui debilem habent ventriculum, a potu harum aquarum pomeridiano abstineant: in aliis vero, *si sitis urgeret*, haustulus unus vel alter aquæ, pauxillo vini temperatæ, sine noxa assumi potest, vel etiam, ut hodie moris est, *haustulus Coffeæ*.

X V I I.

Ratio bibendi. Modus vero quo aquæ medicatæ atque acidulæ optimè bibuntur ex mea sententia sequens est. Sumitur scilicet vitrum hujus circiter capacitatis, ut duo vel tria libram unam continere queant & primo die libram unam vel $\frac{1}{2}$ libram, secundo duas, tertio die tres vel quatuor assument, neque facile plus bibendum, nisi homines sint valde robusti; quia multi nimia copia sibi nocuerunt; & tali mensura, quam commode ferunt, continuatur per 12. 14. vel 18. dies, immo per tres hebdomadas vel diutius, pro diversitate morborum & ægrorum, atque sic tandem sensim rursus descendi solet sicut antea inceptum est, ut scilicet circa finem libras duas bibant, & denique una libra finem imponant.

X V I I I.

Effectus harum aquarum. Aquæ hæ in nonnullis per urinam, in nonnullis per alvum, in plerisque per utramque viam operantur. Utraque operatio consulta, salutaris & bona est, nec turbanda: non enim semper opus est, ut multum, sicut plerique credunt, per alvum quotidie purgentur; sed sufficere potest, si modo alvus quotidie respondeat, aut solum bis vel ter exoneretur. In eis tamen, *ubi propterea alvum non movet*, aut obstructions incidunt, unde incommoda metuenda, conducit, ut subinde salis cujusdam cathartici $\frac{3}{4}$ mane in primo haustu sumantur.

X I X.

Inter bibendum observandum; ne aquæ confertim n- *Qua va-*
 is, nec uno quasi impetu ingerantur, ne ventriculus *tione bi-*
 s obruatur ac lædatur: sed postquam unum vitrum *bendum.*
 vacuarunt, per X. vel XII. horæ minuta, vel quar-
 am quasi horæ partem deambulandum est; tunc ite-
 am unum aquæ vitrum assumendum, & sic alterna-
 m bibendum & deambulandum, donec integra portio
 atra spatium circiter unius & dimidiæ, vel duarum
 orarum assumpta sit. Postea corpus leni ambulatione
 ontinuo exercendum usque ad tempus prandii. Si in-
 rea alvus vel urina urget non sunt cohibendæ, sed
 ox & mature exonerandæ; ne incommoda inde orian-
 ar, & effectus aquæ impediatur.

X X.

Qui ventriculum habent nimis frigidum aut debilem, *Quando*
 t tempus simul est frigidum aut pluviosum, vel qui *calide*
 morbis pectoris laborant, aut aliam ob causam frigi- *bibendæ*
 um potum perferre nequeunt, illi aquas medicatas in
 qua calida leniter calefieri curent; nunquam vero ni-
 mium calefiant, quia alias naturalem odorem, sapo-
 rem & vires facile amittunt, vel hæ saltem qualitates
 onæ minuuntur.

X X I.

Qui tenerioris sunt constitutionis, illis minor aquæ co- *Quanti-*
 a sufficit; simulac enim sentiunt, novem v. gr. vitra *tas a-*
 tis purgare, vel per urinam bene transire, non ad- *quæ.*
 endant ad maiorem copiam; quoniam hæc quantitas
 fectum sufficientem præstabit, & major copia læde-
 t. In genere moderata operatio a parciore copia a-
 nã, si modo diutius continuatur, v. g. tres hebdoma-
 as, aut pro morborum varietate diutius, est effica-
 ssima.

X X I I.

Tandem & notandum, aquarum vires plerumque mul- *Ubi hæ*
 esse valentiores, si ex ipsis fontibus bibantur, quam si *aquæ o-*
 alia loca transferantur: quia in multis naturalis *ptima.*
 mpositio elementorum intra aliquot hebdomadas sol-
 tur, saporque & virtutes pereunt, vel saltem valde
 minuuntur. In Pymontanis tamen & Selteranis diu-
 us plerumque durare solent, quam in plerisque aliis.

*Cautela
quæ-
dam.*

Motus in prodeambulando numquam sit nimis vehemens, ne inde oriatur sudor; sudores enim contrarii sunt operationi per urinam & alvum, atque propterea facile varia incommoda inducunt.

Inter bibendum si flatus percipiuntur, aut ventriculus debilis sit, an forte doleat, subinde cortices aurantiorum vel sem. scenic. carvi & anisi, saccharo obducta, comedi possunt.

X X I V.

Dieta.

Ut ab aquarum medicatarum usu optatus obtineatur successus, sollicita victus ratio est necessaria, & quidem prandium hora XII. Cœna vero hora septima instituitur, & prandio sit parcior.

Numquam autem ventriculus nimis cibo aut potu est replendus; sed parce & edendum & bibendum, atque semper cum aliquo appetitu surgendum,

X X V.

*Cibi ine-
pti.*

In universum ex cibis noxii sunt omnia tenacia, exsiccata, fumo indurata, sale condita, pingua, carnes vetustorum animalium, carnes suillæ, viscera animalium, anferes, anates, pisces limosi, saliti vel exsiccati: ut anguillæ, carpiones, aselli, haleces veteres, omnes fructus horæi, brassicæ, pisa, fabæ & lentescæ, fungi, lacticia, frigida, aut nimis crassa & coagulata, farinacea, pultes, acetaria, cucumeres, melones, ova dura, caseus, &c.

X X V I.

*Cibi li-
citi.*

E contrario cibi liciti sunt omnes, qui facilis digestionis, ut carnes juniores, bubulæ, agninæ, vitulinæ, pulli, galli, capones, columbæ juniores, feræ juniores, omnis generis aves sylvestres; ex piscibus omnes teneriores, ut truttæ, juniores lucii, omnis generis bonajuscula, tum ex animalibus, tum vegetabilibus parata, ut ex hordeo, avena; præterea cerasa & poma cocta, spinachia, asparagi, fabæ, phaseoli & pisa recentia. Panis sit bene coctus, & non nimis vetustus.

X X V I I.

*Potus
qualis.*

Pro potu ordinario in pastu optime inservit vinum quoddam bonæ notæ, blandum, neque acidum, neque nimis forte, & quidem, si ob sitim id fieri possit, in pran-

prædudio sine admixta aqua, ne ventriculus inde labefactetur ; attamen in copia non excedendum, sed solum pro siti sedanda, ad ℥ss. vel ad summum, robustioribus ℥j. ad ℥ijss. concedi potest . Quibus vero solum vinum sitim non compescit, ii parum aquæ, præsertim in cœna, admiscere possunt .

In regionibus, *ubi vinum non habetur*, vel ægri nimis pauperes sunt, ut solvere vinum nequeant, cerevisia bene cocta loco vini uti possunt .

X X V I I I .

De *motu corporis* jam supra N. XXIII. dictum, quod frequens, sed lenis esse debeat : nocet enim nimius cursus aut saltatio vehementior præsertim calidioribus, aut tempestate nimis calida . Interea tamen *frigidis ac pituitosis*, paullo fortior motus, præsertim circa finem curationis, ad initium scilicet sudoris, me iudice, concedi potest ; temperamentis vero calidis minus . Magis autem *a nimia vita sedentaria sibi caveant*, imprimis mox post aquas assumptas, aut post pastum, ubi multi nimis cito lusibus sedentariis indulgent : inde vero matutino tempore aquæ non transeunt, sed remanent in corpore, aut post pastum cibus non bene digeritur, unde necessario *flatus, colici & ventriculi dolores, diarrhœæ, vomitus*, aliaque mala oriuntur . Ita etiam *post pastum somno se tradere noxium* deprehenditur, dum capitis gravitatem aliaque mala producere solet .

De motu & somno .

X X I X .

Interea tamen nonnullis in casibus *aquæ salutares etiam in lecto bibi possunt*, præsertim si necessitas id exigat, ut in arthriticis, paralyticis, hecticis morbis, mensibus nimis, aliisque debilitatibus laborantibus, &c. Immo *Slarius, Anglus Medicus*, etiam sanis & vegetis persuadere vult, ut aquas has in lecto bibant ; quod vero multa incommoda secum fert, motusque moderatus huic modo præferendus .

X X X .

Animi affectus, curæ nimis, ira, terror, tristitia, maxime cavenda, sed potius tempus ambulando, gratis societatibus & colloquiis, vel lusibus ambulatoriis terendum . Sic & a venere eo tempore abstinendum, vel saltem rarissime exerceatur : quoniam jam corpus

Animi affectus .

per multas evacuationes alvi & urinæ aliquo modo debilitatur, adeoque sic nimis debilitaretur.

X X X I.

Quid post cœnam faciendū. Post cœnam, quæ satis mediocris esse debet, & in qua vinum aqua temperari potest, rursus per horam circiter leniter deambulandum, antequam somno quis se tradat, ita blandiori somno & quiete fruuntur.

Aer frigidus, nocturnus, ac præsertim pluviosus, quantum fieri potest, *vitandus*, ne insensilis transpiratio impediatur, id quod valde noxium; dum catarrhos omnis generis facile concitare potest.

De symptomatibus frequentioribus, in usu aquarum medicatarum occurrentibus.

X X X I I.

Alvi obstructio. Primo hic occurrat *alvi obstructio*: quæ si accidat, facile tormina, dolores colicos, vomitus, & alia mala producit. In primis vero illi obnoxii sunt melancholici, hypochondriaci & hysterici. Contra quod symptoma optime conducunt *laxantia*, imprimis *liquida*, sicuti potiunculam talem supra N. XV. dedimus; nempe ex tamarindis, foliis fennæ & manna, vel ex fenn. & manna, vel ex fenna, rhabarb. cum sirup. de cichor. cum rhabarb. vel decoct. laxativ. Managettæ, vel falia media, ut tartarus solubilis, aut tartarus vitriolatus zj. ad zjss. vel salis amari cathartici zij. aut zijj. ad zjss. mane in primo aquæ haustu summi potest. Cavenda vero omnia purgantia fortiora, præsertim calidiora & resinosa; quia facile magna tormina & hypercatharthes concitare solent.

X X X I I I.

Alvi fluxus. Ita & *Diarrhœa* interdum ægros affligit; quæ vero adstringentibus non cohibenda, quamdiu æger nullam notabilem inde percipit debilitatem. Sæpe enim pravi humores sic expurgantur cum ægri levamine atque illa sæpe usu harum aquarum continuato, §. XI. curatur. E contrario ubi ægri inde debilitantur, nausea ciborum & magna forte simul tormina adsunt, prudenter sisti debet. Quod fieri potest primo, si aqua medi-

tata pariori copia & calide bibatur, atque essentia stomachica ante & post pastum mediocrem assumatur. Sin vero hæc non sufficiunt, aquæ cinamomi, inprimis cydoniatæ, vel aquæ mastichinæ aliquoties in die aliquot cochlearibus utantur. Vesper, si forte hæc parum sunt, theriacæ aut diascordii ʒj. aut theriac. coëlest. gr. ij. vel iij. exhibeantur, & in malo vehementiori, ab aquæ potu per diem unum vel alterum prorsus abstineant; donec melius rursus se habeant.

Externe eadem ventriculo applicari possunt; quæ alias in diarrhœa, e g. balsam. stomach. vel emplastr. ex theriaca, vel tacamahac. &c. supra præscripsimus.

X X X I V.

Vomitus etiam in usu harum aquarum, & speciatim *Vomitus*. initio nonnullos affligit; hic vero quoque duplicis est generis, vel *criticus* sive salutaris, vel *symptomaticus*. Si *criticus* est, fit cum ægri levamine, & humores noxii aquis his soluti, egregie sic expelluntur: ubi hoc solum observetur ne nimia copia ventriculum repleant, & subinde præter essentiam stomachicam, ante dictarum aquarum stomachicarum cochlearia aliquot assumant. Si vero vomitus est *symptomaticus*, & ex ventriculo debilitato, vel ob nimiam aquæ vel ciborum aut vini copiam ingestam oritur, parrior potus & victus instituendus, & similia stomachica assumenda. Sed si oriatur ex nimia bilis aut pituitæ copia, corpore antea non bene purgato; blanda purgatio conducit, & postea omnis generis bona stomachica, confortantia subjungenda. Interdum etiam vomitus in sequiori sexu oboritur a thorace & vestibis nimis constrictis: quo in casu vesicium reseratio optimum est remedium; post hæc essentia vel aliud remedium confortans quoque exhiberi potest. Si a graviditate, similia remedia conducunt, servata simul parca diæta, potuque harum aquarum moderatiore, donec præterierint.

X X X V.

Contra tormina & dolores colicos, si cortices aurantiorum, & reliqua supra dicta carminantia non sufficiunt, *Tormina* & colene laxans dari potest: nam sæpe a retentis pravis humoribus oriuntur. Deinde essent. cortic. aurantiorum, aut essent. carmin. Wedel. bis aut ter in die,

ad gutt. XXX. vel XL. dari debent. In *graviori malo*, *clyisma ex decoct. flol. chamomill.* in lacte factum, cum paucis melle aut saccharo optime simul conducit, & aqua medicata mane parca copia ac tepide bibatur.

X X X V I.

Menses Si nimius mensium fluxus aut hemorrhoidum in usu aut hæ- aquarum incidat, tunc per unum vel alterum diem a morr- potu earum abstineant, & simul, si dolores adfunt hoi- des ni- lumborum aqua vitæ mulierum, vel modo dicta car- mia. minantia ordinanda; vel saltem parcius bibant, quam alias, nimirum partem tantum circiter dimidiam. Si vero hi fluxus sunt moderati, aquarum usus continuari quidem potest, attamen paulo minori copia, & non nimis frigide.

X X X V I I.

Febres Sæpe etiam febres intermittentes in usu harum aqua- intermit- rum vel recrudescunt, vel ab umoribus noxiis, in mo- tentes. tum quasi citatis, recens oriuntur; quæ autem nos non terreat: nam si modo laxantia salina subinde interponantur, potu harum aquarum prudenter continuato, & essentiis amaris, simul usurpatis, optime curantur.

X X X V I I I.

Podagra Idem faciendum, si dolores podagrici, arthritici, & ar- ischiatici, dentium & similes tunc incidunt: nam contin- uato usu harum aquarum peccantes humores partim expelluntur, partim corriguntur, ut peculiari curatione vix aut prorsus non indigeant. Medicus igitur solum lene confortans ordinet, e. gr. aquam vel essentiam confortantem, itemque pulverem antispasmodicum, & si dolores vehementiores sint, laudani liquidi Sydenhamii parum iis addendum, præsertim circa vesperam.

X X X I X.

De usu Aquæ thermarum, ut *Carolinæ, Wisbadenses & Em- therma- senses*, fere simili ratione bibuntur. Aquæ vero amaræ rum & *Seidlicenses* aut *Seidschuzenses*, parciore longe copia aquarum sumuntur: quia ob copiosius sal amarum purgans, amara- quod continent, nimirum zij. in libra una aquæ, ma- rum. jori alvum movendi vi pollent, optima methodus eis utendi est, ut haustulus quatuor circiter unciarum una vice, tepide matutino tempore, hauriatur, & postea par-

partim ad saporem amarum ex ore abstergendum, par-
tim melioris effectus causa, haustulus Theæ vel Cof-
eæ superingeratur. Dein post breve temporis interval-
lum, X. circiter vel XII. minutorum similis hau-
tulus aquæ amaræ & desuper Coffeæ vel Theæ assu-
natur, hocque post aliquod temporis spatium tertia,
& in robustioribus quarta vice repetatur, ita post bre-
vem moram, alvus leniter & fere sine omni incom-
modo aliquoties solvetur, multique humores noxii eva-
tuabuntur.

X L.

*Profunt hæ aquæ quam maxime in affectibus ventri- Aquæ
culi & intestinorum, ad cruditates & sordes primarum amaræ
viarum, itemque ad serum supervacuum blande eva- quibus
tuandas, & speciatim in cachecticis ac serosis morbis, prosint.
hydropse recenti, & cumprimis leucophlegmatia, affe-
ctibus hypochondriacis, cardialgia, ciborum fastidio,
asthmate, dyspnœa, obstructionibus alvi, flatulentia,
cephalalgia, vertigine, morbis soporosis, arthriticis,
podagra, chiragra, lassitudine artuum, febribus inter-
mittentibus, ictero, hæmorrhoidibus obstructis, & ma-
lis inde provenientius. Ita quoque in mensibus sup-
pressis, præsertim chlorosi, aliisque hinc pendentibus
mulierum morbis egregie conducunt. Vermibus quoque
adversantur, atque non solum adultis, sed pueris et-
iam hoc in malo cum fructu ad zij. iij. vel plures pro
ætatis diversitate, exhibentur.*

X L I.

*Præservationis gratia Vere & Autumno per tres, Etiam
quatuor aut sex dies commode usurpari possunt; curan- præser-
di vero fine, pro morborum diversitate, paullo diutius, vandi
nimirum per IX. XII. vel XV. dies, quovis anni tem- scopo.
pore; ubi tamen subinde post triduum, per diem u-
num alterumve a potu hujus aquæ abstinere, & po-
stea denuo incipere ægrotantes possunt, ne nimis inde
debilitentur, atque diætâ eadem servanda, ut in alia-
rum aquarum medicatarum usu docuimus.*

X L I I.

*Nocent in viscerum obstructionibus, nimium invete- Ubi no-
ratis, phthisi, hæctica, hominibus debilioribus, valde cent.
emaciatiss, spasmodis, colica & asthmate convulsivo.*

Plura de his aquis amaris qui nosse desiderat, evolvat Frid. Hoffmanni scriptum Ann. 1725. de eis editum, aut Gærizii libellum Anno 1727. Ratisbonæ in 8. germanice evulgatum, qui adhuc uberius de eis egit, atque experimentis & observationibus quamplurimis earum utilitatem egregie & solide obfirmavit.

F I N I S.

INDEX RERUM.

A

A Bortus. Pag. 312. 314
 Achores. 313
 cidorum venenorum cura-
 ratio. 357
 coniti veneni curatio. 358
 damantis venenum me-
 chanicum. 351
 ejus curatio. 359
 lbugo in cornea. 343
 calicorum venenorum cura-
 ratio. 350. 358
 lvi fluxus nimius. 222
 in febribus acutis. 49. 79.
 lvi obstructio sine febre. 199
 - - - in febre. 40
 - - - gravidarum. 310
 maurosis. 239. 243
 mblyopia. 239
 ngina, quid. 28. 92. 101
 ejus curatio. 101
 nginæ in febribus cura-
 tio. 47
 nimi deliquium. 258. 261
 aorexia. 268. 284
 anxietatis in acutis cura-
 tio. 46. 80
 pepsia. 290
 phonia. 279.
 phthæ. 330. 332
 - - - in acutis 47
 poplexia. 251. 255
 appetitus prostratus. 284
 - - - post febres. 49

Apum punctura. 364
 Aquæ fortis assumptæ cu-
 ratio. 357
 Aquæ medicatæ. 365
 Araneorum punctura. 364
 Ardor ventriculi. 291
 - - - in acutis. 43
 Arsenici assumpti curatio. 358
 Arthritis. 158
 Articulorum rigor. 269. 283
 Ascarides. 305
 Asthma. 196. 198
 Atrophia. 338
 Auditus difficilis. 137. 240
 Aurium dolores. *ibid.*
 - - - susurrus & tinnitus. *ibid.*

B

B Arbi piscis venenum. 361
 Bellæ donnæ veneni cura-
 tio. 352. 360
 Bubones pestilentialia. 42
 - - - venerei. 183
 Bulimus. 288

C

C Achexia. 161. 166
 Calculus renum. 155
 - - - vesicæ. *ibid.*
 Cancer. 211. 216
 - - - penis. 183
 Ca-

Canis rabiosi morsus .	249.	Delirium sine febre .	242.
364		247	
Cantharidum assumptarum		Dentitio difficilis .	239
curatio .	361	Dentium dolores .	132.139
Capitis dolor .	135	Diabetes .	233
- - - in acutis ut curan-		Diaphragmatis inflamma-	
dus .	46	tio .	92. 105.
Cardialgia .	293	Diarrhœa .	222
Cardiagliæ in acutis cura-		- - - in acutis curatio .	
tio .	46	45. 57. 79.	
Catalepsis .	249	- - - infantum .	336
Cataracta , sive suffusio .		Dolor capitis .	135
245		- - - colicus .	298
Catarrhus infantum .	235	Dolores post partum .	320
Causus .	28. 43	Dysenteria .	225. 232
Cephalalgia .	135	- - - febri acutæ super-	
Chiragra .	158	veniens .	45
Chlorosis .	167	Dyspepsia .	290
Cholera .	224	Dyspnœa .	196
Ciborum fastidium .	284	Dysuria .	201
Cicutæ assumptæ curatio .			
358			
Coeliaca passio .	225		
Colicus dolor, s. colica .	298		
Colocynthis assumpti cu-			
ratio .	361		
Congestiones .	131		
Convulsio .	262. 269		
Convulsionum in acutis cu-			
ratio .	48		
Cordis palpitatio .	272		
Coryza .	220		
Crusta lactea .	333		
Cynoglossi veneni curatio .			
360			

D

D aturæ venenum .	352.
curatio .	360
Delirii in acutis curatio .	46

E

E Laterii largius assumpti	
curatio .	358
Empyema .	144
Epilepsia .	262
- - - infantum .	340
Erysipelas .	92
Euphorbii assumpti cura-	
tio .	358
Exanthematum febrilium	
curatio .	41

F

F Ames canina .	288
Fauces inflammatae .	101
- - - in acutis .	43
Favus .	333
Febres in universum .	12

Fe-

febris acuta.	25. 49	Febrilium symptomatum	
- - - stomachica.	30. 65	curatio.	39
- - - puerperarum.	321	Flatuum molestiæ.	296. 311
- - - biliosa.	30	Fluor albus.	191
- - - castrensis.	30. 40	- - - - venereus.	192
- - - catarrhalis.	29. 42	Fluxus in genere.	218
- - - continua.	25	- - - - a motu turbato.	235
- - - dysenterica.	30	Fœminarum morbi.	307
- - - ephemera.	28	Fœtor corporis.	241. 247
- - - epidemica.	30	- - - - narium.	<i>ibid.</i>
- - - erysipellacea.	31	- - - - oris.	<i>ibid.</i>
- - - exanthematica.	25.	Fœtus in utero mortuus	
41. 50. 64.		quando & quomodo eji-	
- - - hæctica.	31. 83. 90	ciendus.	318
- - - hungarica.	30. 43	Fungi venenati.	351
- - - inflammatoria.	31	Furunculi.	92
- - - intermittens.	13. 24		
- - - intestinalis acuta.			

65. 82

- - lactaria.	31. 322
- - lenta.	31. 83. 90
- - lochialis.	31
- - maligna, quid.	25.
28. curatio.	40
- - mesenterica acuta.	

65. 82

- - miliaris, five pur-	
purata.	29
- - pestilens, quid.	30
- - petechialis.	29. 40. 62
- - phthifica.	31
- - purpurata.	29. 61
- - quartana.	13. 24
- - quotidiana.	13
- - scarlatina.	29. 63
- - soporosa intermit-	
ens.	24
oris tertiana, quid.	13
- - urticata.	29
- - vulneraria.	31
- - semitertiana.	67

G

G Angræna & sphacelus.
49. 93. 97

Glandulæ induratæ.	211
Glandis penis ulcera.	183
Glaucoma, quid.	239
Gonorrhœa maligna.	181
- - - - benigna.	184
Gravidarum noxæ.	309
Gustus læsus.	246
Gutta serena, five amauro-	
rosis.	239. 243

H

H Emitritæus	67
Hæmiptysis.	115
Hæmorrhagiæ.	106
Hæmorrhagiæ acutarum	
tractatio.	44
Hæmorrhagia narium.	114
- - - - suppressa.	89. 120
- - - - uteri.	312
Hæmorroides cœcæ.	156
Hæ-	

Hæmorrhoides dolentes.	312
- - - nimia.	118
- - - suppressæ.	128
Hellebori largius assumpti curatio.	358
Hemeralopia.	240
Hepatis inflammatio.	92
- - - obstructio.	149
- - - scirrhus.	<i>ibid.</i>
Hirundinum deglutitarum curatio.	361
Hydrophobia.	249
Hydrops.	168
- - - ex quartana.	25.171
Hyoscyami veneni curatio.	360
Hyperemesis.	224
Hypocondriacum malum.	144
Hystericum malum.	147

I

I Cterus.	172
I Iliaca passio.	200
Imagines oculorum.	245
Impotentia virilis.	280
Incontinentia urinæ.	234
- - - post partum.	324
Incubus,	249
Infantum morbi.	326
Inflammatio in genere.	91
- - - diaphragmatis.	92.105
- - - hepatis.	105
- - - intestinorum,	<i>ibid.</i>
- - - lienis.	<i>ibid.</i>
- - - mammarum.	92.322
- - - præputii.	183
- - - pulmonis.	92.104.
- - - renum.	105
- - - tonsillarum.	103
- - - ventriculi.	105
- - - vesicæ.	<i>ibid.</i>

- - - uteri.	<i>ibid.</i>
- - - uvulæ.	103
Intertrigo infantum.	332
Ischiaticum malum.	158.
161	
Ischuria.	201

L

L Actis abundantia.	323
L - - defectus.	<i>ibid.</i>
Languor virium.	278
Laureolæ veneni curatio.	358
Leucoma oculi.	240
Lienis inflammatio.	105
- - - obstructio.	149
- - - scirrhus.	<i>ibid.</i>
Lienteria.	225
Linguae paralysis.	279
Lipothymia.	241. 258
Lithargirii venenum.	352
359	

Lochia nimia.	118
- - - suppressa.	127
Loquelæ læsio.	279
Lues venerea.	185
Lumbrici.	301. 344

M

M Aculæ oculorum.	245.
343	
- - - in cornea.	245
- - - volantes ante ocu- los.	<i>ibid.</i>
Malum hypochondriacum.	144.
- - - hystericum.	147
- - - ischiaticum.	158.161
Mammarum inflammatio.	322
Mandragoræ venenum.	352
Mania.	247
Marasmus senilis.	278

Mechanica venena, quæ.

- 351
 - - - eorum curatio. 359
 Melancholia. 248
 Memoria debilis. 241. 251
 Menfes nimii. 118
 - - - parcius fluentes. 126
 - - - suppressi. 123
 Mercurii sublimati sumpti
 curatio. 358
 Mictus cruentus. 117
 Morbi infantum. 326
 - - - ab alvo obstructa &
 flatibus retentis. 327
 - - - a lacte corrupto. 328
 Morbili quid. 29. curatio. 61
 Morfus canis rabiosi. 249
 364
 - - - viperarum & fer-
 pentum. 362
 Morus læsiones. 267
 Mulierum morbi. 307
 Myopia. 240. 246
 Mytolorum veneni cura-
 tio. 361

N

- N Arcotica venena, quæ
 350
 eorum curatio. 360
 Narium obstructio infan-
 tum. 333
 Nausea. 287
 Nebula in cornea. 245
 243
 Nephritis. 92
 Octambulæ. 249
 Odi venerei. 190
 Ophthalmia. 240

- O Blivio. 251
 O Obstructiones genera-
 tim. 193
 Obstructio alvi sine febre. 199
 - - - in febre. 40
 - - - gravidarum. 310
 - - - hepatis. 149
 - - - lienis. *ibid.*
 - - - narium in infanti-
 bus. 333
 - - - vasorum. 194. 210.
 Oculorum inflammatio. 92.
 98. 239

- - - morbi. 239
 Oculus lacrymans. 220
 Odontalgia. 92. 139
 Oedema. 167
 - - - post intermittentes. 24
 Oenanthes assumpti cura-
 tio. 358
 Olfactus læsus. 246
 Ophthalmia. 92. 98. 239
 - - - infantum. 342
 Otalgia. 92. 136

P

- P Alpitatio cordis. 272
 Papillæ dolentes. 323
 - - - fissæ. *ibid.*
 Paralysis. 255. 258
 - - - linguæ. 279
 Paraphrenitis. 92. 104
 Partus difficilis. 315. 318
 Passio cœliaca. 225
 - - - iliaca. 200
 Pavor infantum in somno. 329
 Penis ulcera sive cancer. 183
 Peripneumonia. 92. 104
 Pe-

T

- T** Abes adulatorum . 150
 - - - infantum . 338
 Tenesmus . 305
 Testiculorum tumor . 184
 Tinnitus aurium . 137
 Tithymali veneni curatio . 358
 Tophi venerei . 190
 Tonfillarum inflammatio . 92. 103.
 Tremor . 277
 Tumor præputii . 183
 Tussis convulsiva . 272
 - - - acutarum curatio . 47
 - - - - humida . 221
 - - - - infantum . 335
 Tympanitis . 171

V

- V** Ariolæ . 50. 60
 Vasorum obstructio . 194. 210
 Venena, quid . 347
 - - - - acida & alcalica . 350
 - - - - animalium . 353
 - - - - narcotica . 352
 Venenorum differentiæ . 348
 - - - - assumptorum curatio . 355
 Venerea lues . 185. 191
 Ventriculi ardor . 291
 - - - - inflammatio . 105

- Ventris tensio . 312
 Vermes intestinorum . 301. 344
 Vertigo . 140
 - - - - senilis . 278
 Vesicæ inflammatio . 105
 Vespæ punctura . 364
 Vigilæ nimix . 250
 - - - - in acutis . 46
 - - - - infantum . 329
 Viperarum morsus . 362
 Virium in acutis reparatio . 48
 Visus debilis . 239. 243
 - - - - læsiones . *ibid.*
 Ulcera . 238
 - - - - venerea . 183. 190
 - - - - penis venerea . 183
 Unguis oculi . 240
 Vomica pulmonum . 144
 Vomitus cruentus . 117
 - - - - in acutis curatio . 44
 - - - - nimius . 224
 Urinæ incontinentia . 234
 - - - - incontinentia post partum . 324
 - - - - difficultas in infantibus . 337
 - - - - suppressio in adultis . 201. 210
 - - - - in infantibus . 337
 Uteri inflammatio . 105
 Uvulæ inflammatio . 103

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore nel libro intitolato: *Laurentii Heisteri compendium Medicinæ Practicæ &c.* non v'esser cosa alcuna contro la santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a *Simone Occhi Stampatore di Venezia*, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Data li 25. Ottobre 1747.

(

(*Barbon Morosini Cav. Proc. Rif.*

(*Marco Foscarini Cav. Proc. Rif.*

Registrato in Libro a carte 13. al num. 96.

Girolamo Alberti Seg.







